




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2435/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2435/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2435/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2435/A



A xxix Fuc

2435/A



*Medicinalis. Lib. Cap. 102.*

<i>opercula, cyrtas.</i>	<i>1. 1.</i>	<i>Dolor cap.</i>	
<i>plexia.</i>	<i>1. 16.</i>	<i>Dolor cap. ex</i>	
<i>htis.</i>	<i>1. 31.</i>	<i>Dolor cap. ex</i>	
<i>gira</i>	<i>2. 2.</i>	<i>Dolor cap. ex</i>	
<i>thma</i>	<i>2. 4.</i>	<i>Dolor cap. ex</i>	
<i>etitus can.</i>	<i>3. 9.</i>	<i>Dolor cap. ex</i>	
<i>id.</i>	<i>3. 16.</i>	<i>Dolor cap. ex</i>	
<i>di a me</i>	<i>3. 17.</i>	<i>Vestitatio</i>	<i>1. 28.</i>
<i>ma inter aurum</i>	<i>3. 22.</i>	<i>Dolor aurium</i>	<i>1. 20.</i>
<i>nasarea.</i>	<i>3. 23.</i>	<i>Dolor dentium</i>	<i>1. 51.</i>
<i>cites.</i>	<i>3. 24.</i>	<i>Diarrhea</i>	<i>3. 57.</i>
<i>ulinas</i>	<i>3. 4.</i>	<i>Disenteria</i>	<i>2. 9.</i>
<i>cephalea</i>	<i>1. 9.</i>	<i>De illo</i>	<i>3. 13.</i>
<i>aros</i>	<i>1. 14.</i>	<i>Diabetes</i>	<i>3. 2.</i>
<i>atocha et catul.</i>	<i>1. 15.</i>	<i>Empyema</i>	<i>2. 8.</i>
<i>omif. mor.</i>	<i>1. 18.</i>	<i>Phacitis</i>	<i>1. 12.</i>
<i>opmiltior</i>	<i>1. 21.</i>	<i>Hemicrania</i>	<i>1. 10.</i>
<i>ollum. infl.</i>	<i>2. 1.</i>	<i>Hemorrhoides</i>	<i>3. 15.</i>
<i>ordis palpi.</i>	<i>2. 10.</i>	<i>Hepatis imbecil.</i>	<i>3. 18.</i>
<i>cholera</i>	<i>3. 6.</i>	<i>Hepatis obstr.</i>	<i>3. 19.</i>
<i>oli dolor</i>	<i>3. 12.</i>	<i>Hepatis infl.</i>	<i>3. 20.</i>
		<i>Hernia</i>	



A XXIX Fuc

2435/A







	1. 19.	Resolutio	1. 17.
	2. 1.	Renis cruentae	
	1. 13.	nam excretio	3. 29.
	1. 4.	Renum infl.	3. 30.
	2. 12.	Renum calculi	3. 31.
	2. 13.	Renum ulcus	3. 32.
	3. 9.	Saffusio	1. 26.
	3. 14.	Sanguis ex narib, erup.	1. 28.
	3. 26.	Sputum cruentum	2. 7.
	3. 27.	Syncope	2. 11.
	3. 28.	Singultus	3. 6.
	1. 20.	Sanguis ex resura	
	2. 14.	erup. et grumis	3. 35.
	3. 45.	Semina p. p. p.	3. 40.
	3. 46.	Sinist. fusio	3. 51.
	3. 49.	Sinist. cos. dolor	3. 53.
	1. 24.	Teneor	1. 22.
	1. 32.	Tussis	2. 3.
	1. 28.	Tuberc	2. 9.
	2. 5.	Tenesmus	3. 16.
	2. 6.	Timpanitus	3. 25.
	3. 43.	Vertigo	1. 11.
	3. 54.		



intestini imbecil. 3. i.

intestini inflam. 3. 2.

et 5. 3. 34.

intestini inflam. 3. 36.

intestini inflam. 3. 37.

intestini inflam. 3. 38.

intestini inflam. 3. 39.

intestini inflam. 3. 40.

intestini inflam. 3. 41.

intestini inflam. 3. 42.

intestini inflam. 3. 43.

intestini inflam. 3. 44.

intestini inflam. 3. 45.

intestini inflam. 3. 46.

intestini inflam. 3. 47.

intestini inflam. 3. 48.

intestini inflam. 3. 49.

intestini inflam. 3. 50.

intestini inflam. 3. 51.

intestini inflam. 3. 52.

intestini inflam. 3. 53.

intestini inflam. 3. 54.

intestini inflam. 3. 55.

intestini inflam. 3. 56.

intestini inflam. 3. 57.

intestini inflam. 3. 58.



ND  
SI  
M

gale  
de



55350  
DE MEDENDIS

SINGVLARVM HV,

MANI CORPORIS

partium à summo capite ad imos usque

pedes passionibus ac febribus Libri

Quatuor, nunquam antea

in lucem editi.

~~LEONHARTO EVCHISTO,~~

Scholæ medicæ Tubingensis pro-

fessore publico, autore. *cum hinc in sup.*

HIPPOCRATIS COI DE

medicamentis purgantibus Libellus iam re

cens in lucem editus.

HAC AQUA, NON

EX  
QVI BIBERIT



SIT ET IN AETERNVM

*Ph. S. p. i.*  
*Cavens*

VENETIIS Apud Andream Arriuabenum ad  
signum Putei. M. D. X LI.



IOACHIMVS CAMERARIVS  
ad Lectorem.

Cuncta licet veterum perlustres, cuncta nouorū,  
Quæ celebrant artem scripta Machaoniam,  
Forte sit yt liber magis admirabilis alter,  
Huic nullum inuenies vtilitate parem.  
~~Euthymus~~ in quo te vera ratione medendi,  
Nec fallente tuas instruit arte manus.  
Nunc poteris ex his (in quo sunt omnia) plane  
Non modo quid sapias discere, sed qd agas.



ILLVSTRISSIMO PRIN-  
CIPIS AC DOMINO ALBERTO  
Marchioni Brandenburgēsi, Stetinæ, Po-  
meranię, Cassuborū, & Sclauorum  
duci, Burggraui Norimbergē-  
si, ac Rugię Principi, Domi-  
no suo Clementiss. Ego  
Thartus Fuchsius.  
S D P.



Nno abhincvno, Illustrissime  
Princeps, id ipsum à me stu-  
diosis qbusdā efflagitantibus  
medendi quādā rationē per-  
breuem admodum cōscripsi,  
nō ī hoc sanē ut Galeni quos  
ea de re posteritati religt opti-  
mos ac absolutissimos, aliorūq; Gręcorum com-  
mētarios medicinę initiatis de manibus excute-  
rē, si quidem hoc instituto quid absurdius ine-  
ptiusq; aut dici aut excogitari posset? sed ut iis q  
prolixitate ac difficultate operū Galeni reliquo-  
rumq; Gręcorum deterrentur, & hoc nomine ad  
Arabes, atq; ineptissimā barbarorū medicorum  
turbā deficiunt, consulerē, ac quasi uiam ad Gale-  
ni, qui cæteros omnes superauit scripta facilius  
assequenda struerē. Nihil enim æque optanius,  
atq; ut iis nostris cōmentariolis adiuti melioris  
medicinę studiosi, gradū faciant ad ea cognoscē-  
da, quę plenius de curandi ratione Galenus tra-  
didit.

*Scribendi  
methodus  
hanc occa-  
sio*



ii didit.



Veterum  
medendi  
rationem  
hoc tempo  
re exerce  
ri prorsus  
nō posse.

didit. Perspectū nāq; habemus quā pauci ad  
modum sūt hodiē medicinā exercentes, qui ex  
Galenī optimi sanē auctoris, p̄scripto curādi indi  
cationes scrutentur, quū unusquisq; ferē sibi pe  
culiarē quem in medendo sequatur auctore, eūq;  
non raro pessimū, proponat, huncq; sicut mordicus  
teneat, ut ne latū quidē unguem ab illius decretis  
discedat. Quā quidē ratione sit, ut quāplurima  
quotidie errata inter medendū admittāt, qui syn  
cero iudicio destituti temere quosuis sectantur,  
q̄ facile declinarēt, si ex Galenī magis quā eius  
farinā indoctorū hominū sententia & consilio  
ægotis mederi uellent. Proinde ut tandē ab erro  
re suo, ac temerario instituto deducerentur, atq;  
adeo ad frugē bonā redirent, neq; haberent quod  
subinde desidīæ suæ & ignorantīæ prætenderēt,  
hanc medendi rationē ex Galenī, & hunc magna  
ex parte sequētū Aetii & Pauli monumentis cō  
flatam, edere uoluimus. Speramus. n. illam his q̄  
ad ueterum medendi rationem propius accessu  
ri sunt, adiūmēro, & ut Græci dicūt πρὸ οὐλοῦ, futu  
rā esse. Nam ut hanc penitus attingant, utcūq; ēt  
an itātur, hoc p̄sertim tempore, fieri minime pōt.  
Quum. n. ueterū curandi ratio duabus potissimū  
rebus constet, nempe p̄ceptis, quæ unde curan  
di indicationes petendæ sint mōstrant, ac morbos  
pellentibus medicamentis, eam quidem quæ in  
dicationes docet, hac etiā tempestate perfectissi  
mē consequi licebit, alter uero, quæ medicamē  
ta inquirat nequaquam. Multa enim cum simpli  
cia



## EPISTOLA

pia tum cōposita quibus illi in profligandis mor-  
 bis usi, esse cōstat, quæ omnium quorquot hodie  
 uiuunt cognitionem subterfugiunt, atq; adeo in  
 usum reuocari haud possunt, ita ut necessitate q̄-  
 dā cōpellamur, loco illoꝝ nostratibus & usitatis,  
 iis maxime quorum & forme & facultates nobis  
 cognitæ sunt, uti. Quod sanè mecum ipse repu-  
 tans, ueterū medendi rationi semper eam etiam  
 q̄ hodie usitata est, quoad eius fieri cōmodè po-  
 tuit, in iis meis de curādi ratione Commentariis  
 cōiunxi. Qui n. has temere separant, haud dubie  
 omnia perturbant, ac cœlum terrę miscēt. Quod  
 itaq; ad curādi indicatiōes attinet, ueteres & Græ-  
 cos planè imitatus sum quod illi eas præ ceteris  
 omnibus rectissime tradiderint. Quare nemo  
 miretur, quod ab Arabum ac recentiorū practi-  
 corum, ut uocāt, placitis multis in locis discesse-  
 rimus. iudicio enim id ipsum, nō errore factum.  
 Nam cum hoc planè nostrum sit consilium, ut  
 rerum medicarum studiosos à barbaris & ineptis  
 autoribus ad optimos, atq; adeo eos qui pristi-  
 nam medendi rationem syncerissime docent, re-  
 uocemus, studio ac data opera eas quas illi præ-  
 scribunt curandi indicationes, utpote erroneas,  
 & à ueritate prorsus abhorrentes contempnimus.  
 Pleraque etiam ex Galeni & reliquorum Græ-  
 corum sententia, quæ nemo fere nostrorum me-  
 dicorum usurpare audet, etsi cum magna laude  
 & egrotantium salute illis ueteres usi sint, inse-  
 rere studuimus, ut hac ratione nostros etiam, quo-



iii iisdem



I. Aph. 6.

Medico-  
rum nostri  
seculi blā-  
ditiae no-  
tantur.

iisdē confidentius uterentur, inuitarem. Nā cum  
tantopere ab iis quibus ueteres feliciter usi sunt  
abhorrent, sit ut interea paucos, imo' propē nul-  
los, magnos morbos curent. Parum certe memo-  
res illius Hippocratici, summis morbis summa  
exquisite remedia optima esse. Neque interim  
etiā animaduertunt, quā male passim ob illas  
suas blāditias ac assentationes audiāt, quod scilī-  
cet mācipiorum ritu, ut Galenus inquit, contra  
planē quā ueteres illi medici ab Aesculapio  
oriundī, qui tanquā duces militibus, & reges sub-  
ditis, imperare agris uoluerunt, agrotis pateāt, &  
obsequātur. Verum metum hunc haud dubie in-  
scitia qua prādicti sunt incutit. neq; enim cum il-  
lis exposulātibus actorū suorum rationē redde-  
re ualent, tā sunt prorsus omniū eorum quę tra-  
dunt Galenus & ueteres medici Græci, ignari,  
adeoq; malunt cū multis temere errare, quā ue-  
terum probe excogitatis remediis uti. Cæterum  
quod ad alterā partē, quę medicamēta docet spe-  
ctare uidetur, ea tm̄ in iis de Medendi ratione li-  
bris produximus, quorum hodie est in officinis  
frequens usus, & quibus nos sæpe, idq; non sine  
magno egrorū cōmodo, usi sumus. Quapropter  
usitata & cognita officinis uocabula, parū tamen  
latina interdum admiscere coacti sumus, ne si la-  
tinis perpetuo' uteremur, ab iis non intelligere  
mur. Vnice tamē cauimus exotica, p̄ciosa, & pa-  
ratu difficilia medicamēta, quod plurima illorū,  
eo quod neq; illis qui uendunt, neq; etiā iis qui  
emunt,



# EPISTOLAE

emunt, satis cognita sint adulterina esse verendū  
 sit. Mercatores ēt in iis extrudēdis (tanta est illoꝝ  
 insatiabilis auaritia) maxime student, vt primū  
 deteriora vendāt. quod dū faciunt, interea ēt quę  
 bona sunt, diutius retēta carie ac vermibus exesa,  
 deteriora euadūt. Pharmacopolę aut penē oēs, nō  
 minus q̃ illi, quęstui inhiantes, ac pecuniam par  
 ce & restrictę erogantes, non nisi pessima emunt.  
 Et quū ēt in hoc genere reperiantur viri aliquot  
 boni, tū q̃a magna ex parte indocti sunt, & melio  
 ra ignorant, vřitata dūtaxat, quę vt plurimū adul  
 terina sunt, ad conficienda medicamēta sua cōpa  
 rant. Quapropter stolidorū & indoctorū medicorū  
 consiliū p̃bare nō possum, qui in exercēde medē  
 di rōne nullis ferē medicamētis, nisi ea quę illoꝝ  
 compositionem cōstituunt à quatuor orbis par  
 tibus petita sint, vtūt. Neq; enim intelligunt, q̃  
 periculosum sit ea vřurare medicamēta, quę nec  
 ipsi, nec qui eadem vendunt ac p̃parant Sepla  
 sarii satis perspecta habeāt. Quod vero illis vtat  
 tur, non fit alia ratiōe, nisi quod eos autores à qui  
 bus in medēdo toti pendent, vřos esse vident, nō  
 magnopere laborātes qualia sint, aut vnde allata.  
 Qui igiř sapiūt, nostratibus, & paratu facilibus,  
 cognitisq; potius q̃ peregrinis, paratu difficili  
 bus, & incognitis vtentur, quod eorūde quem in  
 abigēdis morbis obtinēt effectus, vt plerunq; est  
 exoticorū, dubius esse nō possit. Quod non eo di  
 co, quasi peregrina & aliunde ad nos delata medi  
 camenta in vniuersum omnia ex officinis exter

Medico  
 rum quo  
 rumdam  
 huius æta  
 tis stolidi  
 tas.

✠ iiii nuan.



mināda putē, in quo sane errore malefanos quo  
 dam nostri seculi medicellos uersari cōpertū ha-  
 beo, cum multa sint eiusmodi, quibus etiā si no-  
 stratia singula perspecta haberemus, carere sine  
 magno ægrorum incōmodo non liceret. qualia  
 sunt aloë, casia fistularis, myrobalani, scāmōnia,  
 & id genus non pauca, Sed eorū dūtaxat damna-  
 mus studium, qui contemptis nostratibus pro-  
 pe oībus, ea tātū usurpāt, quæ plane exotica sunt,  
 & neq; ipsis, neq; aliis cognita. Memini, n. me ali-  
 quot nostri tēporis medicorum, qui in magno  
 habebantur precio, uidisse cōpositiones ex eius-  
 modi medicamentis cōcinnatas, quorum nuda  
 solūmodo extarent nomina, atq; adeo quæ nec ip-  
 si, nec Seplasiar ii nouissent, aut unquā uidissent.  
 Nec cur id facerent potui satis diuinare, nisi for-  
 te ambitione ducti, ceteris quod peregrina & ne-  
 mini nota proferret doctiores uideri uoluerint,  
 aut hac rōne cauere, ne suis alii quoq; in meden-  
 dis ægris uterentur. Quid multa? exoticis ac pre-  
 ciosis parce admodum utendū esse, neq; tñ om-  
 nibus, sed iis duntaxat quæ nobis iā multo usu  
 & experientia comprobata sunt iudicamus. Atq;  
 cōstat plerosq; esse, qui utcunq; etiam sæpiusq;  
 moniti, in uiam redire nolint, quos certe nō ma-  
 gnopere curamus. neq; enim illis hanc methodū  
 exarauimus, sed iis potius qui cādido animo ad  
 ueterem medendi rationē spirant. Dignum siqui-  
 dem est, ut qui ueritatis lucem intueri dedignā-  
 tur, in perpetua errorum caligine detineantur.

Tibi



# EPISTOLA

Tibi uero colēdissime Princeps, duas potissimū ob causas hos meos de medendi rōne libros dedicare constitui. Primū, qđ illis ex nominis tui auspicio & claritate nōnihil autoritatis & gratiæ accedere posse sperē. Quis enim est qui nesciat, qđ celebris, quamq̃ nobilis sit Marchionū Brandenburgensium apud oēs nationes familia: neq̃ id sane alio nomine, qđ ob multas, easq̃ egregias uirtutes, & res domi militiaeq̃ prudenter & feliciter gestas. Nā ut reliqs pręteritis à proauo tuo à quo tibi nomen inditū est, exordiar, quis unq̃ Principū illo prudentior, & ad res bene gerēdas aptior ac fœlicior? quis deniq̃ facundior? q̃s cōstantior? quis bellicosior? Hincq̃ adeo factū est, ut à Pio secundo Pōtifice Romano, uiro eximio ac doctissimo, mirificē laudatus sit, atq̃ Teutonicus Achilles dici meruerit. Sed missas facio alias multas & insignes illius optimi Principis uirtutes, quas si singulas cōmemorare uellem, uereor ut epistola capere possit. Ad auum itaq̃ meum olim clementissimum Principē uenio, quem ēt ob singularem belli peritiā, alias que multas cum corporis tum animi dotes Maximiliano, prudentissimo ac optimo Cæsari, constat fuisse charissimū, adeo ut illius ductu bella q̃ plurima non solum in Germania, uerū etiam Italia fœliciter gesserit. Nec à suis maioribus degenerauit parens tuus charissimus Cassimirus, Princeps pp singularem prudentiam, animi moderationē, rerum deniq̃ bellicarū mirificam peritiā, diutius nūque

Dedicatio  
nis causa.

Marchio  
num.  
Branden-  
burg. nobi-  
us fami-  
lia.

Albertus  
Marchio  
Electōr.

Federia-  
chus  
Marchio.

Marchio  
Cassimi-  
rus.



Albertus  
Marchio,  
dux Borus  
fia.

Humani  
tas.

nūq̃ usum lōgiori uita dignus. Hoc enim super  
stite, uix unquā Turca inmanissimus Christia-  
ni nominis hostis Vngariā sic totā inuasisset atq̃  
occupasset. Neque, n. dubitasset se (tāta erat illius  
magnanimitas, & rebus etiā penē desperatis con-  
stātia) uiribus eius quantum uis magnis ac potē-  
tissimis, Cæsarum adiutus auxiliis, opponere. Ve-  
rum ē medio sustulit Deus Opt. Max. tantum  
Heroa, quo Turcæ ministerio nostra delicta gra-  
uius puniret. Quid hic de patruo C. T. duce Bo-  
russiae referā? uerum de hoc præstat nihil quā-  
pauca dicere. Tantę enim illius Principis sunt  
uirtutes, ut absolutum aliquod optimi principis  
exēplar, quod tu in primis, aliq̃ omnes principes  
sequi deberent, dici queat. Quum itaque is sit  
uestre familiæ splendor, qui fieret ut patrocinio  
tuo freti ii nostri labores, non aliquā apud studio-  
sos inirent gratiā? Dein has meas uigilias C. T.  
nuncupare uolui, ut aliqua saltem ratione animi  
studium, & uoluntatē erga te meam declararem.  
Nam etsi, ut olim, tibi assistere quotidie, exclusus  
locorum interuallis, haud possim, tamen non mi-  
nor est quā cū præsens essem amor erga te me-  
us. Neque enim non possum te summe diligere,  
si uirtutes quas in te sitas esse perspectum habeo,  
mecum expendo. Siquidem ut ameris ab om-  
nibus, facit imprimis immensa illa humanitas.  
quæ in te puero adhuc elucebat, & quam quis-  
que ipso etiam statim conspectu, nedum con-  
gressu animaduertebat. Nulla enim res est quæ si  
bi non



# EPISTOLA

bi non solum subditorum, imò aliorum etiam  
 omnium animos ac beneuolentiā sic conciliat,  
 ac ipsa humanitas lenitas, & mansuetudo. Qua  
 propter in principe unice detestāda est inhumani-  
 tas, ut q̄ efficiat, ut à Cyclope illo Homérico non  
 multum absit, & cōfestim inuidiā comitem ha-  
 beat. Humanitatis nanque opinione amissa, pro  
 monstro planè ac portento habetur, ut cunq̄, au-  
 ro, gemmis, & serico ornatus incedat. Sed præstat  
 nūc alias tuas uirtutes prosequi, quādo omnibus  
 constet, Marchiones Brandenburgenses comita-  
 te reliquos omnes Germaniæ principes supera-  
 re. Inter plurimas uero alias primum occurrit no-  
 bis immensa tua & in Deum & in hoīes pietas,  
 quā olim dum uiueret Christophorus Pistorius,  
 uir ob præcipuā eruditionē perpetua memoria  
 dignus, aīo tuo magno studio instillauit. Quæ  
 una sanè certissima testis est, animum tuum à cru-  
 delitate & tyrannide alienissimum esse, ad igno-  
 scēdum uero promptissimū. Huic accedit, quod  
 æquitatis sis amantissimus, neq̄, ut multi hodie so-  
 lent principes, minus in delicta potentum ac di-  
 uitum quā in infimorum ac pauperum esse ani-  
 maduertendum putes. Neq̄ omittendum hoc,  
 quod animum tuum non contentus generis ma-  
 xima nobilitate, humanioribus etiam literis exco-  
 lere uolueris, in quibus cōusq̄ prouectus es, ut  
 subinde ad historias, quę te indies magis atq̄ ma-  
 gis oblectabunt, atq̄ simul instruent, per ocium  
 respicere queas. Neq̄ dubito quin in studiis ma-  
 iores

Christo-  
 phorus  
 Pistorius.



LEON. FUCHSI

iores progressus facere uoluisses, nisi breui admo-  
dum tpe binos tibi pceptores fata ipsa surripuisse-  
sent. Vt cumq; uero impeditus studioru thorum in-  
cursum prout institueras absolvere haud potue-  
ris nihilominus tn doctos maximo fauore pse-  
queris, eosq; unice colis, ductus haud dubie  
quoru da sapietissimoru Principu exeplo, quos ui-  
des doctrine amore & conseruatione illustrius no-  
men q; finium ditionisq; imperii ppgatione si-  
bi peperisse. Veru ut tadē laudandi finē faciā, mit-  
to multas alias tuas excellentes uirtutes, ne illas  
adulandi magis, q; reliquos a d easdē excitandi stu-  
dio cōmemorasse uidear, atq; hoc unū moneo, ut  
pgas subinde cōstanter amare doctos, tueriq; ad-  
uersus sycophātas studia ipsa, nec unquā ab hoc  
laudatissimo instituto pestes illas aulicas, inuenso  
in oēs doctos odio flagrātes, te auocare sinas, nec  
cōmittas unquā, ut Sirenibus istis, utcūq; suauiter  
canētib; aures accōmodes, sed doctor & pru-  
dentiū potius usus cōsilio, imperii tui habenas  
guberna. sic enim nō solū stabilietur tuū iperiu.  
uerumēt apud posteros omni ppsus inuidia care-  
bis, ac celebri fama uere illustris euades. Accipe  
igitur, Illustris Princeps, solita clementia nostras  
has uigilias, atq; ex iis salubria pcepta ad pfligā-  
dos morbos excerpe, quo salubriter uiuere qas.  
Dignissimus etenim es nō mō psp̄era, sed cōstā-  
ti & tē ppetua bona ualetudine, ut amplissimæ  
tuæ ditioni diutissime præesse, ac Christianæ rei  
publicæ prodesse queas. Vale. Tubingæ. XII.  
Calend. Iunii. Anno M<sup>c</sup> D. XXXIX.



RERVM HOC IN LIBRO ME

morabilium per Capita & Pa

ginas Index.

LIBRI PRIM I.

<b>D</b> E Alopecia & Ophiasi.	Cap. I. Pag. 1.
De dolore capitis.	2.4
De dolore capitis ex calore.	3.5
De dolore capitis ex frigore.	4.8
De dolore capitis ex siccitate.	5.9
De dolore capitis ex plenitudine.	6.10
De dolore capitis ex biliosis humoribus.	7.13
De dolore capitis ex pituitosis humoribus.	8.15
De cephalæa.	9.17
De hemicrania.	10.19
De uertigine.	11.21
De phrenitide.	12.24
De lethargo.	13.28
De carō.	14.31
De cathoca & catalepsi.	15. Ead.
De apoplexia.	16.32
De resolutione.	17.34
De morbo conitiali.	18.38
De incubo.	19.42
De melancholia.	20.43
De conuulsione.	21.50
De tremore.	22.53
De destillatione.	23.54
De lippitudine, siue ophthalmia.	24.56
De suffusione.	25.59
De aurium dolore.	26.61



# I N D E X

De parotidibus.	27.64
De sanguinis ex naribus eruptione.	28.65
De dolore dentium.	29.68
De aphtis.	30.70
De foetore oris.	31.72

## LIBRI SECVNDI

<b>D</b> E columelle inflammatione.	1.75
De angina.	2.76
De tussi.	3.79
De asthma.	4.82
De pleuritide.	5.85
De peripneumonia.	6.88
De cruento sputo.	7.89
De empyemate.	8.94
De tabe.	9.96
Decordis palpitatione.	10.99
De syncope.	11.101
De lactis defectu.	12.105
De lactis redundantia.	13.106
De lacte in grumos conuerso.	14.107
De inflammatione mammarum.	15.109

## LIBRI TERTII.

<b>D</b> E imbecillitate uentriculi.	1.111
De inflammatione uentriculi.	2.114
De appetitu canino.	3.115
De bulimo.	4.118
De inflammatione uentriculi.	5.120
De singultu.	6.122
De cholera.	7.124
De diarrhoea.	8.127



# I N D E X

De lienteria.	9. 131
De dysenteria.	10. 133
De tenesmo.	11. 137
De colori doloribus.	12. 139
De ileo.	13. 145
De lumbricis.	14. 147
De hæmorrhoidibus sedis.	15. 152
De procidentia ani.	16. 154
De rimis ani.	17. 158
De imbecillitate iocinoris.	18. 158
De obstructione iocinoris.	19. 151
De inflammatione iocinoris.	20. 163
De ictero.	21. 166
De aqua inter cutem.	22. 171
De anasarca.	23. 173
De ascite.	24. 176
De tympanite.	25. 177
De intemperie lienis.	26. 178
De lienis inflammatione.	27. 181
De lienis obstructione.	28. 184
De renib. cruentam urinā excernentibus.	29. 185
De inflammatione renum.	30. 187
De calculo renum.	31. 190
De renum ulceribus.	32. 195
De diabete.	33. 197
De uesicæ calculo.	34. 200
	(dem. 34. 202
De sanguinis ex uesica eruptione, & grumis eius	
De inflammatione uesicæ.	36. 203
De stillicidio urinæ.	37. 205
De difficultate urine.	38. 207



# INDEX

De suppressione urine.	39.207
De ulceribus uesice.	40.208
De his qui re uenera uti non possunt.	41.210
De seminis profluvio.	42.214
De exulceratione pudendi.	43.216
De ramice.	44. Ead.
De suppressis mensibus.	45.219
De redundantibus mensibus.	46.223
De uteri suffocatione.	47.226
De uteri procidentia.	48.228
De mola.	49.231
De inflammatione uteri.	50.232
De sterilitate remouenda.	51.234
De difficili partu.	52.238
De ischiadicis.	53.242
De podagra & arthritide.	54.246

## LIBRI QVARTI.

### DE MEDENDIS FEBRIBVS

<b>D</b> E diaria.	1.252
De diaria exobstructione meatuum.	2.258
De syncho cum putredine.	3.260
De continuis febribus.	4.263
De ardente febre.	5.266
De exquisita tertiana intermittente.	6.269
De tertiana notha.	7.273
De quartana.	8.275
De quotidiana.	9.278
De hectica febre.	10.280

## FINIS.



# LEONHARTI FVCHSII

## DE MEDENDIS SINGULA

rum corporis partium à sum-  
mo capite ad imos usque  
pedes passionibus.

LIBER

PRIMVS.

De Alopecia & Ophiasi.

Cap. I.



Α Ω Γ Ε Κ Ι Α passio est, quæ La-  
tinis Alopecia dicitur. Fit ubi  
in capite areas deciduus capil-  
lus efficit. Sic appellatam hanc  
passionem ferunt, quod vulpi-  
bus frequenter accidat. Siquidē  
αλωπηξ Grecis uulpes est. Οφια-  
σις nomē latinū non obtinuit:  
passio est, q̄ capitis partē lēsam

Alope-  
cia quid.

Ophiasis  
quid.

serpentis modo, quæ Grecis οφίς est, glabrā ostendit.  
Arabes & Barbari medici primum passionis genus  
uoce parū deprauata Alopiciam, alteraz uero Tyriā  
uocant qua uoce oēs serpentes, potissimum autem  
uiperas, intelligunt. Vtrūq; genus propter uitiatos  
humores contingit. Quemadmodum enim plantę  
aliquę ob humoris alieni ab ipsarum natura attra-  
ctionem: sic etiam capilli propter humorū ex qui-  
bus nutriri cōsueuerunt prauitatez, corrumpuntur.  
Quales autem sint uitiati humores, ex colere cutis  
capitis dignosces. Aliquibus enim mutata albidior  
apparet, aliquib. nigrior, aut pallidior. Candida pi-  
tuitam, atra melancholiam, pallida bilem flauam si-  
gnificat. Ad uitiosi humoris speciem certius agno-  
scendam, non leue etiam adiuumentum p̄cedens ui-  
ctus ratio conferet: p̄sertim intelligenti, qui nam  
A ciborum

Cause.

Digno-  
scendo-  
rum suc-  
corum  
nota.



Leonharti Fuchsi

**Chratio.** ciborum pituitę, qui nam atrę bilis, 7 flauę succum colligant. In primis itaq; totius corporis purgationem adhibere oportet, aut pharmaco pituitam ducente exhibito, aut quod bilem flauam aut nigram trahit, coniectura redundantis humoris, ut diximus, ex colore cutis facta. Nam si is albidior quā pro naturę habitu sit pituitosi humoris purgationez exhibebis: si pallidior, eiusmodi bilis purgationem, non secus atq; si nigrior conspicitur, quę nigrā detrahent bilem offeres. Pituitosos humores Hiera ex colocynthide purgare cōsuevit, quam describit Paulus lib. 7. Cap. 8. sub nomine Hierę Archigenis. Hiera etiā simplex, quę lib. 7. Ther. meth. 7 lib. 2. de Cōpo. medicamen. secundum locos cap. 1. à Galeno describitur, mirifice confert: aliquādo elleboro nigro adiecto, ubi atrę bilis humorem expurgare uolueris aliquando scammonia, si flaua bilis purganda erit.

**Purgatio.** Quin 7 ex aloë catapotia commodē sic patientes purgare solent. Habent autem hęc, colocynthidis partem unam, aloës 7 scammonię utriusque partes duas, cum succi absinthii parte una: conficiantur ex drachma una catapotia undecim, 7 deuoranda prębeantur. Vfus hodiernis diebus. Hierę picrę triplex est. primus, sub specie pulueris in uino aut iure gallinaceo aut alio conuenienti liquore assumpti. datur ex pharmaco hoc drachma una. Alter sub forma catapotiorum, qui tritissimus esse solet. Tertius sub eclegmatis specie, quod etiam in officinis pręparatum habetur. Ceterum post totius corporis purgationez apophlegmatismis, magistrica hodie uocant, pituitam ē capite detrahere pręstat. Hęc autē ex sinapi, hyssopo, staphysagria, pipere, origano, pyrethri radice, cubebis, 7 similibus conficiuntur, in hunc uel similem modum. ꝛ. Piperis longi, nucis myristicę, muscatam appellant, añ. 3. s. se. staphysagrię, pyrethri. añ. 3. ii. sinapi, origani, añ.

**Catapotia ex aloë.**

**Apophlegmatismi**



añ. 3. i. trita in puluerem cum melle, aut cum cera quantum satis est, in formam lupinorum redigantur, quarum una ad horę ferē unius medietatem commanducetur. Possunt etiam prædicta contusa in sacculum ex subtili panno confectus reponi, et deinceps commanducari. Post hæc ad localia medicamenta accedendum erit, quę discutiendi, attenuandi; vires habeant, inter quę calidissimum est euphorbium. Eo autem minus calidum thapsia, post thapsiam uero sinapi et nasturtium. Post hæc succedunt sulphur, nitrum, uterque elleborus, erucę semen, oleumque laurinum. Quin et pix liquida, murium stercus, anserinus adeps, sed magis ursę, amigdalę amarę totę usq; herinacei terrestres cutis, et thus aceto acerrimo subactum. Ante iam commemoratorum medicamentorum usum capillos nouacula tollere oportet, deinde patientem cutem per linteolum neque asperum, neque molle nimis confricare, ac uidere ad quantum ruborem per huiusmodi frictionem peruenit. Si enim per modicam frictionem statim rube fiat, morbum sanatu facilem iudicabis. Si uero uix post longam atque multam frictionem rubescat, difficilem tum passionem, tum curationem ominaberis. Porro ad hunc qui sequitur modum medicamenta compones. ℞. Seminis erucę, nasturtii, nitri. añ. 3. i. s. thuris in aceto acris et forti macerati. 3. i. sulphuris uiui. 3. i. adipis anserini, ursini. añ. 3. i. olei laurini. 3. iii. misce, fiat linimentum, quod illinatur assidue. Aliud paulo ualidius. ℞. Euphorbii, thapsię, añ. 3. i. ellebori utriusque añ. 3. s. se. nasturtii, erucę, amygdalarum amararum cum corticibus ustrarum añ. 3. i. sinapi. 3. s. olei nardini et laurini añ. 3. ij. cerę quantum satis est, formetur unguentum, quo caput assidue illinatur. Sunt autem hæc prædicta sub calido aere flatu carente, et in sole adhibenda. Si uero hyems fuerit, necesse erit ut in hypocausto,

A ii aut

Localia.

Capilli radendi.

Linimentum.  
Vnguentum.

Quo in loco applicanda.



aut balneo adhibeatur. Pre omnib. uero animaduertere oportet, ne in fortium medicamentorum admotione curis ultra quam conuenit concalescat: id quod tum ex colere ipsius, tum digitorum tactu deprehendes. Color namq; rufus magis apparebit, & digitorum tactu satis calidam cognosces. Horum itaque animaduersionem habere oportet. periculum enim, iterum atq; iterum repetito eorum usu, cute exuri. Quare ad molliora transeundum est. Plura autem paratu facilia medicamenta habet Galenus lib. i. de Compo. medica. secundum locos cap. i. Ceterum, cum morbus ex uitiatissimis humoribus procreatus sit, necesse erit ut tota uictus ratio sit ex cibis & potu boni succi. De quibus Galenus in peculiari de ijs libello conscripto consulendus erit. De aliis passionibus capillorum & cutis capitis ab eodem scribit Gal. lib. i. de Compo. medi. secundum locos: quas nos hic consulto pretermisimus, quando raro admodum in his curandis medicorum opera requiratur.

## De dolore capitis.

## Cap. II.

κεφαλαλγία.

**K**εφαλαλγία latine dolorem capitis sonat, & euz potissimum, qui non inueteratus est, non curando an per se accidat, aut alterius affectus symptoma sit. Barbari medici Soda; nominant. Huius autem due potissimum cause sunt. Nunc enim ex sola intemperie simplici citra humorum complexum nunc uero ex humorum copia accidit. Vehementissimi autem capitis dolores fiunt, ob caliditatem & frigiditatem: moderati ob siccitatem. Humiditas sui ipsius respectu nullum plane dolorem inducit, nisi calori, aut frigori, aut humorum copię adiuncta sit. Similimodo humoribus uel in toto capite, uel in aliqua tantum parte redundantibus. calidis quidem ac frigidis uehementior, siccis uero moderatior dolor inuadit, si tamen siccitas absq; manifesta caliditate fuerit.

Causa.

Nota.



De Medend. Morbis Lib. I.

rit. Humidi autem, quantum in ipsorum ratione est, nullum prorsus dolorem afferunt, multitudine tantum grauant, si citra obstructionem sint. Cum obstructione enim moderata, moderatè dolorifici: cum forti, uehementer dolorosi sunt. Vt autem ordi ne omnia tractentur, et rectius assequantur, propria iuxta singulos affectus capitis dolores, pcreates auxilia describemus, initiū à calida intemperie sumētes.

De dolore capitis ex calore.

Cap. III.

**P**er calorem hic intelligimus, intemperiem calidam nude qualitatē. Hec autem potissimum generatur ex solis ardore. omnes enim homines in sole estiuo diutius uersantes, capite incalescunt. Ex motu immodico, balneis, flammę uicinitate, ira, furore, calidis affectibus, odoramentis, cibo calido et acri, cepis uidelicet, alliis et porris. Qui ex ardore caput dolent, eorum cutis tactu calida est, et primo statim manus iniecta aridior apparet, oculi rubent, frigidis tum perfusioibus tum inunctionibus gaudet, et iuuantur. Euitandus aer calidus, nullū perflatū recipiens, et calidis uaporibus refertus. Deligendus contra is, qui natura frigidus, aut qui nostra arte sic pparatus sit ex floribus ac germinibus frigida facultate pditis p areā proiectis, et humi fufis, rosis nimirū, uiolis, nymphaea, quā Nenuphar hodie nominat, uitium capreolis, ruborum ramis, et similibus. Aqua etiam frigida de uasis in uasa transfusa aērem refrigerare ualet. Cibi sint natura frigidi, lactuca, portulaca, ptisana hordei, aut alica eiusdem, oua sorbilia, panis ex aqua, pulli columbarū cum omphacio (agre stam uocant) cocti. Pisces petrosi et lac amygdalarū cum fursurib. decoctum. Potu uero aqua utendum est, nisi quibusdam uentriculus propter aque potuz subuertatur: tum enī prestat uti uino aquoso, et bene diluto, aut aqua in qua cinnamomum decoctum

A iiii est,

Causa.

Signa.

Vitius.  
Aer.

Cibus.

Potus.



est, cui intybi domestici (endiuiā appellant) sirupus,  
 & acetosus simplex, aut oxy sacchara admixta sit.

**Somnus.** Ceterum somni ac quietis cura in primis habenda  
**Excremen** est. coitum euitet: alui excrementa ac lotium non re  
**torum ex=** tineat, sed ab iis sese suo tempore exoneret. Exercita  
**pur gatio.** tiones, frictions, balneaq; fugiat. Iram, furorem,  
**Exercitia.** aliasq; animi perturbationes corpus excalfacientes,  
**Animi af** prorsus non admittat. Vitandus igitur clamor, con  
**fectus** tentio, omnisq; mentis perturbatio & perculsio. In  
 bona autem animi habitatione & firmitate degen  
**Curatio.** dum. Dolorem autem capitis è caliditate curant, ea  
 que refrigerandi facultatem citra manifestam adstri  
 ctionem obtinent. Optima uero censenda, quæ te  
 nuium partiuꝝ substantia prædita sunt. Quapropter  
 in principio quidem nihil præstantius, quam oleo  
 rosaceo probè apparato caput perfundere. Proxi  
 mum à rosaceo chamæmelinum locum habet, in his  
 corporibus, quibus uehementem frigiditatem indu  
 cere ueremur: qualia sunt foeminarum, & eunuchor  
 um, ac puerorum, & quicumq; carne molli præditi,  
 albumq; habentes colorem. Sed si uehementer infri  
 gidari oporteat, semperuiui succum, aut lactuce, aut  
 psyllii, aut polygoni (corrigiolam appellant) adii  
 cere conuenit. Quin & solani aliquando succum, &  
 pampinorum, & uuarum immaturarum adiacere lice  
 bit. Vfus autem hodie sicut olim etiam obtinuit, ut  
 prædictis medicamentis parum aceti, ut nimirum ma  
 iorem & penitus penetrantem uim induat medica  
 mentum, admisceatur in hunc modum. R. Olei rosa  
 cei. ℥. ii. aque rosaceæ. ℥. i. s. aceti. ℥. s. misce. Aliud.  
 Aquarum semperuiui, lactuce, solani. añ. ℥. ii. aquæ  
 chamæmeli. ℥. i. s. aceti. ℥. i. misce. In iis medicamen  
**Adhibitio** tis lintheolum tingito, iuxtaq; frontem ubi pilosa  
**medica =** eius pars desinit, & iuxta tempora imposito. Occi  
**mentoruꝝ** put hoc medicamento tangi haud debet: neq; enim  
 citra molestiā refrigerantiā sustinet, propterea quod  
 isthic



isthic principium medullę spinalis existat. At finci-  
 put ob laxitatem coarticulationis iuxta coronales  
 futuram, et ob ossium tenuitatem et raritatem, fa-  
 cile tum caliditatem tum frigiditatem omnium quę  
 adhibentur medi. intrò distribuit. R efrigeranda au-  
 tem quęcunq; adhibetur medicamēta, in aqua uehe-  
 menter frigida collocata: quę si nō adsit, niuem aut  
 glaciem uasculo circumpones. Eodem sanē modo  
 oleis aliis uti licebit, ut est cotoneorum, uiolaceus, et  
 nymphę, nenupharinum hodie nominant. Interdū  
 adicere mucilagines, ut uocāt, seminis psyllii, et co-  
 toneorum, ac linimentum conficere in hunc modū  
 ℞. Mucilaginis se. cotoneorū, mucilaginis se. psyl-  
 lii. añ. 3. iiii. succi portulacę. 3. ii. olei rosacei. 3. i. mi-  
 sce, fiat linimentum. Cum adiectione cere, et aliorū  
 medi. unguēta efficies in eum modū. ℞. Vnguenti po-  
 puleon. 3. i. oleorum uiolaz, et rosacei. añ. 3. iiii. florū  
 nymphę aridoz, rosarum rub. añ. 3. i. cere quantū  
 satis est: fac unguentum, quod illinatur fronti et tem-  
 poribus. Proderunt etiā embrochę ex rosis, uiolis  
 floribus nymphę, folijs salicis, hordeo excorticato  
 portulacę, uitis, ac similibus. Si somnū cōciliare uo-  
 lueris, adde papaueris lactuceq; folia. Hęc quidē, ut  
 diximus, inter initia morbi remedia congruent. Po-  
 stea uero mitigantia ac maturantia medicamenta re-  
 primentibus miscere opz, in hunc modū. ℞. Florum  
 rosaz, uiolarū añ. M. s. folioz salicis herbarūz came-  
 meli, meliloti, añ. M. i. se. maluz. 3. iiij. hordei excorti-  
 cati. 3. i. Coquātur oīa in aquę lib. ij. usq; ad tertie  
 partis consumptionez, fiat embroca. Tandē ex discus-  
 soriis medicamentis quippiā addendum, paulatiz de-  
 tractis iis q̄ repellunt. Hactenus de iis q̄ extrinsecus  
 corpori adhibetur. Intra corpus assumi possunt usi-  
 tata hodie medicamēta, Iuleb uiolarum, rosaz, con-  
 seruę eorundē, confectio quam manū CHR ISTI ap-  
 pellāt, et alia eiusmodi, qbus alterādi inest facultas.

A iiii De

Linimen-  
tum.Embrom-  
cha.



**Causa.** **P**er frigus intellige intemperiem frigidam nude qualitatis, citra alicuius humoris frigidi confluxum. Hec contrahitur ab ambiente nos aere frigido; potissimum si quis aperto capite in hoc uersetur. Cibus et potu frigidis, precipue autem frigide aque potione, et in ea natatione. Frigidorum medicamentorum improvida admotione. **Signa.** Signa dolentium caput ob frigiditatem, contraria sunt eis que ex calore oriuntur. Tangentibus enim caput nullus sentitur calor, in contracta minimeque arida et decolor ipsorum facies existit. Oculi neque rubent, sed contra sub tumido pallore deformantur. Frigidis neque gaudent, neque iuuantur. **Vitius.** Caveat aërem frigidum, uersetur in calido. Lactis usus in cibo caueat, ac piscium, aliorumque que comesta refrigerare possunt. Ovis sordilibus, carnibus perdicum et phasianorum similiisque uestatur. Dandum uinum tenuium partium, quod tantum abest ut noceat, ut etiam plurimum conducat, quod nimirum calefaciendi extenuandique facultate præditi sit. Motu corporis utatur, gestationeque in equo. Somnus illi confert mediocris, ideoque plus uigilandum illi erit quam dormiendum. **Cura.** Lauacra calida prosunt. Animi perturbationes, tristitiam, grauesque cogitationes euitet. In adiuuendis autem medicamentis cerebri natium temperamentum considerandum erit, quod tale est, ut neque uehementer calida, neque etiam uehementer frigida ferat medicamenta. Conuenit autem in hoc omnibus, quod oleum rutaceum calidum, sincipiti (ut supra dictum est) adhibitur, perfecte hominem liberare possit. Si uero uehementiori calefactione sit opus, piper aut euphorbium ad oleum coniiciatur, aut aliquid olei de piperibus, uel euphorbii rutaceo oleo ammisceatur. Conueniunt etiam haud secus atque rutaceum, laurinum, itemque



De Medend. Morbis Lib. I.

itemq; irinum oleum, quibus non solum frons, uerū etiam facies ⁊ nares inungendę erūt. Prędictis oleis alia quędam medicamenta calida adiicere licebit, atq; unguentum hunc in modum cōficere. ℞. Oleo rum irini, rutacei. añ. 3. s. maioranę, betonicę, piperis. añ. 3. i. euphorbii gr. v. cerę quod satis est, fiat unguē tum. Neq; parum proderunt embrochę ex floribus meliloti ⁊ camomillę, maiorana, origano, betonica, sambuco, saluia, foliis laurinis, stichade, ⁊ simili bus in aqua decoctis. In eundem usum sacculi adhi beri possunt, sic confecti. ℞. Foliorum lauri, serpili, maioranę. añ. M. s. florum rosmarini. M. i. rutę. p. i. gariophyllorum, stochados arabicę. añ. 3. i. pulegi, calamenti. añ. 3. i. s. terātur singula, ⁊ fiat sacculus ca piti adhibendus. Imponatur autem capiti, calefa ctus in latere, acetoq; prius irrigatus. Nec alienum ab instituto erit, si quis pomum a liquod odoriferuz in hunc modum composuerit. ℞. Styracis calamitis. 3. ii. gariophyllorum, maceris, ligni aloës. añ. 3. s. lauē dulę. 3. ii. gallię moschatę. 3. i. s. moschi, ambre gr. iii. Terantur omnia subtilissimę, ⁊ cum aqua maio ranę ⁊ stacte, (storacem liquidam uocant) quod sa tis est, fiat pomum. Intra corpus adhiberi possunt, eclegma diacori, confectio dianbre, diamoschi dul cis, dianthos, syrupus de stochade, ⁊ alia calida me dicamenta, quorum singulatim facere mentionem superuacaneum erit.

Vnguen tum.

Sacculus.

Pomum.

De dolore capitis ex siccitate.

Cap. V.

**P**er siccitatem accipe intemperiem siccam nude qualitatis, quę potissimum ex immodica corpo ris uacuatione, siue ea per medicamēta, siue aē rem ambientem, famem, coituz, exercitia, animiq; p turbationes acciderit, euenire solet. Deprehenditur si pauca aut nulla penitus ex naribus excremēta ef fluxerint, oculi concaui fuerint, plurimumq; uigila uerint.

Cause.

Signa.



10  
**visus.**

Leonharti Fuchsi

uerint. Versetur in aëre humido, uescaturq; cibis hu-  
meantibus, et boni succi, uitellis nimirum ouorum,  
testibus gallorum, eorundemq; iure, phasianis, perdi-  
cibus, et aliis quæ plurimum nutrire possunt. Vinum  
bibat tenue et aquosum, somno utatur largiori. Ca-  
ueat motum corporis, ac quiete potius otioq; uta-  
tur. Coitum, famem, sitim, et omnia quæ exiccare  
possunt, fugiat. Lauacra quæ humectare ualent, ut  
sunt, Galeno lib. 3. de tuend. ualetu. autore, dulcium  
calefactarum aquarum, si tepidiores fuerint, non pa-  
rum proderunt. Letetur, atq; omnem animi pertur-  
bationem et percussione uitet. In hoc morbo capi-  
ti adhibendum erit oleum uiolaceum, amygdali-  
num, quod scilicet ex dulcibus confectum est amyg-  
dalis. Inungendum uero iis non solum sinciput, imò  
etiam naribus instillanda erunt. Non temere iam di-  
ctis oleis pinguedines ammiscentur, ad eum modum.  
**Linimentum.** R. Oleorum uiolacei, nymphææ (nenupharinum no-  
minant) añ. 3. iii. pinguedinis uituline, galline, buty-  
ri recentis, salis experti, añ. 3. ii. misce, fiat linimentum.  
Neq; à ratione alienum erit, si aliis, nempe farina hor-  
dei, uiolis, aut nymphæa, adiectis, unguenta et empla-  
stra confeceris. Proderit etiam, embrochas ex uiol-  
is, similibusq; herbis compositas adhibere. Intra cor-  
pus ea exhibenda erunt, quæ tabidis conueniunt, de  
quibus suo dicemus loco.

De dolore capitis ex plenitudine. Cap. VI.

**H**Actenus de curatione doloris capitis quæ ex  
nuda qualitatibus intemperie prouenit, egimus.  
iam de eo qui ex plenitudine oritur, uerba fa-  
ciemus. Plenitudinem autem uocamus, id quod Græ-  
ci πλῆτος καὶ πληθύνειν, quæ nihil aliud, nisi quum  
quatuor humores ex æquo aucti sunt, aut cum san-  
guis solus abundat. Idem enim est, quando synce-  
rus sanguis inuenis contineri non possit, quin ali-  
quid



quid bilis, uel pituitę, aut serosi humoris illi com-  
 mixtum sit. Hoc itaq; aucto, ut reliqui etiam omnes  
 humores increſcant, neceſſe eſt. Atq; hinc eſt, quod  
 recentiores hunc capitis dolorem ex ſanguine no-  
 minauerint. Fit ab iis quę plenitudinem in corpore  
 procreare poſſunt, hoc eſt, quę omnes ex æquo hu-  
 mores abundare efficiūt, ut ſunt cibi & potus copio-  
 ſi & boni ſucci, neglectio exercitiorum, balnei, ludo-  
 ris, & aliarum uacuationum naturalium & artificia-  
 lium. Facies & oculi rubent, uenę tenduntur, adeo  
 ut non maiores duntaxat, ſed etia; paruę, quę prius  
 ſenſum effugiebāt, nunc uiſu comprehendātur. Pul-  
 ſus magnus & uehemēs. Vrina ſubrufa ac craſſa. Ve-  
 nę temporu; pulſant. Dolor capitis grauatiuſ. Ver-  
 ſetur in aëre frigido & ſicco. Vitet carnes, oua ſorbi-  
 lia, & alia quę copioſe nutrire poſſunt. Utatur ptifa-  
 na hordeacea, aut alica hordei. Oleribus frigidis, in-  
 tybo (ſcarioſam & endiuiaſ uocant) portulaca, & ſi-  
 milibus uelſcatur. Fugiat uinum, bibat aquam deco-  
 ctionis cinnamomi, aut hordei. Exercitetur medio-  
 critet, fricetur, frequenti utatur balneo, ita tamen ut  
 corpus prius uacueſ, & eger minime febricitet. Som-  
 nus ſit mediocris. Gaudeat & letetur, animiq; omnis  
 perturbatio abſit. Primum omnium curandi ratio  
 a ſanguinis miſſiōe auſpicetur, ac uena in cubito ex-  
 teriore, quam humeralem & cephalicā; hodie uocāt,  
 eius partis in qua dolor potiſſimum eſt incidatur:  
 quod nimirum hæc uena capiti ſit continuata, atq;  
 adeo non ſolum in contrarium auellere, uerumetia;  
 euacuare partem affectam poſſit. Id quod non ſo-  
 lum Galenus, uerumetiam Razes lib. 9. ad Alman-  
 ſorem Cap. 1. faciendum ſuadet. Quod ſi ætas, aut  
 uirtus imbecilla uenę ſecandę conſilium intertur-  
 barint, cucurbite affigendę erunt, non quidem ca-  
 piti, ſed membri ei continuatis, & cum eo ſocietate  
 habentibus. Sic enim Galen. lib. 13. The. meth. ca. 13.  
 ita

Cauſe.

Signa.

Viſus.

Curatio.

Vena ſe-  
ctio.



Localia.

Decoctum  
purgans.

ita scribens : Generandis adhuc passionib. minime  
iis partib. que laborare incipiunt, sed que iis sunt co  
tinuatę, cucurbita imponi debet, auellendi in con  
trarium causa. Post hec refrigerantia & ad stringen  
tia medicamēta capiti adhibeantur, de quibus abun  
de suprā in cap. 3. dictum est. Alius etiam ut aperta  
sit, medicus diligēter curet; ideoq; si spōte sua excre  
menta corporis nō deiecerit, hoc uel simili decocto  
purgetur, quod. ℞. Florum boraginis, buglos  
se, uiolarum, rosarum, an. M. s. se. quatuor commu  
nium frigidorum maiorū excorticorum, an. 3. ij.  
myxorum (sebesten appellāt) prunorum damasceno  
rum an. numero. xii. passularum, tamarindorum.  
an. 3. i. corticum myrobalanorum luteorum, (citri  
nos hodie nominant) cęruleorum (Indos appellāt)  
cepulorum (chebulos uocant) empeliticorum (embla  
cos nuncupant) beletzicorum (belliricos corrupta  
uoce dicunt) an. 3. iij, glycirrhizę rase, liquiritiam ap  
pellant. 3. i. fumi terre, adianti, capillum Veneris no  
minant. an. M. i. tamaricis (tamariscum uocant) he  
mionitidis, scolopendriam dicunt. an. 3. ij. foliorū  
senę, polypodii. an. 3. s. agarici. 3. ij. s. zingiberis. 3. s.  
decoquantur singula in aqua fontana sufficiēti, do  
nec medietas eius consumatur. Dein coletur, & sac  
charo sufficienti dulcescat, clarificeturq; cum albu  
minib. oui, & fiat potio depurata. de qua eger in au  
rora. 3. iij. bibat. Quod si ualidius requirat medica  
mentum, tum prestiterit in. 3. iij. iniicere rhabarba  
ri in puluerem redacti. 3. i. spice. 3. s. Aut in iis dissol  
uere casię fistularis. 3. i. s. aut mellis acrii, mannam  
uocat. 3. i. Aut eclegmatis diaphenico. n. 3. iij. In eun  
dem usum exhibebis iyrupū uiolaceum, & oxysacha  
ram nominata. Post hec adhibenda capiti sunt me  
dicamenta que reliquias morbi discutere ualent, ut  
est althę semen, fœnum gręcū, chamęmeli melilotiq;  
flores. Olea deniq; chamęmelinum, anethinum, &  
similia.



similia. Ex quibus linimenta, unguenta, emplastraq;  
componi possunt, admodum in precedentibus capi-  
tulis monstratum.

De dolore capitis ex biliosis humoribus. Cap. VII.

**F**it ab omnibus iis, quæ corpus præter naturam  
calefaciunt & exiccant, adeoq; bilem flauam  
procreant, ut sunt uehementia exercitia, ira,  
uictus ratio ex biliosis cibis constans, uita curiosa,  
& similia. Signa in hoc similia sunt ei qui ex calore  
oritur, maior tamen in hoc morsus, & faciei pallor.  
Interim etiam oris amaritudo, oculorum siccitas,  
linguæ & narium est. Aetati etiam uigenti, & tempera-  
turis calidioribus, uiteq; sollicitæ, & his qui flauam  
coaceruant bilez, hæc passio præcipue accidere solet.  
Moretur in aëre frigido & humido, qui arte etiam,  
ut supra ostensum est, confici potest, si pauimentum  
ædium assidue humore aspergatur: aut flores ac ger-  
mina, quæ frigide humideq; facultatis sint, per areas  
proiciantur. Cibi in uniuersum humidi & boni suc-  
ci sint. Vescatur lactucis, portulaca, piscibus paruis  
& saxatilibus. Potus sit dilutus, aqua decoctionis cin-  
namomi. Vino prorsus abstineat. Quiescat, & som-  
no utatur largiore. Balneum quoq; illi temperatum,  
& unctiones conferat. Gaudeat, & omnes animi per-  
turbationes fugiat. Curandi ratio à bilioso humo-  
ris euacuatione, non ut loquuntur barbari, digestio-  
ne auspicanda. Neq; enī tenues humores, qualis est  
bilis flaua, quando quidem mobiles sunt, uacuatio-  
ni inepti esse possunt: atque adeo ut præparentur nō  
indigent, ueluti in cap. II. libri secundi Paradoxorū  
monstrauimus. Vacuatur autem biliosus humor per  
absinthii cremorem, aut per aloē, & per hierampi-  
cræ per se datā, aut catapotia ex aloē confecta. Ne-  
que absurdum erit, si quis decoctum purgans, cap. 6.  
descriptum exhibeat, atq; in eo dissoluat. 3. iii. ecleg-  
matis

Causæ.

Signa.

Victus.

Curatio.

Biliosi hu-  
mores nō  
egent præ-  
paratione



Dilutum  
rhabarbari.

Bolus.  
Clyster.

Localia.

matris de succo rosaceo, aut de psilio uocati. Proderit etiam rhabarbari dilutum (infusionem hodie nominant) in hunc modum compositum. ℞. Rhabarbari selecti. ʒ. ii. spice. ʒ. i. concidantur minutatim, et macerentur in succis intybi domestici. cassute (cuscutam appellant) buglossi (borraginem nominant.) añ. ʒ. i. uini optimi. ʒ. s. Durent horis duodecim in infusione, dein ualide exprimantur et colentur, adiectis eclegmatum de succo rosaceo, de psilio. añ. ʒ. i. s. misce, fiat potio. Vti etiam licebit catapotiis aureis, alephanginis, de rhabarbaro, de hiera simplici nominatis, et similibus. In delicatis non temere quis hoc bolo utetur. ℞. Scammoniae preparatae. ʒ. i. maceris, cinnamomi, mastichis. añ. gr. iii. conserue uiolearum, nymphae. añ. ʒ. i. sacchari quod satis est, fiat bolus. Proderit etiam clysteribus uti in hac modum confectis. ℞. Maluae, altheae, intybi utriusque domestici, hoc est, endiuiae et scariolae, uiolearum. añ. M. i. hordei integri. ʒ. i. se. quatuor communiter frigidorum minorum. añ. ʒ. iii. Coquantur singula in aqua fontana ad tertiae partis consumptionem, et colentur. ℞. Colaturae lib. i. medullae casei fistularis. ʒ. i. hierae picrae. ʒ. s. olei uiolacei. ʒ. iii. uitellos ouorum numero. ii. salis. ʒ. i. s. misce, fiat clyster. Post biliosi humoris uacuationem, ea medicamenta quae caput refrigerare ac roborare possunt adhibeantur, qualia multa Cap. 3. huius libri commemorata sunt. Quod si uero uigil supra modum aeger fuerit, sinciput oleo nymphae, et de papauere inungendus erit. Adiciere etiam interdum necesse est praedictis parum opii, ut scilicet somnus hac ratione concilietur. Galenus in eum usum trigoni pastillum, quem describit Paulus libro. 7. Cap. 12. commendat, ut eo frons inungatur.

De



## De dolore capitis ex pituitosis humoribus. Cap. VIII.

**G**eneratur ab omnibus quæ pituitam in capite procreant, ut est aër frigidus & humidus, cibi iisdem qualitatibus præditi, pisces, lac, olera, fructusq; item ocium, somnus à plenitudine, & similia. Dignoscitur, si caput grauatur, facies alba ac tumida fuerit. Si denique æger somno facile tentatur, piger est sensibus minime uiget, & excrementis capitis redundat. Aër egrotum ambiens, calidus & siccus sit natura, aut arte per odora menta aliqua, cinnamomum nimirum, thus, gariophyllos, agallochon (lignum aloës nominant) præparatus. Caribus uescatur assis, & odoramentorum accessione conditis. Vinum tenuium partiu confert. Motus mediocris, & alia quæ supra Cap. 4. monstrata sunt. Ratio curandi à pituosi humoris extenuatione & incisione auspicanda erit, in quem sanè usum mel rosaceum, oxymeli simplex, compositum, scylliticum, syrupus de stœchade cum succis hyssopi, betonicæ, maioranæ, & saluie cōueniunt. Vel si usus syruporum & succorum displicuerit, hoc decocto uti licebit. ℞. Radicū fœniculi, petroselini, apii. añ. ʒ. i. radicis pœoniæ. ʒ. ii. seminum anisi, fœniculi, sileris mōtani, seseli Gale. uocat, añ. ʒ. iii. stichadis arabici, origani, serpilli, maioranæ, calamenti, betonicæ, saluie, añ. M. s. cinnamomi selecti, maceris, añ. ʒ. i. s. Decoquantur iuxta artem in aqua sufficienti, usq; ad medietatis consumptionem. colētur, & colatura saccharo quod satis dulcescat, atq; subinde cum oui albmine depuretur. Adde syrupi de hyssopo, oxymelitis simplicis, añ. ʒ. iii. misce, fiat potio. Preparatis ac extenuatis iam humoribus pituitosis, reliquū est ut purganti medicamento euacuentur. In quem usum pderunt pilule de hiera cōposita, coctiæ, & sine quibus esse nolo. ℞. Masse pilularū coctiarum. ʒ. i. s. pil. de hiera

Causæ.

Signa.

Aer.

Curatio.

Præparatio.

Decoctum  
preparans  
purgatio.

purgatio.

Pilule.



de hiera composita .3. i. alephanginarum .3. s. agari-  
 ci trochiscati .3. ii. myrobalanorum cepulorum  
 (chebulos hodie nominant.) 3. i. turbit optimi.  
 3. s. stichados arabici, zingiberis, añ. gr. v. masti-  
 chis gr. vii. granorum pæonię numero. iiii. casto-  
 rei gr. iiii. cum succo lauandule fiant pilule pro  
**Clyster.** singulis drachmis numero. xi. Conferunt etiam cly-  
 steres, non solum propter euacuationem eorum, que  
 in intestinis continentur, sed etiam ob reuulsionem  
 eorum que ad caput feruntur. In quem usum prædi-  
 ctum decoctum præparans componentia medicame-  
 ta conducent, si colature. 3. xii. recipiantur, et in ea  
**Capitis** dissoluantur benedictę laxatiue. 3. s. eclegmatis Indi  
**Purgatio.** 3. iiii. diaphenicon. 3. ii. mellis rosacei. 3. i. oleorum lau-  
 rini, rutacei. añ. 3. i. s. sal is gemmę uocatę. 3. i. misce,  
 fiat clyster. Toto uacuato corpore, ea que caput ex-  
 purgare possunt adhibenda erunt, ex quorum nume-  
 ro sunt apophlegmatismi, de quibus cap. i. abunde  
 dictum est. Purgatur etiam caput per ea medicamen-  
 ta, que hodie Caputpurgia uoce barbara nominat.  
 Conficiuntur ex succo maioranę, bliti, brassicę, et hu-  
 iusmodi. Gargarismi etiã hoc nomine adhiberi pos-  
**Gargaris-** sunt ex succis hyssopi, betonicę, origani, hiera picra,  
**mi.** et oxymelite confecti, uel in hunc modum. R. R. adi-  
 cis pyrethri, piperis logi. añ. 3. i. s. se. staphysagrię. 3. s.  
 maioranę, pulegii, hyssopi, origani, betonicę. añ. M.  
 s. Decoquantur singula in aqua idoneę quantitatis  
**Sternuta-** donec tertia eius pars absumatur. Colature adice  
**mentum.** mellis rosacei. 3. i. s. oxymelitis scyllitici. 3. s. misce.  
 fiat gargarismus. Sternutamentorum etiam hoc lo-  
 co usus erit, sic confectorum. R. Maioranę. 3. i. nigel-  
 lę. 3. s. gariophyllorum, piperis albi, cubebarum. añ.  
 3. i. nucis myristicę, struthii (adisi uocāt) castorii, el-  
 lebori albi. añ. 3. s. misce, fiat puluis. Ditiorebus adii-  
 ciendū aliqd moschi et ambre, cuiusq; scilicet gr. ii.  
**Naribus** etia adhibere odoriamenta calida cōuenit,  
 aut pomum



aut pomū aliquod odoriferum conficiendum erit,  
 quale suprā cap. 4. commemorauimus. Errhina etiā,  
 (Nasalia appellant,) narib. indita commodant. ut. R.  
 feminis staphysagrie, pyrethri, piperis albi. añ. 3. s. ni-  
 gelle, struthii, añ. 3. ii. ellebori albi. 3. s. redigātur sin-  
 gula in puluerem, & cuz resina terebinthina fiant Na-  
 salia. Post capitis purgationem cōueniunt inunctio-  
 nes, embroche, sacculi, & similia medicamenta, suprā  
 cap. 4. producta, quibus discutiendi inest facultas. In-  
 tra corpus exhibentur cubebē saccharo obducte, cō-  
 fectiones diambre, diamoschi, aromatici rosacei, dia-  
 cumini, theriaca, Mithridati antidotus, diacori, con-  
 serue maiorane, rosmarini, betonicę, & eiusmodi. Po-  
 tissimum uerō hęc confectio. R. specierum aromati-  
 ci ros. diambre, diamoschi dulcis, añ. 3. ii. specierum  
 eclegmatis de gemmis, dianthos. añ. 3. i. cubebarum,  
 maceris, añ. 3. s. agallochi (lignum aloes uocant,) ga-  
 riophyllorum, se. fœniculi, añ. 3. s. cinnamomi electi.  
 3. ii. stichados arab. 3. s. sacchari candidissimi. 3. vi.  
 in aqua florum pæonię & lauandule dissoluti, fiat cō-  
 fectio in rotulis aut morsulis. Hic practicarum, ut  
 uocant, scriptores inserunt caput de dolore capitis  
 ex melancholicis humoribus, præter tamen necessita-  
 tem, cum omnia quę hic ab iisdem dicuntur, rectius  
 in cap. de melancholia sint transferenda.

Errhina.

Morsula.

## De cephalæa

## Cap. IX.

**K**εφαλαία, diuturnus & egrè cedens capitis do-  
 lor Græcis appellatur, qui ex parua occasione  
 maximas exacerbationes habet, adeo ut neque  
 strepitus neq; uocem uehementiores, neq; splēdidū  
 lumen, neq; uini potionē neq; caput replentia odo-  
 ramenta, neq; motum tolerare possint, sed in quiete  
 & tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere cu-  
 piāt, ut quibus ueluti à malleo feriri caput uideatur.  
 Quidam etiam uelut contundantur aut distendantur.

κεφαλαία  
quid.

B tur



*Causa.**Signa.**Victus.**Curatio.**Vena se-  
ctio.*

tur ea quę circa caput sunt sentiunt, non paucis ue-  
ro usq; ad oculorum radices dolor progreditur. Ha-  
bet aut hic affectus aliquando quide; cōtinuos do-  
lores, aliquando uero exacerbationes, & interualla  
siue ordinata, siue inordinata. Quidā etiam ex eis ce-  
rebri mēbranas dolitant, quidā uero mēbranam tā-  
tum caluariam ambientem. Fit ex uaporum aut hu-  
moruz calidorum uel frigidorum multitudinē, intra  
caluariā uel extra contenta. Dolores cum grauita-  
te, humorum multitudinē significant: cu; mordaci-  
tate uero, aut humorū aut uaporum acredinem: cu;  
pulsu autem, inflātionem: cum tensione uero, siq-  
dem citra grauitatem & pulsū fiat, flatus tenuis & uē-  
to si multitudinem demonstrant: cū pulsu uero, mē-  
branosi corporis inflātionem. Si uero cum graui-  
tate distentio fiat, humorum multitudinē intra mē-  
branas contentam. Et dolores quidem in superficie  
herētes, membranę os caluę ambientis affectum si-  
gnificant. Qui uero in profundo sunt, cerebri mem-  
branarum. Quibuscunq; enim affectus intra calua-  
riam est, his usq; ad oculorum radices dolores pro-  
cedunt, p̄p̄ea quod oculorum tunice ex cerebri mē-  
branis habeant ortū. Si uero humor putrefactus ca-  
lidior fiat, cum febris caput dolitant, febricitant aut  
omnino & qui ex inflammatione dolent. Victus rō  
ex superioribus de capitis dolore Capi. petēda erit.  
Curatio, si humoruz aut uaporuz multitudo causa  
fuerit, a uacuatione totius corporis auspicabitur. A  
sanguinis quidem missione, si totius corporis pleni-  
tudo fuerit. Incidenda uero uena primū cubiti ex-  
terna, eiusdem quide; lateris, humeralem nomināt.  
Et si amplius sanguis redundare uideatur, etiam ex  
naribus aperta uena, quantum satis esse uidebitur,  
detrahēre conueniet. Si uero caput tanquāz imbeci-  
lum, ad se sublato humores ac uapores excipiet, ma-  
teriam in totū corpus reuellere opz, atq; ita particu-  
le



le affecte mederi. Per purgatoria itaq; medicamenta  
 & clysteres, quoz omniuz in superioribus capitibus  
 copia habetur, ligaturis extremitatū, & pluribus ifer-  
 naruz partiu; frictionibus reuulsio fiat: precipue at  
 hiera, cuius uiz (ut Cap. i. diximus) exacues, exhibē-  
 da est. Ceteruz post totius corporis uacuationē, ca-  
 put uacuantibus uteris, apophlegmatismis nimirū, si  
 pituite est abundantia, & aliis medicamentis quę na-  
 ribus indūtur, cap. 8. come. Deinde ea quę robur ad-  
 dere possunt, adinouēda. R. epellit igitur oleū ex oli-  
 uis immaturis expressuz, & rosaceū, p se & cum aceto,  
 aliaq; quorum in precedentibus facta est mētio. Ad-  
 hibenda uero remedia tepida quidē, ubi frigidior &  
 crudior fuerit humoruz multitudo: frigida aut, ubi  
 calidior & biliosior extiterit. Post hęc, discutientia  
 medicamenta adhibēda erunt, ueluti est oleū chamæ-  
 melinū, anethinū, & similia suprā producta. Si uero  
 crassior sit humor multitudo, serpillū, aut pulegiū  
 comaz, aut calaminthen, aut mentā oleo incoquēdo  
 multitudinē euacuabis. Eadē hęc ēt robur parti affe-  
 ctę addunt, quapropter usq; ad perfectam curatio-  
 nem eis uti conuenit. Omniuz porro longe maxime  
 discutit, & perfecte corroborat, uerbenaca recta (uer-  
 benam appellant) uiridis. imō & arida cuz radicibus,  
 & simul cum serpillo, oleo incocta. Reliqua quę ad  
 curationē cephalę scitu necessaria sunt, ex iis quę  
 antea de dolore capitis dicta sunt discēs.

## De hemicrania.

## Cap. X.

**H**emicrania ē passio dolorifica, q̄ circa dimidiā  
 capitis partē, aliqñ dexteraz, aliqñ sinistraz, p̄tin-  
 git, & iuxta suturā secundū longitudinē eius ex-  
 tensa; terminatur. Hęc ut plurimū p circuitus exacer-  
 batur, ac q̄bulda extra caluariā, quibusdaz in p̄fun-  
 do capitis, aliis circa tēpoz musculos dolor sentit.  
 Fit ex uapoz aut humor siue multoz, siue calidoz,

Hemicra-  
nia quid.

Causę.

B ii siue



Signa.

Viſtus.

Curatio.

Localia.

ſive frigidoruꝝ per uenas, uel arterias, uel per utraqꝫ influxu, quum ſcilicet ea ſola quę intra caluam continentur, hoc eſt, cerebrum eiꝝqꝫ membranę, quod in ipſis redundat, foras protrudunt: aut cum interdum partes corporis infra caput poſitę, uitiatos uapores aut humores ſuſuꝝ mittunt. Notę quibus humores multi, calidi aut frigidi deprehenduntur, ex præcedentibus capitibus petendę ſunt. Quo autem in loco capitis paſſio fuerit, ex iis quę in Cap. de cephalæa dicta ſunt, cognosces. Quibus hoc adiciendum erit, ſi membrana caluam ambiens patitur, tum adeò uehementer dolere, ut neqꝫ manuum contactum facile ferant, ita ut ne cutis quidem ipſa omnino à paſſione immunis ſit. Viſtus ratio ex ſuperioribus de capitis dolore Capitib. petenda uenit. Præcipuè autem uitanda erunt, quę uaporum copiam ſuſum mittere poſſunt, ueluti cepe, allium, ſinapi, raphanus, & ſimilia. Qui uero hemicraniam curare aggreditur, prius num uenę ſeſione, aut purgatione eger indigeat, conſideret. Si enim ob plenitudinem paſſio orta fuerit, humeralis (quam hodie cephalicam uocant) uena, quę è directo partis patientis eſt, incidenda erit. Sin uero propter unius humoris redundantiam hemicrania inuaſerit, per conuenientia medicamenta is humor purgandus erit, ut ſuperioribus Capitib. monſtratum eſt. Vniuerſo corpore uacuato, ad capitis ac localia præſidia progrediendum erit, ac uel per digitos manus, uel linteum, dimidia frontis pars, & ea maximè quę circa temporum muſculos eſt, confricando calefacienda, atqꝫ id ante acceſſionis irritationis uè tēpus faciendum eſt. Poſt exacerbationem uerò medicamentis hemicranicis à ueteribus medicis appellatis utendum: ſiquidem multa caliditas in doloribus percipiatur, his quę aliquid habent refrigeratorium: citra uerò hanc, his quę multum excalfaciunt. Vtriſque uerò aliquid ex  
iis,



his, quæ robur addunt, misceatur, quod adstricto-  
riam uidelicet habeat facultatem. Optimum autem  
in frigido affectu unguentum erit, quod. ℞. olei ane-  
thini, olei irini, añ. ʒ. s. piperis albi, serpilli, añ. ʒ. i.  
s. castorii. ʒ. i. euphorbii. ʒ. s. ceræ quod satis est, fiat  
unguentum, quod dimidiæ frontis parti, et musculo  
temporis illinatur. Nec parum cōfert oleum cui exi-  
guum euphorbii commixtum sit, tepidum in aurem  
infusum, ut. ℞. olei communis. ʒ. i. euphorbii. ʒ. i. mi-  
sce, et gutta una in aurem instilletur. Quadam etiam  
naturæ proprietate euphorbium aceto dilutum, ac  
latere dextro dolente, sinistro, applicatum, et contra  
sinistro dolente, dextro illitum, hemicranicis maxi-  
mè confert. Idem possunt lumbrici terræ triti, et co-  
chlearum carnes lateri affecto illitæ. Sunt qui persi-  
corum nucleos tritos, ac illitos parti patienti, mirifi-  
cè prodesse tradant. Si uerò à calidis humoribus aut  
uaporibus dimidiæ capitis partis dolor fit, ea auxilia  
quæ suprà de capitis dolore ex calore et biliosis hu-  
moribus orto, memorauimus, conferent.

Vnguentum.

## De uertigine.

## Cap. XI.

**Q**UOD σκίττωμα Græcis est, hoc Latinis uertigo  
dicitur. Hinc uehemèter errant, qui inter se differre  
tradunt. Barbari corrupta uoce Scotomiā no-  
minant. Est aut, ubi obtenebrationes hebetudinèsq;  
oculis obuersantur, et omnia circumagi et rotari ui-  
dentur. Oritur uerò interdum cerebro primogenia  
passione laborante; interdum etiam, quum ori uen-  
triculi consentit. Cerebrum autem patitur, cum cras-  
sus ac lentus humor ipsum occupat, à quo uaporo-  
sus spiritus ab imbecilli calore resolutus, in cerebri  
partibus inordinatè mouetur. Ori autem uentriculi  
consentit, quando propter excrementa uitiosa in eo  
aceruata, ad ipsum cerebrum exhalatio uaporosa  
fertur, spiritum animale in illo circumagens.

Σκίττωμα

Vertigo.

Cause.

B iii Qui



*Signa.*

Qui hac passione laborat, iis à quacunque leui occasione præ oculis tenebre apparent, adeo ut interdum cadant, maxime si aliquando in circum rotetur. Si quidem ipsis ab una rotatione euenit id, quod aliis à pluribus accidere solet. Proinde hebescent siue alium quempiam siue rotam, aut id genus aliud quodpiam, aut ipsos quoque in aquis uortices circumagi uiderint. Visibilis enim spiritus rote agitate aliisque iam dictis occurrens, eodem motu circumuehitur, atque ita turbulentus, inæqualis, inordinatusque humoris et spiritus motus redditur. Vbi ex primaria cerebri passione uertigo dependet, tum aurium sonitus, uehemens dolor, capitis, grauitasque præcedunt: item olfactus, atque alterius cuiusque sensus à capite prodeuntis oblatio. Patiuntur autem tum potissimum, cum sub sole æstuauerint, uel aliam ob causam calefacto capite humores dissoluti circumaguntur. Vbi uero ab ore uentriculi oritur, stomachi morphonem, cardiogmon

*Viſus.*

Græci appellant, et nauseam præsentunt. Versetur in aëre puro ac lucido, fugiat crassum ac nebulosum. Cibis uescatur boni succi et concoctu facilibus. flatuque omnino carentibus, carnibus perdicum, caponum, phasianorum, gallinarum, uitulinis: piscibus saxatilibus. euaporantia quæuis deuitet. Bibat uinum aquosum, album, tenuissimum, et non ualde antiquum, aut hydromeli. Exercitio utatur mediocri. Somnum diurnum fugiat, nocturno prolixiori utatur. Caueat sibi ab animi perturbationibus. Non intueatur res in gyrum actas, et rotatas, aut celeriter motas. neque in præcipitiis ambulet. hæc enim singula passionem exacerbare possunt. Ver-

*Curatio.*

riginosos in accessione quidem odoramentis, frictionibus, et id genus aliis excitare conuenit. Virium autem attestante robore, si nihil aliud obstitit, uena humeralis secanda est, siue principium morbi fuerit, siue etiam processerit. In sanguinis

*Vena se-  
ctio,*



nis autem missione obseruandum, ne plurimum confertim uacuetur, propterea quod à quacunque leui occasione æger facile concidat. Pluribus itaq; ablationib. per certa interualla utentes, congruam mensuram explebimus. Quod si uero sanguinis missionem quidpiã prohibuerit, alius subducatur, semper redundantì humiori medicamentum adaptando. Plurimum uero confert, primum uacuare per acrem clysterem, non solum propter eorum quæ in intestinis continentur uacuationem, ut suprà quoque diximus, uerum etiam ob reuulsionem eorum quæ ad caput feruntur, cuius sanè compositionem pete ex Cap. de Apoplexia. Premissis hisce uniuersi corporis euacuationibus, capiti localia remedia adhibenda sunt, nempe cucurbitulæ ad occipitium cum scarificatione. Postea apophlegmarismis, gargarismis & sternutamentis utendum est. In nares deinde anagallidis succus, aut cyclamini infundendus. Nitrum uero cum nigella tritum, & oleo antiquo mixtum, per nares egregie purgat. Deinceps æger ad balneum ducendus erit. ac capiti embrocha ex medicamentis discutiendi facultate prædictis composita, adhibenda. Quod si uero caput in balneo iupra modum incaluerit, rosaceo & aceto sepe fouendum est, ac refrigerandum. Si igitur ob hæc præsidia passio cessauerit, deinceps à ualidioribus abstinendum: sin perstiterit, capitis arterias in temporibus circa aures incidere oportet, uentre tamen prius aut medicamento, aut clysteri purgato. Qualiter uero incidendæ sint arteriæ, docet Paulus Aegineta lib. 6. Cap. 4. Neque absurdum erit cauteriũ hoc occipiti post aures adhibere, quod. 2. C. a tharidum, abiectis capitibus, alis & pedibus. 3. 1. fermenti acris. 3. 5. cum aceto & uino è sublimi ignis commercio distillato, subigantur, & admoueantur. Vertigo autem à uentriculi oris consensu, uomi-

purgatio

Localia,

Cauterium

B iiii tu



tu curari potest, qui hoc medicamento mouendus erit. R. Anethi. M. i. se. raphani, se. raparum añ. 3. ii. radicis raphani, 3. s. ebulliant in aqua sufficiens, donec tertia pars absumatur. Coletur, 7. 3. iii. colaturæ addantur oxymelitis scyllitici. 3. i. s. misce, datur à comestione. Proderunt etiam pilulæ stomachicæ, 7. similes. Dentur à cibo ea quæ uentriculi os constringunt, atque adeò ne uapores sursum ad caput ferantur, prohibent; ut sunt diacotonion simplex, cotionia ipsa, pyra adstringentia, 7. eiusmodi, de quibus omnibus suo loco plura.

## De phreniide.

## Cap. XII.

phrenitis  
quid.  
Phreniti-  
dis.  
prima eius  
species.

**P**hrenitis est cerebri, aut membranarum eius inflammatio, Galeno lib. 2. de Symp. causis autore. Sunt autem phrenitidis plurimæ differentia, tres tamen præcipuæ. Aut enim imaginatrix sola facultas læsa est, seruata illæsa ratio, id quod Theophilo medico cuius Galen. lib. de Sympto. diff. meminit, euenisse constat: qui quum alio qui prudenter se gereret, atque eos qui præsentés erant, exactæ nosceret, tibicines tamen quosdam arbitrabatur esse in angulo cubiculi, in quo decubebat, eosq; tibia canere, atque pulsare, 7. se illos uidere putabat alios quidem stantes, alios autem illic sedentes, atq; ita continenter canentes, ut neque noctu, neque interdiu quicquam remitterent. proinde assidue clamans, iussit eos à cubiculo expelli. Is uerò ubi conualuit, quicquid singuli eorum qui ipsum uisitabāt, uel dixissent uel egissent, narrabat. Hoc etiam pacto Galenus ipse laborauit, ubi per æstatem ardente febrî correptus erat, ut licet uidere lib. 4. de patienti. loc. cap. 1. Imaginatio autem læditur priore cerebri parte patiente. Aut ratio tantum patitur, salua imaginatione. Sic patiebatur phreneticus ille, cuius mentionem facit Galenus loco iam citato, 7. lib. 4. de Patientia.

Secunda  
species.



rientibus loc. cap. 1. qui quum Romæ domi cum la-  
 nifici puero contineretur, surgens à cubili uenit ad  
 fenestram, per quam & ipse uideri, & prætereuntes ui-  
 dere potuit. Itaque ex uitreis uasis singula ostendēs  
 interrogauit, iuberentnè ut ea proiiceret? Illi uerò  
 ridentes plaudentesque, ut ea proiiceret, rogabant.  
 Tum ipse deinceps omnia arripiens, eiecit. at illi ma-  
 gnis acclamationibus riserunt. Postea iuberentnè  
 puerū quoq; proici, quum interrogasset, atque illi  
 iussissent, ilico ipsum deiecit. Hic sanè singula uasa  
 suis nomenclaturis probè nominauit. unde intelli-  
 gi potest, neque imaginationē fuisse lēsam, neque no-  
 minum memoriam deletam. Media uerò cerebri par-  
 te patiente, ratiocinandi uis euertitur. Aut imagina-  
 tio simul & ratio læduntur. Causa morbi est, uel san-  
 guis exuperans, uel biliosus humor cerebrum occu-  
 pans. Nonnunquam etiam ex bile perusta nascitur,  
 quæ certe grauissimam phrenitidem contrahit. Fe-  
 bris continua & amentia infestant, plurimāque parte  
 somnus difficilis, & uigilię comitantur. Interdū quo-  
 que somnus turbulentus accedit, ut consurgant æ-  
 gri, exiliant, furibundè uociferent, uerba sine or-  
 dine & sensu effundant, interrogantibusq; nihil cer-  
 ti respondeant. Oculos habent cruentos, & sæpe per-  
 fricant; interim aridos, interim lachrymantes. Lin-  
 gua eorum est aspera, & ex naribus sanguis destillat,  
 floccos festucasque colligunt. Pulsus ad hæc exigus  
 os, languidos, & quadantenus duos habet. Spiratio  
 magna & rara. Quibus sanguineus humor morbum  
 fecit, ii cum risu insaniunt: Quibus flaua bilis, feroci-  
 ter & tam immaniter sæuiunt, ut coërceri nequeant:  
 omnium, quæ dicunt faciuntque obliuiscuntur. De-  
 cumbat æger in loco tum aëris, tum luminis tempe-  
 ratī, ac uariis picturis libero, in quem amici quidem  
 gratissimi ingrediantur, qui tamen non inopportunè  
 interpellent, & nonnunquam blandè ac leniter allo-  
 quantur

Tertia  
 species.  
 Causæ.

Signa

I. Pra. 27

visus.



quantur, nōnunquā acerbius increpēt. Cibus primū,  
 esto ptisanæ cremor, aut alica hordei, aut panis me-  
 dulla cū aqua, mulla, aut melle rosaceo sepius lota.  
 Oleribus uescatur itybo, lactuca ⁊ malua elixis, ⁊ si  
 milibus, quæ refrigerare atq; humectare possunt. In  
 inclinatione morbi pisces quoq; squamosi, ⁊ saxati-  
 les dandi sunt. Mala ēt punica, cera saq; si multus in-  
 tus cōficiat feruor, offerēda. Potus sit aqua decoctio-  
 nis cinnamoni, aut hordei, cui admixtus sit syrupus  
 uiolaceus, rosaceus, aut nymphæe, quē nenupharinū  
 uocāt. Hęc aut non confertim, hoc est copiose ⁊ cele-  
 riter ingurgitāda, sed identidē parcius exhibeantur,  
 neq; n. si tibiundi admodū sunt, ut potū uehementer  
 affectēt. Atq; hinc est qd Hippo. li. i. Prænotionū, ⁊  
 li. 6. Epid. par. 2. aph. 6. *ἡ ψυχρότης* appellat. Vbi uero  
 cōcoctionis notē apparēt in lotio, ⁊ febris nō uehe-  
 mens, sed lenior fuerit, atq; uires nō satis robuste, uī  
 nū tenue ⁊ dilutū (quod *ὁ λιγρόρον* nomināt Græci)  
 dandū. Quod tutius sit in his qui sani hoc bibere cō-  
 sueuerūt, ⁊ uentriculū natura imbecillū ⁊ frigidum  
 sortiti sunt. In quiete deniq; ægri quoad eius fieri li-  
 cet cōtineātur: si diuites fuerint, à famulis: si n. paupe-  
 res, uinculis. nā inordinata motio uires cōuellit. Cē-  
 rerū ubi morbus se remiserit, gestatione corporis uti  
 cōuenit. Balneū quoq; aquę dulcis, si corpus squalē  
 dū aridumq; fuerit, cōfert: modo tepida fuerint. cum  
 enim humectēt ⁊ refrigerent, nō solū siccitatem, uerū  
 etiā immodicas uigilias mentisq; alienationem unā  
 cū febre profligare possunt. Nō sunt tñ nisi corpore  
 prius uacuato, ut iam sepe monuimus, adhibēda. Of-  
 ficiunt phreniticis supra modū animi p̄turbationes  
 proinde nihil quod mœstitiā inferat, aut bilem creat,  
 cōmittendum est. Si uires ægri permittūt, sanguis pro-  
 tinus mitti debet: quoniā non est salubrius aliud, ne  
 que pręsentius auxilium. Secūda aut cubiti uena, hu-  
 meralis dicta, aut si ea delituerit, media, ⁊ quantum  
 tulerint

Curatio.  
 Venæ se-  
 ctio.



valerint vires euacuandū. Non tamē usq; ad animi deliquiū, ut nonnulli arbitrantur, præstat enim minus demere quā oportet, ob plurimam uehementis motus agitationem, plurimūq; laborē quo egri afflētatur. Prospiciendū ēt, ne clam eger brachii uinculū soluat. Dein rectā in frōte uenā ēt incidere licebit, Quod si ętas uenę sectioni obstiterit, tū cucurbitule cum sacificatione occipitio ⁊ spingē admonēde erūt quę ēt hoc noīe conferre solēt, quod ā capite humorū defluxū in contrariū auellūt. In hunc sanē usum præstat clysteribus uti, hoc mō cōpositis. ℞. Folioꝝ maluę, uiolarum, intybi (quod scariolā uocāt) lactuce. añ. M. i. hordei decorticati. ℥. i. myxorū (sebesten nomināt) numero. xi. Decoquātur in aq̃ sufficiēti ad teetias. ℞. Colaturę lib. i. casię fistularis recēs extraētę. ℥. i. s. mellis rosacei. ℥. i. olei uiolacei. ℥. iii. salis. ℥. i. s. misce, fiat clyster. Si uolueris ut ualidius purget, adiciēda erit hierę picrę, aut eclegmatis de iucco rosaceo. ℥. s. Auertēdi ēt ā capite humores, ligaturis extremitatū, frictionibus pedū cū sale ⁊ aceto, ac simil. Caput uero rosaceo, uel oxyrhodino tepidiorib⁹ irrigare oportet. Inflāmato enī cerebro uel mēbranis eius, frigiditas tuta nō est, sicut neq; uehēmēs caliditas. Frigiditas enī meatus cōstringit, neq; finit excrementa ē capite discuti: at ingēs caliditas feruorē cōgeminat. In hūc usum ēt conueniunt succi plantaginis, solani, ⁊ alia quorū suprà facta est mētio. Si passio uehementior fuerit, caput faciēq; assidue oleo in quo capita papauerū decocta sunt fouebis. Odorem quoq; naribus obiciemus, rosas, uiolas, flores nymphęę, caphurā (cāphoram hodie nominant) ac nares ipsas intus, uel frontē, ex iis aut similib. medicamētis illinemus. Nā sopire ac stupefacere principē facultatē opꝝ. cerebrū scz, qđ supra modū incaluit, refrigerando. Si uigilię ēt uehēmēter urgēt, quę somnū cōcilia repnt, qualia multa quę suprà dicta sunt huc transferenda,

Auerſio.

Clyster.

Localla.

Somnifer.

ra.



Unguen-  
tum.Embros-  
cha.

Digestio.

ferenda adhibebimus. Conferet autem inter cetera hoc unguentum, quod. ℞. unguenti populeon. 3. ii. olei uiolacei. 3. ii. se. hyoscyami, corticis mandragore. añ. 3. s. opii gr. ii. croci. 3. s. aceti parum, cere albe quod satis est. Embrocha etiam hæc tepida capiti adhibenda, quæ. ℞. Florum uiolarum siccarum, rosarū. rubearum, nymphæ. añ. M. i. s. hordei excorticati 3. i. se. papaueris albi. 3. ii. se. lactuce. 3. iii. Decoquantur in aqua fontana sufficienti, et fiat embrocha. Postremum, ubi morbus iam resedit, mitiorq; factus est, id quod tertio die ut plurimum accidere solet, digeren tia quæ reliquias morbi discutere possunt, medica- menta admoenda erunt. In quem usum priori em- broche flores chamemeli, anethi et meliloti admisce- re licebit. Sunt qui gallinas aut catulos per medium fissos capiti apponant. Similiter sunt qui calidū pul- monem arietis, uel recens ex animali acceptum, uel aqua feruenti calefactum admovent. Si diutinum autem iam malum fuerit, in oleo serpillum decoque- re conuenit. Galenus lib. 11. et 13. Ther. meth. casto- reo utendum esse phlegmone iam inclinante docet, quoniam non continuò locis circa cerebrum, sed ossibus interuenientibus occurrat. Inest autem ei me- dicamento et partium tenuitas, quod ipsum iis quo- rum per densa propugnacula transmitti uim opor- tet, est accommodum.

## De lethargo. Cap. XIII.

Lethargus  
quid.

**L**ethargos passio phrenitidi contraria est. est enim marcor, et in expugnabilis penè dormiendi ne- cessitas. Hoc uitio correptis omniū rerum ob- liuio accidit, ut uerbis nulla suppedietur materia: hinc etiam nomen nactum est. ληθην enim Græcis ob- liuio est, αἴψην autem captura, uel αἴψην iners: ut ληθ- εος non sit aliud, nisi iners obliuio, uel morbus obliuionem inducens. Causa eius est pituita, quæ fri-

Causa.



frigore nimio et humiditate cerebrum imbuunt. Lethargicos comitatur febris lenta. putrescit enim humor pituitosus in hoc morbo, Galeno lib. 13. The. meth. teste, cum profunda in somnum delatione. Pulsus his magni rarique sunt, et undosi, spiratio nimis rara, et imbecillis. Somnolenti perpetuo sunt, desidiofi, ignaui. Vix et tarde quocunque modo interpellentur, respondent. Oculos quandoque ad uociferationem aperiunt, et denuo claudunt, ad soporemque reuertuntur. Omnium ueluti amētes obliuiscuntur. Oscitant crebro, et hianti ore aliquādiu persistunt, tanquam claudere id obliti. Ad meiendum uocati, porrectam matulam manu tenentes, meiere obliuiscuntur. Deiciunt per aluum magna ex parte liquidiora. Nonnullis contra uenter indurescit. Urinam reddunt iumentis similem. Quidam ex eis tremiscunt, et sudoribus undiquaque madent. Cubile, in quo decumbit æger, splendidum, lucidum et tepidum sit, Cibi sint attenuantes, incidentes, exiccantes, qui condiantur apio, aniso, cymino, pipere et similibus. Ex auibus, montana auicula, pullus domesticus, perdix. Oleribus, porri, asparagi, petroselinum. Cremor auenæ, uel alica eius cum oxymelite, uel salibus, uel pulegio, conueniunt. Potus sit hydromeli, aut uinum aquosum, tenue et album. Si uires permittunt, et nihil aliorum obstiterit, Galeno lib. 13. The. meth. autore, sanguinem statim ab initio mittere expedit. Sin minus, cysteribus acribus alius eluenda. de quibus in cap. de apoplexia dicemus. Dein oxyrhodinum capiti admouendum. Nam repellendus à capite humor est, quisquis is fuerit, eodem Galeno teste. In quē usum etiam frictiones cum pyrhetto, pipere, sale, et aceto, ligaturæque extremitatū conferunt. Odoramenta quoque excitatoria admouenda, ueluti castoreum, funiculus extinctæ lucernæ pix humida, bitumē, chalbanum, sulphur, sagapenum (serapinum uocant barbari) cornu ceruinum, abro-

Signa.

Vicius.

Curatio.

Localia.

Excitatio.

Vid.

ionum



tonū, & peucedā. Extrēa cruraq; pungere, nōn unquā  
 pilos ēt in ipsis uehementius euellere oīz, q̄ excitent. Li-  
 cebit ēt in acetothymū, pulegiū, & origanū, aliāq; id  
 genus incoq̄re, ac narib. egri adinouere, quo uapor  
 ad cerebrū delatus crassitudinē humoris dissecet. Pa-  
 latū ēt ualentibus & acribus medicamētis, uerbi grā  
 sinapi cū melle, antidoto Mithridati, theriaca, & put-  
 uere pyrethri inungendū. Conariq; opz, pituitā indi-  
 dez affixaz digitis euicere. Ab his uero ēt sternutamiē-  
 tis utemur: & si admittantur, apoplegmatisimoz usus  
 erit. At si iis affectus non discutitur, caput radendū,  
 deinde fociendum est sale, milio, & similibus, per sac-  
 culos adhibitis. Ad hęc sinapismo uti in capite pro-  
 dest, ex caricis & sinapi ex aceto contritis p̄fecto. Po-  
 stea curcurbiulas occipiti affigere cū plurimo igne  
 opz, circa primā & secundā uertebras. Castorio ēt ca-  
 put illinendū. Quinēt, ut Alexāder Trallianus li. 7.  
 Cap. 20. docet, id ipsū potui dare cū oxymelite ex-  
 pedit. Nā uno hoc medicamento nōnulli miserrime  
 toto corpore ipediti, sanitati restituti sunt. Prēterea  
 ad naturę excretiōes frequēter sollicitare oportebit,  
 tūz clysteribus, tūz iis q̄ urinaz mouent. Pubez oleo  
 rutaceo, cui sit adiectū paululū castorei, aspergere.  
 Cēterūz ubi morbus inclinare inceperit, gestatio sta-  
 tim p̄tinua utilis est, & balneūz, quod supra modū  
 p̄ferre solet. Siquidez Alexāder Trallianus se cogno-  
 uisse quēpiā scribit, qui lethargo grauissimo labo-  
 rauerit, adeo ut se leuari non sentiret. Is post duode-  
 uiginti morbi dies balneū ingressus, tantū sensit at-  
 xilli, ut a somno statim exp̄gisceretur, aliosq; attente  
 intelligeret, & ipse uerba expedite faceret, familiares  
 oēs agnosces. Quod si uero estū balnei, ob uires im-  
 becillas fere haud possit, salte domi in solio aq̄ cali-  
 de lauādus erit. Cauendū tñ, ne aqua caput egrotan-  
 tis pfundatur. Smegmate aut mordaciore in balneo  
 detergendus, ut uini fece usta, sinapi, pyrethro, pipe-  
 lauri

Historia.



lauri baccis, calce uiua, ⁊ fimi. qb<sup>9</sup> duplū nītri addē.

## De caro. Cap. XIII.

**K**aros est passio, quam sensuum uniuersarumq; motionū priuatio, spirandi facultate manente illēsa, ꝓsequitur. Arabes Subet appellant. Differt ab apoplexia, qđ in hac spiratio uehementer op-  
primatur, sic ut quis uel magno conatu uix spirare possit. In illo aut spirandi facultas, Gal. li. 4. de Patiē. loc. Cap. 2. teste, haud quaquā lēdatur. Distat ēt à le-  
thargo, qđ lethargici interrogati rñdent, neq; oīno muti decūbunt. Caro uero laborātes, somni pfundi-  
tate occupantur, ut si stimulentur, sentiant qđē, nihil tñ dicant, neq; oculos aperiant. Huius passionis fri-  
gidus ac crassus, aut oīno uiscidus humor cā est. Si-  
gna ex iis q̄ dicta sunt innotescunt. pfunditate nāq;  
iōmni occupantur, oculi q̄ in hac passiōe ppetuō cō-  
niuent. Horꝝ uictus ⁊ curatio cū lethargicis ꝓuenit,  
ad maiorem tantū incisioneꝝ attenuationēq; decli-  
namus. Stomacho etiā q̄ calefaciant ⁊ corroborent  
medicamenta adhibenda, de qbus suo dicemus loco.

Caros  
quid.  
Subet.  
Differen-  
tia cari ab  
apoplexia  
Alethargo

Causa.  
Signa.

Victus ⁊  
curatio.

## De catocha ⁊ catalepsi.

## Cap. XV.

**K**ατοχή καὶ καταληψία Græcis, detentio ⁊ deprehē-  
sio Latinis dici pōt. Recentiores medici ꝓgela-  
tionē nominant. Est aut detentio subita ⁊ oc-  
cupatio tū mentis, tūꝝ corporis, sensu ac motu priua-  
ti, egro in ea corporis figura pmanēte, in q̄ fuerit cor-  
reptus, siue sederit aut iacuerit, siue clausis siue aptis  
oculis fuerit. Fit haud sec<sup>9</sup> atq; ꝓora mala, à frigido  
pituitofoq; humor cerebri posteriora potissimū mo-  
lestante. Inuadit hoc mali hoīem subito, uoce ꝓterea  
sensuq; priuatur, nihil audit, nihil rñdet, respiratio  
nulla apparet, sꝫ q̄si mortuus decūbit. Pulsus est par-  
uus, languidus, ac uehemēter densus. Aluus ⁊ urina  
detinent, nō qđē siccitatis rōne (plurimo. n. humido  
egger abundat) sꝫ ꝓꝓ insensibilitatē. Differt à caro, q̄  
ut

Catocha.  
Congela-  
tio.

Causa.

Signa.

catochę di



**Scrimen a** ut in hoc palpebrę perpetuò clauduntur, sic in illa  
**caro.** interdum aperte manent. **Victus ratio** eadem est q̃  
**Victus.** lethargi. egros enim similiter nutrire cōfert, interim  
 diebus singulis interim uno interposito. **Passio** sa-  
 nè hæc periculosa est, si aut cibo aut potu erretur.  
**Curatio.** Huic etiam malo, præsertim si facies rubescit, & uires  
 ualide fuerint, sanguinis missione succurritur. Secan-  
 da autem in cubito uenâ exterior superioruè. Cly-  
 steribus etiam uenter soluendus erit, aliaq; omnia q̃  
 de lethargi curatione suprà diximus, adhibenda.

De apoplexiâ. Cap. XVI.

**Apople-**  
**xiâ quid.**

**A** Poplexia est, ubi patiente cōmuni neruorū  
 principio, omnes corporis particule motu si-  
 mul & sensum amiserunt. Vel est priuatio sen-  
 sus & motus in uniuerso corpore, cum functionum  
 à uoluntatis imperio prodeuntium læsione subito

**Causa.**

superueniens. Fit à frigido, crasso, lentoq; humore,  
 uentriculos cerebri principalissimos una uice & cu-  
 mulatim replente, quę nimie cruditates, ebrietatesq;  
 frequentes potissimum procreant. Fit etiā ob casuz  
 aut ictum, cerebrum concutientes, atq; ut illuc con-  
 fluant humores, efficientes. Aëris etiā frigidi occur-  
 su, qui cerebri humiditates & superuacua coarctat, &  
 constringendo exprimit. Qui in hanc passionē in-

**Signa.**

cidunt, sensu omnino carētes, mortui uiuunt. Qua-  
 propter clausis oculis instar dormientium decum-  
 bunt, atq; stertunt. Interrogati, nihil respondent. Si

**Apople-**  
**xię magni-**  
**tudo.**

stimulentur, nihil sentiunt. Discernitur uerò passio-  
 nis magnitudo ex noxę, quam spirationi infert, ue-  
 hementia: ubi enim naturalem ordinem plurimum  
 egreditur, magnā: ubi autem paulū impeditenti est,  
 paruam in cerebro noxam esse conicere opz. Om-  
 nium uero pessima spiratio putanda est, quę & inter-

**Curatio.**

mittitur & magna cū uiolentia trahitur. Passio hæc  
 nequaquam, aut raro curatur. Neq; enim temere ab

Hip-



Hippocrate dictum est: Apoplexiam fortem soluere impossibile, debilez uero non facile. Qui eius discrimen effugerint, in diuturnam subinde passionem incidere solent, aut quibusdam membris, aut uniuerso corpore resoluti, sepe etiaz ratione uiolata. Qui igitur quoquo modo curationem recipiunt, iis statim sanguis ex utrisq; humerariis, modo plenitudo adsit, et uirium robur, detrahendus est. Alius deniq; clysteribus acribus ducendus, qualis est qui. *℞. Saluie origani, betonicę, rutę. añ. M. i. calamenti, hyssopi, pulegii, añ. M. s. se. feniculi, fesele (si ler montanum nominant) ammi, añ. 3. iii. centaurii minoris. M. i. polypodii. 3. vi. agarici. 3. iii. medullę colocynthidos. 3. ii. Decoquantur in aqua sufficienti, usq; ad medietatis consumptionem. ℞. Colaturę. 3. xiii. hierę picrę, benedictę laxatiue, añ. 3. s. eclegmatis. Indi. 3. iii. mellis rosacei. 3. i. oleorum rutacei, costini, de castoreo, añ. 3. i. salis gemme. 3. i. s. misce, fiat clyster. Comendatur etiam usus glandium (suppositoria nominant Barbari) ex colocynthide, agarico, elleboro, et similibus confectarum. ut. *℞. Pulueris colocynthidos, agarici, ellebori, añ. 3. ii. salis gemme. 3. i. mellis cocti. 3. ii. fiant glandes longitudinis sex digitorum, appenso filo ut ad arbitrium extrahi possint. Post hec totum corpus oleo copioso calido inungendum. Extremis etiaz corporis partibus ligaturę, et frictiones uehementes, cum decocto radice iridis adhibendę. Cucurbitulę etiam humeris affigendę. Caput deniq; prius rasum, irrigandum oleo anethino, rutaceo, aut eo in quo prius serpillū, aut calmintha decocta sit. Naribus admouenda ea quę odore suo excitant, uti est opopanax, castoreum, sagapenū, galbanumq; Sternutamentorum etiam ratio habenda erit, quę ex struthii (cōdisi appellant) ellebori albi, et castorei puluere naribus indito constent. Embrocharum etiam usus conueniet, quę ex chamęmeli,**

2. aph. 42

Clyster.

Glandes.

Remissio.

Odora-

menta.

Sternuta-

menta.

Embrochs

C. li,



Empla-  
strum.  
rubrif-  
icans.

Vomitus.

Vitius.

li, meliloti, saluie, pulegii, maiorane, origani, cala-  
minthe & satureie decocto conficiuntur. Sinapismis  
quoq; utendum (emplastra hodie rubrificantia uo-  
cant) in hunc uel similem modum confectis. R. Olei  
costini. 3. i. oleorum castorei, euphorbii. añ. 3. iii. sina-  
pi. 3. ii. castorei. 3. i. sagapeni, euphorbii. añ. 3. s. aceti. 3.  
i. s. cere q. s. ad incrassandum, fiat emplastrum. Sarta-  
go preterea, ut docet Razes, calefacienda, & capiti ca-  
lida admouenda. Oportet autem & ori per uim aper-  
to digitum uel pennam oleo irino madefactaz infer-  
re, ut ea que insunt eiiciantur. Ceterum sedes etiam  
iis que flatus educunt, ruta, cumino, nitro, & melle il-  
linenda. Vbi passio se remiserit, cibis mollis, distri-  
bui facilis, & succulentus assumetur. Si uox nondum  
redit, & uires permittunt, cucurbitule occipiti cum  
scarificatione affigantur. Si fieri possit, etiam hypo-  
chondriis. Aegri deinde gestabuntur curru, lectica,  
aut lecto pensili. Potus sit hydromeli. Post uigesimu-  
primum diem, egroti balneo credentur. Sed de reli-  
qua curandi ratione in Capite sequenti plura.

### De resolutione. Cap. XVII.

Resolutio  
quid.

Cause.

**I** Αγάλνσις Græcè, resolutio latine, est, Gale. li-  
3. de Patientib. lo. Cap. 10. autore, ubi alteru-  
latus, aut dextrum aut sinistrum, sensum & mo-  
tum amiserit. Interdum etiam in una duntaxat parte,  
manu scilicet, crure, lingua, accidit. Quum uero per  
resolutionem interdum sensus duntaxat, interdum mo-  
tus, nonnunquam ambo simul pereant (cuius rei cau-  
sam reddit Gale. lib. 1. de Symptomatum causis, Cap.  
4.) neruorum resolutio potissimum dicitur, ubi mo-  
tus deperditus est. Generatur quidem à multis cras-  
sis & uiscidis humoribus, neruos obstruentibus, im-  
pedientibusq; ne animalis facultas è principe parte  
ad membra delabatur. Hac ratione refrigeratio ex ni-  
ue, compressio neruorum corporum, resolutione  
effi.



efficere possunt. Ad eius passionis notitiam non opus est multis indiciis. si enim motu pars aliq̃ corporis destituitur, resolutione affecta esse nemo non uidet. A qua uero causa factus sit morbus, partim ex egri relatione, partim etiaꝫ ex notis supra de dolore capitis ex pituito sis humorib. orto cōmemoratis, deprehendere licebit. Viētus ratio in uniuersum attenuatoria fit, et ficans. Versetur igitur eger in aēre calido et sicco, primisq; tribus dieb. tenuissimo utatur uiētus, hoc est omnimoda mediam sustineat, aut solius melicrati exhibitione, aut ptisanę succo pauco contentus sit. Dein cibi boni succi, et concoctu faciles, affiq; exhibendi, auum potissimum carnes montanarum, et perdicū, oua sorbilia, amygdalę, et pineę. Utatur etiam fœniculo, petroselino, hyssopo, maiorana, saluia, et satireia. Vitet pisces, fructus, et omnia frigida et humida. Potus sit modicus, sitimq; quam possunt maximam sustineant. Bibant autem hydromeli, cui saluia aut cinnamomum admixtū sit. Aut utantur potione quę hodie Hippocras nominatur, sic confecta. ℞. Cinnamomi. ʒ. ii. zingiberis. ʒ. s. pipe ris longi, granorum paradisi, acori (galangā uocat Barbari.) añ. ʒ. i. cardamomi. ʒ. i. s. nucis myristicę, gal ryophyllorum, maceris. añ. ʒ. i. Decoquatur in aque fontanę lib. vi. quoad quarta pars, hoc est lib. i. s. fuerit absumpta. Refrigerata colentur et exprimantur, ac sacchari lib. s. dulcescat liquor colatus, et fiat potio. Vino nō utatur, donec morbus ex integro deficiat. aut si fieri uix possit, ut tanto tempore eger uini potione careat, detur qdē, at non nisi modicū, aquo sumq; et in morbi inclinatione. Motus et exercitiuꝫ, si iis uti poterit, summē conferunt. Somnum fugiat diurnū, nocturnus sit mediocris. Gaudeat, et animi perturbationes euitet. Curandi ratio, si iusserit etas habit⁹ corporis, tēpus anni, et similia, a sanguinis missione auspicetur, potissimū si plenitudinis signa af-

Signa.

Viētus

Hippo-  
cras.

Curatio.

C ii fuerint.



fuerint. Oportet tamen ablationem esse moderatam,  
 ne corpus refrigeretur, sanguisq; à partibus incolu-  
 mioribus auferendus. Quibusdam uero dieb; post  
 clyster. sanguinis missionem transactis, aluus primò clyste-  
 rib; irritetur, huiusmodi aut similibus. R. Maluë, al-  
 theë, mercurialis, camomillë, saluie, betonicë, añ. M.  
 1. stichadis arabicë. 3. i. rutë, calaminthë, añ. M. s. se.  
 fœniculi. 3. iii. Decoquantur in aqua, quoad tertia  
 pars absunatur. R. Colature lib. i. benediçtë laxati-  
 uë. 3. s. electu. Indi. 3. iii. mellis rosacei. 3. s. oleorum  
 laurini, irini, rutacei, añ. 3. i. salis. 3. i. s. misce, fiat ene-  
 ma. Dein decocta & syrupos, pituitosos humores ad  
 expulsiõem preparantes, exhibebis, quorum copia  
 supra Cap. 8. habetur. Præparatis ad educcionem hu-  
 moribus, quë illos euacuent propinanda medicamē-  
 ta erunt: qualia sunt, prætesea quë Cap. iam citato  
 commemorauimus, pilulë azaiaret, arabicë, foetidæ,  
 quibus nunq; non agaricum admiscendum erit. Nō  
 autem semel, sed iterum atq; iterum purgandi sunt  
 egri, diebus quatuor uel quinq; interpositis. Post  
 purgationes uero, theriaca & Mithridati antidotus  
 utilissima est. Post totius corporis euacuationem,  
 sternutamentis, apophlegmatismis, gargarismis, odo-  
 ramentis, & aliis Cap. 8. productis utendum. Capitū  
 deniq; unde totius morbi radix exoritur, calida me-  
 dicamenta illinenda erunt: ut sunt castoriū, peuce-  
 dani radix, menta, baccë lauri, irino oleo, cui parum  
 aceti adiectum sit, incocta. Quod si itaq; aëris am-  
 bientis frigiditas nō impediāt, caput radatur, totūq;  
 usq; ad frontem inungatur. Ceterum ea etiā quæ  
 discutunt medicamenta, iis locis unde nerui ad pa-  
 tientem partem sensum aut motum, uel utrunq; de-  
 ferentes oriuntur, admouenda erunt, quemadmodū  
 Gale. lib. 3. de Affec. lo. Cap. 10. eleganti historia de  
 Pausania sophista docet. A leuioribus uero semper  
 auspicandum, nempe ab oleo chamemelino, anethi-  
 no,



no, de spica, liliaceo, & irino, quibus etiam membra ipsa affecta fouenda sunt, quæ etiam hoc nomine ut calefiant, linteis, aut pelle uulpina, & similib. operienda erunt. Aut cum decocto saluie, maioranæ, chamemeli, hyperici, stichadis & rosmarini fouenda. Progre diendum deinceps ad ualentiora, oleum costinum, uulpinum, rutaceum, laurinum, de uermibus, de castoreo, de laterib. (quod philosophorum etiã nominant) & de euphorbio. Quibus interdum adiiciuntur unguenta Agrippæ, marciaton, arragon, & alia medicamenta simplicia calida, ut est betonica, saluia, rosmarini flores, radix acori (galangam nominant) uerbasculum odoratum (herbam paralysis uocant) ruta, calamintha, pyrethrum, piper, castoreus, & euphorbium, in hunc aut similem modum. R. Vnguentorū arragon, marciaton. añ. 3. i. unguenti Agrippæ. 3. s. oleorum costini, uulpini. añ. 3. v. olei de uermib. 3. s. olei de castoreo. 3. i. s. pulueris betonicæ, piperis, saluie. añ. 3. i. castorei, euphorbii. añ. 3. s. radicis galangæ. 3. ii. cere quod sufficit. fiat unguentum. Vel sic. R. Oleorum costini. 3. ii. de piperibus. 3. i. s. olei de euphorbio. 3. ii. uini sublimati (aquam uite aliàs uocant.) 3. ii. s. succorum saluie, uerbasculi odorati, hoc est herbe paralysis. añ. 3. i. s. radicis galangæ. 3. iii. stichadis arabicæ, florum rosmarini. añ. 3. ii. pyrethri, piperis. añ. 3. i. euphorbii. 3. s. Contundantur contundenda, & omnia simul quoad uinum & succi absumantur, decoquantur. Dein exprimantur olea, & addatur cere quod sufficit, fiat unguentum molle in modum linimenti. Eadem etiam ratione emplastra componi possunt, in eum uel similem modum. R. Baccarum lauri, pyrethri, piperis. añ. 3. ii. galangæ. 3. i. stichadis arabicæ, betonicæ, sambuci. añ. 3. i. s. sinapi, nigellæ. añ. 3. i. euphorbii, castorei. añ. 3. i. olei costini. 3. i. s. de piperibus. 3. i. olei de euphorbio. 3. iii. cum cera & resina quod satis est, fiat emplastrum. Porro membris

Vnguentum.

Aliud unguentum.

Emplastrum.

C iii affe



**Cucurbit.**  
**in a.**

**Balneum.**

affectis cucurbitule sunt applicande, citra tñ scarificationem. Et si cucurbitulis idonea nō fuerint, uincinis imponendę. Post cucurbitulas prędictis unguētis & linimentis, sic tamen ut prius fricentur membra affecta, utendum. Neq; parua utilitatem præstabit laconicum: & si haberi possunt thermæ sulphuræ, aluminosæ, & salsuginosę supra modum cōferent, quales sunt in Germania nostra Badenię, Fering iuxta syluam Martianā, & Cēllenses, quas gestationes in curru, uehiculo, aut lectica pcedere debēt.

De morbo comitali.

Cap. XVIII.

**Epilepsia**

**Comitalis**  
**morbus.**

**Causę.**

**E**ΠΙΛΗΪΑ Græcis dicta est hæc passio, quod nimis rum sensum capitis, atq; mentem, pariter apprehendat. Comitalis autem, quod hac passione correpti, in comitiis maxime manifestabantur, comitiāq; quo die aliquis concidisset, interrompebantur. Est autem, Galeno lib. 3. de Patientib. loc. Cap. 5. teste, conuulsio omnium corporis partium, non perpetua, sed quę ex temporum accidit interuallis, cum mentis ac sensuum oblesione. Gignitur hæc passio trifariam. Primum, ubi cerebrum primogenia passione patitur, id quod fit, ubi crassus uiscosusq; pituitę uel atre bilis humor spiritus meatum in cerebri uentriculis obstruit, neruorum principio seipsus quatiente, quo excutiat id quod noxium est. A crasso autem humore hanc passionem induci, argumento est, quod & subito fit, & soluitur confestim. Secundo fit per consensum oris uentriculi male affecti, dñ scilicet cerebrum excutere nititur, quicquid ad illud à stomacho eleuatur. Sic Galenus lib. 5. Cap. 5. de Patientib. locis, Grammaticum quendam iuuenē fuisse scribit, qui quoties uel nimis uehementer doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceretur, comitali passione corripiebatur: idq; non alia ratione, quàm quod os uentriculi, utpote quod facie



facile sentiebat, pateretur, ac deinde per consensum  
 ⁊ totum cerebrum, ⁊ corpus uniuersum conuulsio-  
 ne concutiebatur. Tertio fit, sed raro, cum à parte ali-  
 qua ueluti quæda; frigida aura sentiente egro ad ce-  
 rebrum usq; ascendit. Hoc genus passionis comitia-  
 lis, Galenus lib. 3. de Patientib. lo. Cap. 7. scribit se ui-  
 disse in puero, qui tertiumdecimum ætatis annū age-  
 bat. Cum enim adolescens etiamdum cum optimis  
 eius tempestatis medicis conuenisset, ad idoneam in-  
 ueniendam curationem, audiuit tum narrante pue-  
 ro, affectum ipsum à crure initiū capere, mox illinc  
 rectā ascendere per femur, ⁊ imminentes illi lumbos  
 ac per latera ad ceruicem, donec ad cerebrum perue-  
 niret: quod cum primum tangeret, ipsum haudqua-  
 quam sibi constare. Precedit hanc passionem corpo-  
 ris animiq; status minime uoluntarius, tristitia, eo-  
 rum quæ perceperunt obliuio, turbulente insomnio-  
 rum imagines, capitis dolor, eiusq; repletio conti-  
 nua, iracundia, pallor faciei, ⁊ lingue inordinatus  
 motus. Quamprimum inuasit malum, egri conci-  
 dunt, conuellunturq; , stertunt, ac uociferantur in-  
 terdum. Nonnulli tremunt, atq; circumaguntur.  
 Sed peculiaris admodum morbi nota est oris spuma.  
 Non desunt etiam, quibus urina ⁊ stercus præter uo-  
 luntatem excernitur, nonnullis ⁊ genitura. Quibus  
 ab ore uentriculi uitium oritur, palpitatio ipsius præ-  
 cedit, turbatio ⁊ erosio. Ex inedia seu cibo tardius  
 assumpto, excandescunt, ⁊ affliguntur. Occupat hoc  
 passionis genus maxime pueros, eosq; adhuc paruulo-  
 s, quod uidelicet humidior cerebri temperamen-  
 to præditi sint: quam ob causam πεισινός, hoc est,  
 infantilis seu puerilis morbus nominat. In quibus  
 acutissima est passio, statim iugulat, ⁊ crebris accessio-  
 nibus, ⁊ symptomatum uehementia. Plerisq; autem  
 longa esse solet. Nam si non pubertate, uel menstru-  
 rum initio, uel puerperio solutus fuerit, sepe usq;

C. iiii ad

stigma.

Pueri cum  
passione  
comitiali  
corripiantur.

s. aph. 7.



*uictus.*

ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medicur-  
 rationez fuerit affecutus. Ratio uictus utilis est,  
 quæ incidit, & extenuat. Aëris itaque constitutio, in  
 quo eger uersetur, sit calida & sicca, potissimum si à  
 pituitoso oriatur humore. Capparis esus mirifice p-  
 dest. Fugere oportet carnes omnes, præter auium mō-  
 tanarum: legumina, pisces, & uinum, præsertim anti-  
 quum crassum & copiosum. pro quo bibat hydrome-  
 li, aut uinum aquosum & dilutum, Exercitia pro sunt  
 & frictiones, sed capiti post omnes reliquas corpo-  
 ris partes adhibite. In balneo mora diuturna obest.  
 Deuitet coitum liberaliorem, moderatus autem p-  
 dest. Somnus sit nocturnus & mediocris, caueat im-  
 pensè diurnum. Fugiat sinapi, allia, cepas, & eiusmodi,  
 potum statim à balneo, potissimum uini meracio-  
 ris. Si infans egrotus fuerit, non admodum medica-  
 mentorum præfidiis subuenire studebimus. nam æta-  
 te ad calidiorem siccioremq; statum uergente, & ui-  
 ctu moderatiore, sua sponte plerunq; morbus fini-  
 tur, Hippocrate quidem teste, qui sic scriptum reliquit:  
 Quicunq; iuuenes passione comitiali laborant, mu-  
 tatione maxime ætatis, & temporum, & locorum, &  
 uictum quoq; liberantur. Proinde solius nutricis  
 ratio habenda erit, ac lac illius emendandum, utq;  
 calidius & subtilius efficiatur conandum. Quapro-  
 pter nutrix boni succi cibus utatur, ante cibum exer-  
 ceatur, coitum uitet: à uiri siquidem consuetudine  
 lac odoris gratiam in deterius mutat, & humidius  
 efficitur, ac menstrua eliciuntur: & præscripta pau-  
 lo antè uictus ratione utatur. Capita tamen infan-  
 tium assidue oleo anethino, & irino inungenda, neq;  
 unquā uel calida aqua uel frigida lauanda, multo mi-  
 nus tota immergenda, madefaciendaq;. Dato etia;  
 ad elingendum mel deispumatum, ac collo suspen-  
 dito radicem pæoniæ uiridem. Qui post annos pue-  
 riles in passionem hanc prolabuntur, eorum partes  
 con-

*Curatio  
infantiū**2. aph. 45**Curatio a-  
dultorum.*



onuulſe ac diſtracte inungi, irrigari, ⁊ in rectum di-  
 gi debent. Deinde os aperiendum, cuneusq; denti-  
 us interponendus, ac penna oleo irino illita, pitui-  
 e extrahendæ gratia, uomitus prouocandus. Odo-  
 ramentis etiam ſenſum excitare conuenit, peuced-  
 o uidelicet, ruta, ⁊ bitumine. Perſeuerante exacer-  
 ratione, medicus audacter ⁊ uiolenter illorum ma-  
 illas diſtrahat, infundatq; in os caſtoreum cuꝝ oxy-  
 nelite. Clyſterem etiam acrem excitatis iam iniicere  
 oportet. Qui conualeſcunt, uiribus antea recreatis,  
 hiera Galeni, aut ex colocynthide purgandi ſunt.  
 Hæc ſanè noui ⁊ acuti morbi comitialis curatio eſt.  
 Deinceps quomodo inueterato ſuccurratur, trade-  
 mus. Oportet egros diu aquam bibere, atq; initio cu-  
 rationis, niſi quid prohibeat, ſanguinem ex uena po-  
 plitis mittere. Interpoſitis quatuor aut quinque die-  
 bus corpus reficere, ac medicamenta extenuantia p-  
 pinare expedit, ſyrupum de abſinthio, de hyſſopo, de  
 ſtichade, oxymeli ſcylliticum, decoctum hyſſopi, ra-  
 dicis pæoniæ, ⁊ alia quæ ſuprà Cap. 8. commemora-  
 uimus. Dein purgantibus medicamentis uacuandi  
 ſunt, nempe pilulis cochiis, de agarico, ⁊ ſimilib. lo-  
 co iam citato productis: idq; ſi pituitoſo humore  
 paſſio orta fuerit, faciendum. Si uero ab atra bile cœ-  
 perit, ea quæ humorem hunc uacuare poſſunt exhi-  
 benda, quæ in Cap. de Melancholia recenſebūtur.  
 Vbi ſatis purgatus eſt æger, ad balneum ducendus.  
 Tertio die hypochondriis ⁊ ſcapulis cucurbitulæ  
 cū ſcarificatione affigendæ ſunt, tum quibuſdam die-  
 bus corpori reficiendo interpoſitis, rursus hiera Ga-  
 leni purgandus erit. Poſtea capiti ⁊ occipitio cucur-  
 bitulæ admouendæ. Sequenti die panis in muſſa co-  
 ctus, additis amygdalis amaris, aut ſerpyllo, aut cala-  
 mintha, aut menta, aut ruta, cataplaſmatis inſtar ca-  
 pitū applicandus. Atq; id tribus diebus efficies. Mox  
 caput deraſis capillis, peucedani ſucco in aceto dilu-  
 to,

Curatio  
 comitialis  
 inueterata  
 Prepara-  
 tio.



*Discutienda medica  
menta.*

*Curatio  
epilepsie  
ex stomachi  
vicio.*

*Si a particula  
qua  
dam ori-  
tur mor-  
bus.*

*Incubus  
quid.  
Causa.*

to, in quo serpyllum, aut iris incocta sit, perungendus. Rursus interea corpore recreato, purgandus eger erit. Quo peracto, sternutatoria, apophlegmatismos, et ea quę per nares purgant adhibebis. Tempore interposito, si necesse uidebitur, clystere alius eluenda erit. Tandem unguenta, linimenta, et emplastra, quibus discutiendi uis inest, applicanda: quorum in precedenti Cap. mentio facta est. Quędam denique sunt medicamenta, quę nature quadam proprietate comitiali morbo aduersantur: ut est radix pęonię, uiscus quercinus, cornu ceruinum, ossa humana coacta, et alia multa quę recensentur a recentioribus. Si uero ob passionem primarię stomachi passio comitialis contingat, sollicitudo habenda est, ut eger perbe concoquat. Panis igitur diligenter confectus, ex uino antiquo tenui et albo, cum aliquo eorum quę leniter adstringunt temperato, circa horam tertiam diei assumendus. Item hieram picram bis ternę singulis annis dare expedit, ut copiose cum de stomachi morbis agetur, dicemus. Vbi autem ex particula quadam hec passio inuadere percipitur, siue ea manus, siue pes fuerit, fune excipiendi debet quę superposita est. Cum remittit, peracta totius corporis inanitiõ, prius inunctionibus exca lfacere corpus oportet. Deinde medicamenta quę rarefaciunt, et malam temperaturam partis, unde malum oritur, emendant, apponenda. Succedente etiam tempore sinapismis locus irritandus erit. Post quę theriaca, et nalia balnea locum obtinent.

*De incubo.*

*Cap. XIX.*

**E**φιάλτης Gręcis passio, quam Latini incubum et incubones nominant, ubi aliquis noctu se grandi mole opprimi, inuadique ab alio credit. Fit id uitii ex crapula, et continua uentriculi cruditate, unde uapores crassi et frigidi eleuati, cerebri uentriculos replent, prohibentes facultates cerebri per nervos



Signa

os diffundi. Comitatur eo detentos difficilis mor-  
 is, torpidus in somno sensus, suffocationis imagi-  
 natio, et ueluti ingruentis alicuius occupatio. Ad-  
 ge uox suppressa, aut incerta indiscretaque editur.  
 Quidam ita inanibus imaginibus afficiuntur, ut in se  
 rassatos audire credant. Cum plurima tandem an-  
 ietate attenuato spiritu et discusso, atque apertis mea-  
 ribus, repente excitantur. Occurrendum igitur huic  
 malo per initia. Nam perseverans, et assidue inuadens  
 rarius aliquod malum, ut apoplexiam, morbum  
 comitalem, aut maniam preannunciat ac inducit, cras-  
 so humore in uentriculis cerebri sensim collecto.  
 Victus itaque sit tenuis, et qui flatus minime generet.  
 Vino non utatur, nisi aquoso. Somnum fugiat diur-  
 num, nec statim a comestione cubitum eat: atque ut sum-  
 natim dicam, totus victus talis sit, qualis est eorum  
 qui comitali morbo laborant. Curandi ratio, si  
 plenitudo fuerit, totius corporis a sanguinis detra-  
 ctione auspicanda. Cubiti autem uena exterior se-  
 cundanda est. Sin cacochymia affuerit, purgationibus  
 corpus uacuandum. Si tamen pituita redundet, humores  
 extenuantibus medicamentis ad purgationem prepa-  
 randi sunt. Purgato corpore localia adhibere medi-  
 camenta oportet, ut in precedentibus monstratum est. Suc-  
 currit eisdeque semen peronie nigrum. Danda uero sunt  
 potui grana quindecim, trita ex aqua. Caput et fo-  
 uendum anethino oleo calido, et pileo tegendum, dum  
 cubitum eunt. Intra corpus exhibenda, que caput cor-  
 roborant: aromaticum rosaceum, diamoschi dulcis co-  
 sectio, plirisarcoticon, diabre, diathos, et eiusmodi.

Victus.

Curatio.

Localia.

## De melancholia. Cap. XX.

**M**elancholia mentis est alienatio, seu desipien-  
 tia, sine febre. Fit interdum quidem uniuersa  
 in uenis sanguine melancholico effecto, ob  
 commune sane uitium, cerebro quoque ipso simul lesa.

Melancholia quid.  
 Causa.

Nonnulli



Nonnunquam uero, quando reliqui corporis sanguis prorsus innocuus est, solus autem is qui in cerebro contentus est, alteratur. Idq; bifariam cōtingit. Aut enī aliunde in ipsuz deriuatur, aut in ipso melgenita est, quum uidelicet internus calor aut flauabilem, aut crassum atrumq; sanguinem superassauit. Interdum etiam ob inflammata & male affecta circa uentriculum hypochondria prouenit, quę modo auram quandam maligniorem, modo substantiæ humoris partem ad cerebrum sursum transmittunt.

Quemadmodum enim aliqui frequenter eleuata à uentriculo fuliginosa quadam aut fumosa exhalatione, aut omnino crasso uapore quidpiam suffusio ni simile præ oculis obici sentiūt: sic ascendente ad cerebrum melācholica exhalatione, tanquam fuligine aut fumo, melancholica symptomata circa men-

**Tres me-** tem accidunt. Atq; adeò tres sunt in uniuersum me-  
**lancholia** lancholię species. Vna, quando totum corpus melā-  
**species** cholico sanguine abundat. Altera, quando idem ce-  
**aut diffe-** rebrum ipsum solum occupat. Tertia, quando hypo-  
**rentia.** chondria ipsa primo male affecta, in consensum ce-  
**Signa cō-** rebrum ducunt; & hæc melancholię species hypocho-  
**munia.** driaca & flatuosa dicitur. Communia omnium, iux-  
**6. aph. 23** ta hoc Hippocraticum: Si timor atq; mœsticia lon-  
**Melancholico-** go tempore habentes perseuerent, ex eo atra bilis fi-  
**licoruz uari-** gnificatur. Item alii se credunt animalia bruta esse, &  
**et imagin-** uoces ipsorum imitantur. Sic Galen. lib. 3. Cap. 6. de  
**nes.** Patientib. loc. scribit fuisse quendam, qui se gallum  
 esse putauit: ideoq; gallos cantare audiens, ut hi ala-  
 rum, sic ille brachiorum plausu latēra quatiens, gal-  
 lorum sonum imitatus est. Alii uasa fœtilia & testas  
 se esse arbitrantur, atq; idcirco obuiatib. ne collidā-  
 tur cedunt. Hi mortem expetunt, illi eandem expaue-  
 scunt. Nōnulli semper rident, Democritumq; agūt:

**Signa.**  
**Peculiaris**

aliqui Heraclitum, semper plorantes. Alii putant se  
 numine afflatos esse, & uaticinantur futura. Peculiaris  
 res.



autem note illorum he sunt Qui ex totius cor-  
 poris consensu melancholia laborat, iis gracilis cor-  
 poris habitus niger, hirsutus, et ex toto melancholi-  
 cus, uel natura, uel ex acquisito per solitudines quies-  
 centium, aut uigilias, aut prauorum ciborum esus, aut he-  
 morroidum, aut menstruorum suppressionem. At qui  
 hypochondriis uitium contraxerunt, eos sane cru-  
 ditates, acidi ructus, ardor, hypochondriorum gra-  
 titas arguunt, hypochondria quoque sursum con-  
 pelluntur, et nonnunquam inflammatione conflictan-  
 tur, idque potissimum circa mali exordium. Deinde ubi  
 ipsum accreuerit, atque bilis comitantur symptoma-  
 ta, que utique concoctione, uel excretionem, uel mul-  
 tis flatibus, uel uomitu, uel ructu leuantur. Quorum ue-  
 ro nullum ex iis, aut certe pauca circa uentriculum  
 ueniunt, melancholica que apparent signa cerebrum  
 per se et primaria passione uexari, atqueque bilis humo-  
 re affici declarant. Hi autem inter cetera, unam aliquam  
 rem fixis ac intentis in eam prorsus oculis, diutius  
 intuentur. **Victus** ratio talis fit, quæ atram bilem mi-  
 nime procreet: quapropter in aere uersetur calido et  
 humido. Cibus uescatur boni succi, humidis et tem-  
 peratis, pane in clibano cocto ac probe confecto, car-  
 nibus caponum, gallinarum, perdicum, phasianorum,  
 piscibus saxatilibus, et eiusmodi. Vitet cibos qui melan-  
 cholicum efficiunt humorem, quos diffusè Galen.  
 lib. 3. de Patientibus. Io. Cap. 6. commemorat. Vinum  
 bibat tenue, album, neque ualde antiquum: crassius ue-  
 ro et nigrum uitet. Exercitium sit mediocre, equita-  
 tio aut deambulatio per loca amœna et uiridia, aut  
 nauigatio. Balneo aque dulcis, quo se uno presidio  
 cum uictu humido, Galenus morbum hunc, ubi non  
 dum in longum esset protractus, curasse scribit, fre-  
 quenter utatur. Somnus illi supra modum confert,  
 ueluti etiam coitus, ad moderatus. Gaudeat et lete-  
 tur, in hocque habeat qui cantu aut aliis musicis in-  
 stru-

Victus.

at



Curatio

strumentis hilaritatem excitent. Vbi uniuersum corpus sanguine melancholico abundauerit, curandi rationem à uenę sectione auspicari oportet. Secunda autem est, Galeno loco iam citato teste, cubiti uena: precipue autem media, quę scilicet communis est et ei quę humeraria nominatur, et ei quę per axillam ad manum fertur, iecoriaq; dicitur. Vbi uero solum cerebrum sanguinem melancholicum cōtinet, eger sanguinis detractio non indiget, nisi forte multum sanguinis sit, ac pręseruationis gratia uenā incidamus. Quum itaq; ex primaria cerebri passiōe melancholici efficiuntur, frequentibus balneis, uictu boni succi, et humido, et minime flatuoso, unā cū decenti animi delectatione, sine alio potentiori remedio curandi sunt: cum humor qui molestat, nondum ob temporis longitudinem ut excernatur contumax est. Si enim malum aliquandiu durauerit, tū ualentiora magisq; uaria medicamēta adhibere oportet. Siue igitur ex totius corporis consortio, facta prius, ut diximus, sanguinis detractio: siue solius cerebri primario affectu melancholia orta fuerit, medicamenta quę per inferna purgāt exhibere oportet. Interpositis tamen aliquot à uenę sectione diebus, hoc decoctum in aurora bibat, quod. R. Floru boraginis, buglossę, uiolearum. añ. M. i. passularum mundatarum. ʒ. i. hemionitidos (scolopendriam uocant.) M. i. fumiterre. M. s. corticum radicum cum capparum, tamaricis. añ. ʒ. iii. radicum fœniculi, petroselini, glycyrrhizę. añ. ʒ. i. thymi, epithymi. añ. ʒ. s. Decoquantur singula in libr. iii. aque, donec tertia pars absumatur, dein colentur, atq; saccharo sufficienti dulcescat colatura, et adiiciantur syrupi de fumo terre, syrupi de epithymo. añ. ʒ. ii. et fiat potio. In eundem usum hodie exhibent syrupum uiolaceum, de buglossa, adiectis aquis scolopendrię, lupi salictarii, intybi domestici (endiuiam appellant) et buglossi.

decoctum  
pręparans.



glossi. Ego tamen aquarum distillatarum et ignis co-  
 nertio expressarum usum, uentriculo potissimum,  
 noxium esse arbitror. atque adeo multo consultius esse  
 uto, ut predictarum herbarum decoctis utamur, ac  
 syrupis in hunc modum ammisceamus. R. Syrupi de  
 buglossi. 3. i. Syrupi de epithymo. 3. s. Decocti scolo-  
 dendrie, fumiterre et endiuie. 3. iii. misce, fiat potio.  
 Post hec corpus purgetur eclegmate hamech appel-  
 lato, et diasene: catapotii Indis, de lapide armeno, et  
 similib. Proderit autem hoc decocto purgante uti.  
 R. Florum buglossi (boraginem hodie appellant) flo-  
 rum uolarum et rosarum. an. M. i. passularum mun-  
 datarum, tamarindorum. an. 3. i. myrobalanorum ce-  
 ruleorum (indos uocant) luteorum (citrinos nominat)  
 empeliticorum, beletzicorum. an. 3. s. folliculorum sen-  
 e polypodii. an. 3. vi. prunorum damascenorum nume-  
 ro. x. Coquantur in aqua sufficienti, ad tertias. Dein  
 coletur, et saccharo dulcescat colatura, et de ea exhi-  
 beantur. 3. iii. In quibus si non satis purget, licebit  
 dissoluere. 3. ii. eclegmatis diasene. Mirifice etiam co-  
 fert dilutum epithymi, in eum modum compositum.  
 R. Epithymi. 3. s. maceretur in. 3. iii. feri caprini, ho-  
 ris. 24. dein ualide exprimatur et coletur, atque in auro-  
 ra propinetur. Et hoc, quod. R. Foliorum sen-  
 e prunorum damascenorum numero. xii. Contundan-  
 tur et macerentur in sero caprino horis uiginti qua-  
 tuor, deinde exprimantur et colentur, ut supra. Lice-  
 bit et hoc puluere uti, qui. R. epithymi. 3. s. lapidis ar-  
 menii, agarici. an. 3. ii. scamonie preparate. 3. i. gario-  
 phyllorum numero. xx. Redigantur singula in pulue-  
 rem, et detur singulis septimanis. 3. i. uel. 3. i. s. Neque  
 temere etiam quis a purgatione interiectis quibusda-  
 diebus clysteribus utetur, ut quod a capite auertere pos-  
 sint. R. Fumiterre, lupi salictarii, thymi. an. M. i. epi-  
 thymi. M. s. sen-  
 e polypodii. an. 3. vi. cartami. 3. s. semi-  
 num anisi, foeniculi, ammi, cumini. an. 3. ii. Coquan-  
 tur

decoctum  
purgans.

Dilutum e  
pithymi.

Dilutum  
foliorum  
sen-  
e.

Puluis.

Clyster.



tur usq; ad tertias. ℞. Colaturę lib. i. Casię fistularis recens extractę. ʒ. i. eclegmatis diasenę. ʒ. s. oleorum uiolacei, camomillę. añ. ʒ. i. s. salis communis. ʒ. i. s. misce, fiat clyster. Porro si hæmorrhoidibus aut mē- sibus suppressis malum fuerit concitatum, horum quoq; purgationem moliemur, Hippocrate sic præ- cipiente. ait enim: Atra bile uexatis, hæmorrhoides superuenientes bonum. Et rursum: Insanientib; si ua- rices uel hæmorrhoides superuenerint, insanie solu- tio. Ceterum danda etiam sunt medicamenta quę leticiam pariunt, atq; uires reficiunt: ut sunt conser- uę buglossi seu boraginis, intybi domestici, uiolarū, letificans Galeni uocatum, dianthos, et similia. Nul- la deniq; ratioe, ut antea quoq; monuimus, balneo- rum dulcis aquę usus negligendus. Embrochę etiā, quę caput humectare possunt, adhibeantur. ℞. Mal- uę, althę, uiolarum. añ. M. i. s. camomillę, stichadis arabicę. añ. M. i. florum nymphę. M. s. se. lactucę. ʒ. i. Buliant in aqua sufficienti, et fiat embrocha, quę ra- so capiti admoueat. In hunc etiam usum conue- nient inunctiones ex oleo uiolaceo, nymphę, et si- milibus. Studiose deniq; annitendum, ut imagina- tiones peruersę et immensa mœsticia, quacunq; fieri potest ratione propulsentur. In hunc sanē modum Alexander Trallianus lib. i. Cap. 22. mulierem quan- dam sanitati restituit: quę melancholię malo corre- pta, inter dormiendum anguem se deglutisse puta- bat. Ciens enim ei uomitum, anguem extinctum pel- uī, qua uomitionem excipiebat, clandestine inseruit: quę simulatq; conspexisset melancholica, euomuis- se rata, omnem suspicionez fallam posuit, et salua eua- sit. Pręterea si ob hypochondriorum offensionem passio constiterit, et horum habenda sollicitudo erit. Fouebuntur itaque rutę, anethi, absinthii, pulegii, agni seminis, baccarum lauri, et similibus decocto. Hęc etenim dolores quoq; leniunt, et discutiunt fla- tus,

6. aph. 11

6. aph. 21

Corrobo-

rantia.

Balnea.

Embro-

cha.

Hystoria.

Hypo-

chondria-

ce melan-

cholia.

Curatio.



us, potissimum si oleo incocta affectę parti cataplas-  
natis instar applicantur. Preter hec tamen cataplas-  
natis insint etiam ea, quę flatibus discutiendis con-  
ducunt, nempe apium, anisum, cuminum, uel ligusti-  
cum: leuisticum uocant. Cum hec admoues, longo  
tempore per diem et pasto et ieiuno adherere fines.  
Vbi ademeris, aliud quoddam operimentum super  
accommodato, lanam scilicet latiore. Cucurbitu-  
lis etiam ad flatus digerendos leuib. hoc est, citra sca-  
rificationem utitor. Videbitur enim cibi presidium  
hoc, Galeno lib. 12. Ther. meth. authore, in huiusmo-  
di affectu incantamenti cuiuspiam simile quid effice-  
re. Illico enim cucurbita admota, qui spiritu flatuo-  
so cruciantur, tum a dolore liberi, tum omnino sa-  
ni redduntur. Porro ad dolores inflammationesq;  
cum scarificatione. Quibus uitium inueterauerit, p-  
sentissimum est remedium per uomitum purgatio.  
Non tamen ualidis uomitoriis utendum: talia eni-  
infesta sunt, stomachoq; anxietatem afferunt. Con-  
citetur igitur uomitus cum aqua tepida, cui oxyme-  
li sit admixtum. Quod si tamē neq; hoc modo pos-  
sunt euomere egri, digitos aut pennas demittendo  
irritare oportet. Proderit autem iis unicē uomitus,  
qui per elleborum album fit, in hunc modum. ℞. El-  
lebori albi. 3. i. Concidatur in minutas particulas, et  
raphano satis magno indatur. Transactis trib. die-  
bus iterum eximatur, raphanusq; fortiter exprima-  
tur. dein accipe succi ex raphano expressi. 3. vi. aque  
calide. 3. iiii. oxymelitis. 3. i. et totum calidum ægro  
propinato. Vel in hunc, qui. ℞. Ellebori albi optimi  
3. iiii. et raphano prius perforato inserantur infigan-  
turuē, ac ibi noctem unam integram dimittantur.  
Postridie ubi in raphanum uires ellebori migraue-  
rint, amoto elleboro raphanus in minutas ptes dis-  
sectus, in oxymelite exhibeatur, diligenter cauendo,  
ne ellebori quidpiam in raphano relinquatur.

D De

Vomit  
ut conci-  
tandus.



conuulsio  
quid.

**Σ**πασμὸς Græcè, conuulsio Latine, est, ubi ner-  
ui atq; musculi præter uoluntatem conuellun-  
tur, in eamq; dispositionem ueniunt, quam et  
in motibus secundum arbitriū factis assumpserūt.  
Vel breuius, ut definit Galen. lib. 2. de Symp. causis  
Cap. 2. conuulsio est, quæ neruos musculosq; ad eun-  
dem cogit affectum, in quem ab animali facultate,  
quum naturalem habitum seruarent, ducebant. Eius

τῆ τανος

autem tres sunt species. Τῆ τανος, quum ceruix unā cū  
reliquo corpore immobilis manet, et in neutram par-  
tem inflectitur, sed iuxta in utramq; partem recta in-  
tenditur. Latini uocant distentionem, Celsus rigo-

Εἰ μπρο-  
σθότος  
νος.

Οπισθό-  
τος.

Causæ.

6. aph. 39

re. Εἰ μπροσθότος, quum caput, ceruix, reliquūq; cor-  
pus in pectus contrahitur: Latine tensio ad anterio-  
ra dici potest. Οπισθότος, quādo caput in scapulas  
conuellitur: Latinis tētio ad posteriora appellari po-  
test. Hippocrates conuulsionis duas duntaxat esse

causas statuit, repletionem nimirum, et inanitionem  
neruorum corporum. Sicuti enī in exterioribus  
uidemus lora et chordas extendi, ubi aut multa ma-  
dent humiditate, aut uehementius exiccantur: sic et  
in corporibus animalium, par est non raro fieri con-  
uulsionem. Animaduertendum autē, hic Hippocra-  
tem loqui de conuulsione ea quæ primo fit, aut, ut  
apertius dicam, quæ propria passio est. Fit enim con-  
uulsio etiam per contienium, quum scilicet aliquid  
à parte primò patiente ad cerebrum ipsum effertur,  
quod ut à se expellat huiusmodi motu cōcutitur.

Conuul-  
sio per cō-  
sensum.

Spasmus  
non pro-  
portionas-  
tus ad ma-  
teriā.

Iuniores medici barbaram sectantes medicinā, spas-  
mum non proportionatum ad materiā nomināt:  
quia scilicet non accidat ob materiā, quæ implere  
aut inanire partes neruosas possit, sed à qualitate q̃-  
dam, alteratis per continuationem partibus: aut sub-  
stantia, uel spiritali ueluti aura uel fluida ad neruos

rum



um principium delata, sicut contingit in iis qui à  
 corpione aut alia fera uenenata icti sunt. Quando  
 aliquem sanum repente, Galeno. 2. Apho. com. 26. re-  
 te, aut non multo postea à morbi initio conuulsio  
 corripit, à repletionem fieri necesse est. Vbi uero post  
 plurimos sudores, aut uomitum, aut deiectiones al-  
 ii, aut sanguinis eruptiones, aut uigilias, aut famem,  
 aut motus tum multos tum uehementes subsequi-  
 tur, inanitio in causa est. Conuulsio per consensum  
 facile ex egri relatione dignoscitur. Viētus ratio  
 in conuulsione quę fit à repletionem, eadem est huic  
 quę in resolutionem, calida nempe et sicca. In ea uero  
 quę ab inanitionem fit, humida sit oportet. Nutriendi  
 enim sunt sorbitionibus et iuribus pinguibus, et car-  
 nibus concoctis facilibus, et probè nutrientibus. Vino  
 utantur tenui et aquoso, quod facile per omnia cor-  
 poris membra distribuitur: nisi febris affuerit. tunc  
 enim ptisanę cremor utilis erit. Somnus etiam accer-  
 sendus erit. et uictus in uniuersum talis sit, qualis est  
 eorum qui hectica laborant febrī. Curatio conuul-  
 sionis à repletionem ortę, à sanguinis missione auspi-  
 canda, modò nihil adsit quod eandem fieri prohi-  
 beat. Liberaliter autem sanguinē auferre conuenit,  
 modò non confertim id fiat, sed pluribus uicibus.  
 Detrahendus autem sanguis ex cubiti uena mediā,  
 Dein clysteri acri, si ita uisum fuerit, aluus eluenda.  
 Partes autem quę conuelluntur, ualenter continen-  
 de sunt, et inordinatis motibus resistendum. Oleo  
 quoq; rutaceo aut irino, aut alio quodam ex hoc  
 genere perfricandę: aut lanis oleis eiusmodi imbu-  
 tis contegendę. Vel uesicam latam calido oleo re-  
 pletā, supponere oportet. Si uero à pituitosis hu-  
 moribus conuulsio euenerit, ii primum omnium  
 extenuandi et incidendi, utq; idonei sint ad expul-  
 sionem præparandi: præparati, medicamentis in  
 Capitibus de Resolutione et morbo comitiali di-

D ii Etis

Signa

Viētus

Curatio  
conuulsi-  
onis a reple-  
tione.



Etis euacuandi. Cucurbitulas etiam cum scarificatione ad mouere prodest: leues enim lædunt. si quidem crura contrahantur, coxis, et postremæ uertebrae: si manus conuellantur, dorso, et primæ ipsius uertebrae, tum ei quæ humeros superiacet. Caput præterea apophlegmatismis, gargarismis, et similibus medicamentis purgandum. Procedente tempore balneo uti confert. Singulis itaq; diebus bis aut ter in aquas sulphureas, uel aluminosas, uel salssas descendat: non tamen diutius, ne uires conuellant, immoretur. Aut si thermarum nullus usus esse poterit, laconico uti licebit, aut aqua cui iuncta sint folia lauri, abrotonum, pulegium, absinthium, ruta, salvia, hypericon, maiorana, et betonica. Conuulsæ quoque partes pellibus luporum et uulpium uestiantur. Inunctiones deniq; quæ in Cap. de Resolutione dictæ sunt, adhibere conuenit. Frigidæ superfusione, cuius Hippocrates meminit, cum sit periculosa, non facile uti licebit, nisi singula quæ ab illo requiruntur adsint. Cæterum calida medicamenta, ut est theriaca, antidotus mithridati, deglutienda erunt. Omnium tñ securissimum et optimum est castoreum dilutum, ad cochlearis parui mensuram, hoc est drachmā unā. Conuulsio, quæ ex inanitione et siccitate fit, maximum sanè malum est, et propemodum insanabile. Eos autem qui sic conuelluntur oleo, uel hydrelæo calido fouere opus. Ad lauacrum etiam deducere oportet, temperatoq; folio uti, cum oleo et frictione lenissima. Et in uniuersum ferè curentur ut, hæctica correpti. Curatio conuulsionis ab ictu ferè uenenatæ, eadem est cum ea quæ adhibetur iis qui à cane rabido morsi sunt. Annitendum enim ut uenenum extrahatur, uulnus latius efficiendo, locumq; totum in circuitu scarificando, superimpositis cucurbitulis. Confert et marrubii et anagallidis folia illinere. Theriaca etiam cum rosaceo diluta, et ulceri apposita, eo quod

Balneum.

S. aph. 21

Conuulsionis ex inanitione et siccitate curatio

Curatio conuulsionis a consensu.



quod uenenum in profundo attrahat atq; euacuet: hæc enim alexiteriorum, teste Galeno lib. 1. de Sim- pli. medi. facul. Cap. 17. actio est. ut hinc toto cælo errare Gentiles, et qui hunc sequuntur, constet, quuz theriacam ad motam uenenum magis intrò et in pro- fundum pellere garriunt.

## De tremore.

## Cap. XXII.

**T**ρῑμος Græcis, tremor Latinis dicitur: et est pas- sio, quæ duobus perficitur motibus. uno, dum cogitur membrum ob morbum atq; grauita- tem, ad inferiora repere: altero, dum sursum à facul- tate fertur. Eius origo cõmuniter ex neruorũ imbe- cillitate est. Priuatim uero, frigidius naturæ tempera- mentum frigide potio, et præsertim in febrib. intēpe- stiuè assumpta, frigidi, crassi, et lentī succi, uini multi meracioris usus, senectus, timor. Signa quibus cau- se dignoscuntur nulla sunt necessaria, quod partim ex egro, partim etiam ex iis quæ suprā dicta sunt de- prehēdi queant. Viētus ratio sic instituatur, ut cau- sis plane contraria sit. Cibus uero diductu facilis offeratur, et boni succi, primum sorbilis, mox uolati- lium et piscium molli carne præditorum. Si autem crassorum uiscosorumq; succorum copia fuerit, uti conuenit iis quæ incidunt extenuantq;. Vitent in uniuersum omnia quæ neruos offendere possunt, uī ni potionem, potissimum meracioris. Bibant dilutū et aquosum, aut hydromeli. Qui ex erroribus com- missis manifeste tremunt, à noxiis deinceps absti- neant. Qui igitur ex uini potu tremunt, siis uinum circuncidendum est, quoad in totum morbo fue- rint liberati. Bibant interea hydromeli, cuz decocto saluie aut betonicæ. Si à frigidis et crassis humori- bus tremor accidit, curandi ratio eadem erit adhibē- da quæ resolutioni et conuulsioni à repletionē factę sanguinis duntaxat missione excepta. Extremæ au-

Causa.

Signa.

Viētus.

Curatio.

D iii tem



tem corporis partes oleis calefacientib. præuncte, la-  
 nis mollibus cōtegantur, Dein cucurbitulę citra sca-  
 rificationem à priori uertebra usq; ad spinam lum-  
 bosq; affigantur, ut scilicet crassi & lēti humores uer-  
 tebrarum foramina obstruentes, ad cutis superficieꝝ  
 trahantur, atq; adeo subinde facilius diseutiantur.  
 Proderit et, ut eger quotidie piperis grana qnq; ex  
 mulsi cyatho, hoc est. 3. i. s.umat. Simplicia quoq;  
 hęc præsumpta trementes adiuuant, castoreum, lepo-  
 ris cerebrum comestum, altheę radice decoctum, &  
 eupatorii. Quid multa? medicamentis, unctionibus  
 præsertim, ad resolutionem conscriptis utendus est.

## De destillatione.

## Cap. XXIII.

Destilla-  
 tio quid.

Κάταρ-  
 ρος.

Κόρυζα.  
 Βεῖγχοσ.

Causa.

Signa.

**D**estillationem hoc loco communiter accipere  
 oportet, ut sub se complectatur omnes ex capi-  
 te in subiectas partes defluxus. Huius autē tria  
 sunt genera: quorum primum est *κἀτὰ ῥοος*, qui de-  
 stillatio propriè Latinis dicitur. Fit, Galen. lib. 3. de  
 Simp. caus. teste, ubi ad os ac fauces humor delabit.  
 Alteruz *κόρυζα* Gręcis, Latinis grauedo appellatur:  
 fit, dum ad nares decumbit humor. Tertiuz *βεῖγχοσ*  
 Latinis raucedo uocatur: accidit, ubi ad asperaz ar-  
 teriam humor destillat. Ob uarias causas accidere  
 solet. Vel enim calor ambientis qui in cerebro sunt  
 humores dissoluens, uel eiusdem frigiditas eosdem  
 constringens, ut iis potissimuz qui aperto capite bal-  
 neum egrediuntur accidere solet, destillationeꝝ cō-  
 ciliat. Frigida etiaꝝ cerebri intemperies, quę cur eius  
 alimentum non probè concoquatur, & calida, quę  
 aliunde ut trahantur ad ipsum humores efficiunt,  
 destillationem procreare possunt. Cause extrinsecę  
 facile de egrotorum sermonibus agnoscı possunt.  
 Qui ex calore destillatione corripıtur, his particu-  
 lę incalescunt, acris tenuisq; humor destillat tum p  
 nares, tum per os, facies rubescit & nasus. Hos etiā ut  
 plus



plurimum febris comitatur. Qui ex frigore, iis caput undiq; & frons distenditur, meatusq; (quos ethmoides nominant) clauduntur, ita ut ne uox dorsum per nares transire queat. Pituita & crassus humor è naribus stillat. Fugiant aërem impensè calidum & frigidum, præsertim à balneo, uentos austrinos & aquilonios, laconicum, & omnia quæ dissolvere humores in cerebro possunt. Utantur cibis concoctu facilibus & boni succi. deuinent eos qui uaporum copiam ad cerebrum transmittunt, cepe, allia, sinapi, raphanum, & odorameta supra modum casida. Incoena iminus quàm in prandio comedant. Potus sit hydromeli, aut decoctum hordei uel cinnamomi. Fugendus somnus diurnus, & supinus. Vbi calida intemperies passionem effecit, iis pugnandum præfidiis quæ dolori capitis ex tali causa contracto conueniunt. Præsentissimum autem remedium est capitis irroratio, maximè in æstate. Quod si frigida intemperies afficiat, caput calefacientibus subtilibusq; oleis, irino, rutaceoq; perungendum. Irinum uero non solùm illinitur, sed etiam naribus instillatur, aliaq; quæ supra de capitis dolore ex frigore orto dicta sunt adhibentur. Si aut calidus humor à capite destillauerit, simulq; febris inuaserit, ac totius corporis plenitudo fuerit, sanguis è uena exteriori cubiti mittendus erit. Si sanguinis missione uti non licuerit, clysteri alius eluenda, atq; à capite exuperantes humores deorsus trahendi. aut medicamentis bilem per inferna ducentibus corpus purgandum, catapotiiis nimium aureis, alephanginis, & simili. Auertendi et à capite sunt humores frictionibus extremitatum, ligaturis, & cucurbitulis scapulis admotis. Proderunt et medicamenta intra corpus sumpta, quibus alterandi inest facultas: ut est syrupus uiolaceus, nymphaeæ, de papauere, & similes. Embroche et, & odorameta supra in Cap. de dolore capiti commemorata adhibeant. Empla

D iiii strum

Vltus.

Contracto.

Si calidus humor.

Auerflo.



*Si frigidus humor*

*Sacculus.*

*Destillatio-  
nem re-  
primentia*

*Pastilli  
pro suffl.*

*Lippitudo  
quid.*

strum quoq; ex terra sigillata, aut bolo armenio & plantaginis succo cōfectum, raso capiti imponatur. Si uero frigidus humor sit qui à capite destillet, per ea quę pituitam purgant corpus uacuabis. In quem usum non parum proderit ualidi clysteris iniectio. Quo peracto, à capite auertere atq; retrahere humores conueniet. Dein ubi materia cōcocta fuerit, apophlegmatismis, gargarismis, & similib. medicamentis caput purgandum. Sacculi etiam capiti admouendi sunt, hunc in modum cōfecti. ℞. Florum chamemeli, meliloti, stichadis arabicę, foliorum lauri, pulegii, origani. añ. M. s. cinnamomi, gariophyllorum. añ. 3. s. maceris. 3. ii. nucis myristicę, galliæ moschatę. añ. 3. i. Terantur omnia, & fiat sacculus capitalis, qui suturę coronali imponatur. Confert etiam caput oleis calidis, irino, anethino, & rutaceo perungere. Destillationem uero reprimunt omnia quibus exiccandi inest facultas: potissimum uero nigella, aut cuminū deustum panniculo inditum & illigatum, pręsens auxilium affert. In hunc usum suffimenta adhibere oꝝ, sic cōposita. ℞. Thuris, mastichis. añ. 3. i. ligni aloës. 3. i. cinnamomi, gariophyllorum. añ. 3. s. gallię moschatę. 3. ii. foliorum lauri, santalorum luteorum. añ. 3. s. moschi, ambar. añ. gr. i. Terantur singula, & cum styrace liquido quod satis est formetur pastilli, quorum unus prunis inseratur. Aliud. ℞. Saluię, maioranę, rosmarini. añ. 3. i. maceris, gariophyllorum, cinnamomi. añ. 3. ii. ligni aloës, thuris. añ. 3. i. misce, fiat puluis, qui carbonibus ignitis iniiciatur.

*De lippitudine, siue cphthalmia. Cap. XXIII.*

**O**φθαλμία Latinis lippitudo dicitur, est inflammatio tunicę uel membranę adnatę, quaz cōiunctiuam hodie uocant. Adnata autem dicta propterea, quod aliis quę oculum ipsum constituūt tunicis forinsecus adnata sit, ligamentum existens toti



toti oculo ad circumiacentia ossa: ideoq; ambientes  
oculorum partes usq; ad malas nonnunquam in ue-  
hementiori lippitudine simul attolluntur. Fit uel  
ex plenitudine uniuersuz corpus aggrauate, ob qua  
adhata etiam humoribus referta tenditur. Vel ab in-  
fluentium acrimonia, uehementer erodente: uel pro-  
pter aliquam crassorum humorum, aut spirituu; fla-  
tulentorum intensiorem. Dignoscitur, quando ad-  
nata oculi membrana, quæ natura alba est, ob san-  
guinis confluxum rubea esse uidetur, & ex oculis la-  
chrymæ refudant, atq; in maioribus oculi angulis  
sordes quedam colliguntur. Locus in quo decum-  
bit eger, obscurus & tenebrosus sit, & pro causæ di-  
ueritate aut frigidus aut calidus. Si in propatulum  
egreditur eger, panniculo atro aut uiridi oculos ob-  
ducat. Tenui utatur uictu, & cibo parciore. deuitet  
carnium lactisq; esum. Vino haud utatur, præsertim  
inter initia. Bibat itaq; decoctum cinnamomi, aut  
hordei, donec uigor prætereat. Quod si tamen crassi  
humores tensionem procrearent, hydromeli aut ui-  
num tenue & aquosum bibere conueniret. Exercita-  
ri haud prodest, sed quiescere & dormire. Perturba-  
tiones animi procul absint. Si ex plenitudine cōtra-  
cta fuerit inflammatio, id quod dignoscitur si cum  
ingenti dolore oculos affligente plurima tensio, ru-  
bedo, renitentia, & calor affuerit, feruidarūq; lachry-  
marum copia defluerit, à sanguinis missione curan-  
di ratio auspicanda erit. Venam autem secare oportet  
cubiti superiorem, quam humerale; uocant, atq;  
eam potissimum quæ è directo est. Et si uehemens sit  
inflammatio, ad animi deliquium usq; sanguinem  
auferre conueniet. Si uero à rodentibus, aut crassis  
humoribus lippitudo orta fuerit, id quod lachry-  
mæ tenues, salæ, acres, calideq; aut contrariæ mon-  
strabunt, atq; adeotorum corpus cacochymum fue-  
rit, prauisq; humorib; abundauerit, quæ noxios hu-  
mores

Cause.

Signa.

Victus.

Curatio.



Adstringē  
tia & reprimē  
mentia.

Lenitiui ho  
mores.

Emplastica  
& stupefacien  
tia non temere adhi  
benda.

mores uacuare & purgare possunt medicamenta pro  
pinanda, quę certe pro redundantium ac infestantiū  
humorum uarietate immutanda ueniunt. Corpore  
inanito, humorum impetus qui ad oculos fertur, de  
orsum, & alias corporis partes ignobiliores frictio  
nib. infernarum partium, ligaturis artuum, & cucur  
bitulis reuellendus erit. Posthęc adhibenda sunt me  
dicamenta repellentia, quę non exasperent, hoc est  
non uehementem sortita sint adstrictionez; sed quę  
tum propria sua substantia sint moderatiora, tuz le  
nitiui liquoris ammixtiōe adhuc magis talia fiant.  
Lenitiui autem humores sunt potissimum, Galeno  
lib. 13. Ther. meth. Cap. ult. teste, oui candidum, & fœ  
nigręci decoctum, & ad hęc amplius ipsum lac. In  
quo prouidum esse conuenit, ut iuueniculę simulq;  
boni succi fœming existat, uberibus ipsius in cotem  
in qua collyrium teritur expressis, quo calidum ad  
huc oculis infundatur. Hoc autem precipue in uehe  
menti dolore afflictis, aut ppter inflammationis ma  
gnitudinem, aut ob influentium humorum acritudi  
nem faciendum. Fronti itaq; illinendi succi rosarū,  
plantaginis, solani, foliorum salicis, cum oui albo &  
aceto. His ammiscere oportet bolum armeniaz, thus,  
acatiam, santalos rubeos, balauſtia, & similia, ex qui  
bus adiecto oleo rosaceo & farina hordeacea empla  
strum componendum erit. Emplastica & anodyna,  
ut est cerussa & amyſum, non temere sunt adhiben  
da. hęc enim etsi sensum torpescere faciant, tamen  
uehementes fluxiones, Galeno. 6. Apho. comm. 31. te  
ſte, non reprimunt, sed excerni prohibent: atq; adeo  
si humores fluentes acres fuerint, corneam erodi cō  
tingit. Si uero multi, magis irritari, ac uehemēter ex  
tendi. Pariter uehementer stupefacientia, nisi maxi  
ma doloris necessitas urgeat, non sunt admouenda  
quod scilicet facultatem uisoriam offendant, adeo  
ut cessante inflammatiōe uel debiliter, uel nihil om  
nino



ino uideant. In principio itaq; medicamenta quæ refrigerant, adstringunt & repellunt, adhibenda. In incremento repellentib. nō nihil ex iis quæ discutiūt admiscenda. At in uigore mitigatoria applicanda. In declinatione, ea quæ tantum discutiendi facultate pollent. Vbi igitur concocta iam phlegmone ipsa uerit, & simul corpus uacuum, tum utiq; lauaciones in balneo his sunt aptissime. nam Galeno ubi supra utore, & dolorem statim sedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur sistunt, maxima quidem eius parte inter lauandum per totum corpus excreta, reliquo uero temperato mitigatouē. Fomentum præterea omnino adhibendum est ipsis oculis per spongiam, si quidem mediocris sit dolor, semel aut bis in die. Si uero uehementior dolor urgeat, præstat ter aut quater, & sæpius uti, in longis præsertim æstiuis diebus. fiat autem fomentum per meliloti & fœnigræci decoctum. Est namq; hoc medicamentum maxime omnium quæ oculis admouetur, sine offensa discutiēs. Lauandum tamen prius curiose fœnogræcum, ne quid illi uel pulueris uel sabuli adhærens clam lateat. A loē etiam per se, uel aqua, aut succo fœniculi diluta mirabiliter confert.

## De suffusione.

## Cap. XXV.

**Y** ὁ ὕψμα τοῦ ἐν τῇ ὀφθαλμῷ Latinis suffusio dicitur, barbaris cataracta. Est, ubi humor lentus & glaciei modo concretus, inter corneaz & crystalloiden circa pupillam subit, quo uisus eatenus saltem impeditur, ut non possit discretas reruz species & colores oculos apprehendere. Accidit potissimum ex refrigeratione, ac imbecillitate spiritus uisorii, Paulo libr. 6. Capite. 21. autore. Fit etiam ex uomitu uiolentius concitato, & ex ictu, & humore pigro in cornea membrana iuxta pupillam collecto. Inchoante morbo tanquam pusilli culices, uel alia lucentia, caliginosaq;

Balneum.

Fomentum

Causa.

Signa.

*quæ in operanda  
sunt ut in  
7. Hipp. en. pl. dec.*



saq; quędam corpuscula assidue prę oculis obuersa  
 ri uidentur. Quibusdam ueluti lanarum filamenta  
 ⁊ tele aranearum, quibusdam circa lucernas circuli  
 offeruntur. Hęc autem nonnunquam proprię noxi  
 oculi, nonnunquam uentriculi passioni feruntur ac  
 cepta. Quare inter hęc duo discrimen habendū est.  
 Si quidem uisa ob humorum in uentriculo conten  
 torum uitiaz oborta fuerint, utriq; oculo similiter  
 accidunt. Quę uero per propriam passionem appa  
 rent, neq; incipiunt simul in utroq; , neq; similiter  
 apparent. Deinde ex tempore quoq; distinguuntur.  
 Si enim tribus quatuorue aut etiam pluribus men  
 bus suffusionis symptomata apparuerint, contēpl  
 tiq; tibi pupillam, nihil tenebrosū uideatur, ab ore  
 uentriculi passionēz procedere inuenies. Si uero non  
 ita multum temporis intercessit, quærendum est in  
 primis utrum ex quo incœpit affectus, singulis die  
 bus perpetuò huiusmodi apparitio perseuerauerit  
 nullo scilicet interueniente die qui omni querela ce  
 ruerit, an diebus quibusdam laborans exactē uide  
 tur conualuisse. Nam continuas suffusionem po  
 tendit. Intermissio uero, quodd malum à uentriculo  
 prodierit, suspicionem excitat. Idq; magis, si ubi per  
 fecte quis concoquens, nullum sibi uisum apparere  
 fatetur. Sed multo magis, si quum apparuerunt uisa  
 mordicus in ore uentriculi doluit: maxime uero, si  
 post hęc uomendo, eiecta remordente, mitigata fu  
 rint symptomata. Vbi uero altera pupilla tenebro  
 sior, aut turbidior, aut non exacte pura uidetur, suf  
 fusionis esse initium censendū est. *Viſus.* Viſus ratio si  
 attenuatoria, ⁊ exiccatoria. A uino abſtineat in to  
 ta medicatione, ⁊ pro eo decoctum cinnamomi aut  
 hydromeli bibat, Fugiat omnia caput replentia. A  
 balneis abſtineat, nisi uel lassitudinis uel cruditati  
 causa sint necessaria: atq; ne tum quidem in aëre ba  
 nei diutius immorari, neq; in solio pſistere, s; sensu  
 qui



sem ingredi, confestim uero egredi oportet. Vitent  
 pisces, fructus, et quicquid corpus humectare potest.  
 Suffusi in principio, nisi quid obstat, uenę cubiti ex  
 terioris sectio, et acris clysteribus purgationibus  
 que curantur. Deinde cucurbitula occipitio cum sca  
 rificatione affigenda est, utendumque per interualla  
 apophlegmatismis, et iis que per nares purgant. Cau  
 terium etiam quale supra Cap. I. descripsimus, post  
 aures apponendum erit. In oculis autem medicame  
 ntis est primum simplicibus. utendum, puta melle cum  
 oleo et succo fœniculi. Postea compositis, quale hoc  
 est, quod. R. Succus fœniculi. 3. ii. aque chelidonii ma  
 ioris, euphrasie. añ. 3. i. s. sagapeni. 3. i. misce. Fellis etiam  
 genera per se, aut cum fœniculi succo illita proderunt.  
 Aut myrrhe et piperis partes equales cum melle.

Curatio.

## De aurium dolore.

## Cap. XXVI.

**A**urium dolor aliquibus ex refrigeratione, in pe  
 regrinatione à frigidis uentis facta, oritur. Ali  
 quibus uero ex balneis frigidis, et quibusdam  
 ex aquis medicatis excitatur. Fit et auris dolor ex in  
 flammatione, interdum quidem solius circa meatum  
 cutis, interdum uero in profundo, quando uidelicet  
 nervus auditorius ad inflammationis affectum pue  
 nerit. Qua uero ratione inflammatio, partes inflam  
 matas distendens, dolorem parit: eodem modo etiam  
 flatulentus spiritus transitum non habens, dolorem  
 efficit. Sanio si denique et serosi humores in corpore  
 aurium generati, consimiliter ut mordaces humores  
 qui extrinsecus illabuntur, dolorem conciliant.  
 Aurium dolor qui frigiditati fertur acceptus, de egri ser  
 monibus facile cognoscitur, et inde quod dolor altè  
 citra grauitatem uel distensionem, uel ardorem fixus  
 sit. At qui ex calida ortus est intemperie, ex eo quod  
 in illo feruoris cuiusdam sine grauitate seu tensioe  
 sensus est, deprehenditur. Si grauitas, distensio, simulque

Causa.

Signa.

ca.



Vitis.

Curatio

doloris  
frigid.Doloris  
calidi.Ex aquis  
medicatisA. flatibus  
et tumori-  
bus cras-  
sis.

calor et dolor pulsatis, aut etiā febricula oboritur, inflammatione, aurem laborare censeo. Sola autem citra grauitatem distensio, spiritum flatulentum cui exitus non patescit, indicat. Vitis ratio ex superioribus iuxta causę diuersitatem facile institui potest. Cæterum, dolorem à sola refrigeratione obortum, calefacientia quam celerrime curant, nempe oleum rutaceum, laurinum, nardinum, cicinum, anethinum, et liliaceum. Oleum etiam in quo allium decoctum est uel cepa, instillatum mirifice confert. Sunt qui magnas cepas exculpentes, deinde oleo explentes, et in feruente cinere moderatè calefacientes, ita auribus infundant. Galenus euphorbio perquā exiguo ad multum uetus oleum ammixto usus est, ueluti etiam pipere exquisitissime trito. Manifestum uero est omnibus, quicquid adhibetur mediocriter calidum esse oportere. Quum autem à calida intemperie dolor obortus fuerit, tum contrariis medicamentis propulsandus erit. Mirifice igitur confert rosaceum oleum in aurem demissum, uel acetum, uel succus solani, oleumq; nymphęæ. Vt. R. Olei rosacei, succi solani, añ. ʒ. s. aceti. 3. i. s. misce. Magnifice et eos dolores mitigat qui candidum, itemq; lac muliebre. Vbi uero aqua medicata circa auditorium meatum contineatur, oleum assidue infundere conuenit, quo ipsum eluamus: dein lana molli extergere, rursusq; infundere. Plurimum etiam prodest adeps anserinus, atq; item uulpinus. Sed nihil ad aquam euocandam præstantius, quàm oris exuētio, quę etiā per calamum ceu canalem exugī potest. Si quis etiam alteri pedi innixus eiusdem lateris cum aure affecta, capite parumper declinui saliat, aquaz facile excutiet. Si uero à flatibus, aut crassis uiscosisq; humoribus dolor excitatus fuerit, medicamentis quę obstructiones auferunt et incidunt utendum: cuiusmodi sunt omnia amara, q̄ sine erosione expurgant, extergūtq;.

Ex



ex quo genere est album item ac nigrum ueratrum,  
mygdalę amarę, ex aristo lochiis quęcunq; fuerit  
ad manum, iris ilirica, uitis albe radix, centaurii mī  
oris coma, cinnamomum, & polium. Quod si inflā  
tio adfit, statim sanguis ex humerali uena eiusedē  
teris mittendus est. Deinde oxyrhodinum tepesa  
tum instillandum. At si uehementior fuerit inflam  
matio, ad sedandos dolores albumen oui cum lacte  
mulieris tepidum infunditur. Cogente uero dolo  
re, necessarium est etiam his quę sensum stupefaciūt  
uti. Neq; enim mediocre periculum est, ne cerebrum  
neruo per quem facultas audiendi distribuitur uici  
um, per consensum afficiatur. Miscetur autem pau  
culum opium muliebri lacti, & oui candido, quę &  
ipsa per se aurium inflammationibus profunt. Casto  
rio etiam opium miscetur. Verum multo ante usum  
tempore, Galeno lib. 3. de Comp. med. Cap. 1. auto  
re, siue pari pondere, siue duplo castoreo ammiscea  
tur, preparatum id esse conuenit. Et miscetur quidē  
in uehementissimis doloribus pari, in minoribus ue  
ro duplo. Liquor uero quo prędicta medicamenta,  
diligenter prius trita & leuigata diluuntur, sapa sit.  
Opio etiam oleum rosaceum & uiolaceum miscetur  
in hunc modum. ℞. Opii. 3. s. oleorum rosacei & uio  
lacei. añ. 3. i. s. misce. Philonis antidotum frequenter  
etiam sic laborantibus profuit, dissolutum lacte mu  
liebri, & instillatum. Extrinsecus uero aurem assidue  
siue oleo communi, siue ex quodam calido fomen  
to oportet fouere, lanamq; hoc imbutam in aurem  
coniicere, sed ita ut partes inflammatione tentatę  
quām fieri potest minime attingantur. Vbi autę do  
lor inueterauerit, & iam in suppurationem conuer  
ti cęperit, medicamento ē succo linis seminis uti  
tor, quod unā cum rosaceo aut chamęmelino solu  
tum instillabis.

Ab inflam  
matione.

Stupefa  
cientia.

De



Parotio

Causa.

Signa.

Viſus.

Curatio.

Adſtrin-

gentia &amp;

reprimen-

tia medi-

camenta

in paroti-

de non ad-

hibenda.

**P**arotides sunt inflammationes, quæ in glandulis auribus adiacentibus sunt. Causa eius non est alia quam reliquarum inflammationum, quæ in glandulosis accidunt partibus. Signa nulla ad agnoscendas parotides requiruntur: oculorum enim iudicio subiacent. Viſus ratio talis, qualis in aliis inflammationibus, instituenda uenit. Curandi ratio à uenæ sectione, si ætas aliaque permiserint, auspicanda erit. Incidenda uero humeralis eiusdem lateris uena. Non tamen ad eas, quemadmodum alias inflammationes, in principio reprimentibus utimur, sed contra attractoria medicamenta adhibemus. Atque si hæc nihil notatu dignum effecerint, etiam cucurbitulas affigemus, aut fomenta assidua adhibebimus. Annitendum enim, ut affligens humor ex profundo ad cutem attrahatur, præsertim ubi in capite affectus sit firmatus, humoribus in eo pertinaciter hærentibus. Quin et quum citra capitis affectum, in febribus acutis natura superuacuos humores ex uasis effundens ad regionem inter cutem et subiecta corpora deponit, quando sanè et glandulæ ex effusis humoribus oppulentur: melius esse utique etiam tunc uidetur, naturæ, per humorum decubitus seu ex loco in locum impetuosum illapsam febres curanti, opitulari. At uero quum uehementi impetu influxus irruit, nihil nos tentabimus, sed omnia naturæ permittemus. Si enim uel cucurbitam uel medicamentum humores ex alto ad cutem attrahens admouerimus, uehemens dolor hominem apprehendet, unde et uigiliæ suboriantur, febres intenduntur, ac uires exoluentur. Mitigare itaque tunc, non humoris influxui opitulari conuenit, per cataplasmatum maxime lenientium usum. Eligenda uero, quæ cum humiditate moderata calorem habeant, doloribus mitigandis sedandisque, atque influentibus humoribus.



umoribus concoquendis et maturandis idoneum, eluti est quod ex farina hordeacea, aut triticea, aut eminis lini cum mulla, aut fœnigræci, aut altheæ, aut hamæmeli decocto paratur. In hunc etiam usum ualeat butyrum assidue illitum, et ouorum uitelli. Si uis etiam adeps cum butyro liquatus, cera exigua adlita. Si itaque tumor non discutitur, suppurantibus medicamentis utendum est: uelut est farina triticea, cum aricarum decocto, et oleo. Si uero suppuratae fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, ulcusque uelut in eiusmodi moris est curare, aut sane per acre medicamentum abscessum rumpere: quale est quod ex alliis constat, aut tentare, ut ipsum per medicamenta attractoria tenuiumque partium discutiamus, bis per diem ablatis, et fomentis admotis, donec remiserint et laxati fuerint dolores. Quando uero iam plurimum puris fuerit discussum, tunc iam primum semel soluere ea medicamenta, et fomenta adhibere oportet: deinde uero neque ex re est id facere, sed ipsis medicamentis permittere oportet, ut si quid reliquum in profundo hæreat, id ipsum discutiant. Quod si durities adsit, ea ipsa quoque mollienda est, quare hoc tempore ex mixta medicamentorum facultate compositio parabitur, emollientibus attractoriis ammixtis. Manifestum autem est quod moderate parotides, in quibus neque humorum multitudo redundans in particulas irruit tanta, ut uehementes dolores excitet, neque caliditas cum humore adest, facile per medicamenta emollientia et discutientia, quale est emplastrum diachylon, sanari possint.

De sanguinis ex naribus eruptione. Cap. XXVIII.

**C**Ausæ profluii sanguinis ex naribus externæ multæ sunt, nempe casus ab alto, ictus, exercitium uehemens, mora in sole. Multæ et sunt internæ, nimirum copia sanguinis, uel eiusdem tenui-

Causæ

Etas.



## Leonharti Fuchsi

tas. Omnes autem causę sub iis tribus complecti potest  
sunt. Sanguis enim profluat ex naribus, aut resecato  
uenarum uel arteriarum quę in capite et naribus sunt  
ore, aut tunica earundem rupta ac diuisa, aut sudor  
ris instar transcolatus. Porro, resecatur uenarum  
arteriarum os propter tum uasis imbecillitatem, tum  
sanguinis qui ad os earum impetu ruit copiam: ad  
hec acrem quampiam, quę illi extrinsecus incidit, et  
lilitatem. Diuiditur autem tum ex uulneratione, tum  
contusione, tum ruptione, tum erosione. Sudoris in  
star transmittitur tunica quidem ipsa rarefacta, san  
guine uero tenuato. Causę externę de sermonibus  
egrotantis cognoscuntur. Plenitudinis notę dictę  
sunt supra Cap. 6. huius libri. Decretoriuz sanguinis  
ex naribus profluuiuz ex morborum qui precesserunt  
constitutione deprehenditur. **Victus** ratio talis sit,  
quę infrigidare et incrassare sanguinem queat. Te  
nuis etiam sit. Aere itaq; utatur frigidior: cibus bo  
ni succi, et cōcoctu facilibus. Feruente sanguine, ue  
scatur lactucis, endiuia, scariola, piris, cotoneis ma  
lis, pullis gallinaceis assis, aut cum omphacio deco  
ctis. Bibat uinum crassum ac rubeum, fugiat uero te  
nue et albu. Aut in potu utatur aqua frigida, uel de  
cocto cinnamomi. Parum loquatur, animiq; pertur  
bationes (iram potissimum, et similes) deuitet. Caput  
pretereā sublimē habere conueniet. Curandi uero  
ratio ab iis quę sanguinem ad alias corporis partes  
auertere possunt auipicanda. Primum itaq; si pleni  
tudo corporis adsit, aut etas permiserit, egerq; reso  
lutus adhuc non sit, uena in cubito incidenda est, q  
profusioni ē directo respondet. Vbi paululum de  
traxeris, mox unam horam intermittens, rursus de  
trahes, post iterum atq; iterum pro laborantibus ui  
ribus. **Frictio** etiam infernarum partium, brachiorū  
uidelicet, manuum, femorum, inguinum, ac pedum,  
potissimum per ea medicamenta quę calefaciunt, ad  
hiben



benda. Præterea uincula ualentius adducta, iis re-  
 mediis quæ reuellunt adnumeranda sunt. Sanguinē  
 eniq; è naribus erumpentem retinent magnę in hy-  
 ochondriis defixę cucurbitę. Infigendę autē sunt,  
 ex dextra nare profluit sanguis, super iocinore: sin-  
 x sinistra, super liene: si ab utraq; nare, super utro-  
 ue sunt imponendę uiscere. Scapulis etiam cū sca-  
 ificatione applicandę sunt. His peractis, medicamen-  
 ta quę refrigerant & adstringunt, intra & extra cor-  
 pus adhibenda erunt. Extrinsecus itaq; apponenda  
 fronti & commissurę coronali sunt, epithemata ex  
 ucco plantaginis, lactuce, acetosę, bursę pastoris,  
 polygoni, & similibus. Mirifice uero confert, si lin-  
 theolus in aceto madefactum frigidum, iterum atq;  
 iterum fronti & ceruici admoueris. Frons etiam spō-  
 giis ex aqua frigida fouenda. Proderit etia; hoc epi-  
 themate iocinori & fronti imposito uti, quod. ℞. A-  
 quarum rosarum, solani. oxalidis (hoc est acetosę)  
 plantaginis. añ. 3. iii. aceti. 3. i. s. specierum diatrifan-  
 dali, diarhodon abbatis. añ. 3. s. boli armenię, eboris  
 usti, lapidis ematitidos. añ. 3. i. misce, fiat epithema.  
 Hoc etiam obstruenti medicamento, quod Gal. lib.  
 5. Ther. meth. optimū eē inter omnia alia asserit, utē-  
 dum, quod. ℞. Thuris. 3. ii. aloës. 3. i. Redacta in pul-  
 uerem cum oui candido subigantur, donec ad mel-  
 lis crassitudine redeant: dehinc leporis molliissimo  
 pilo excipiantur, & admoueantur. Licebit etiam lina-  
 mentum contortum hoc medicamento imbutū na-  
 ribus indere. Mentam porrò tritam in nares coniice-  
 re proderit. Aut spongiam in acre & feruidum acetū  
 coniectum, forinsecus ad sanguinem profundente;  
 narem apponere. Aliud. ℞. Putaminis oui. 3. ii. galle  
 omphacitidis. 3. i. trita linamēto torto aqua aut ace-  
 to madefacto excipito, & indito. Frontem uero & na-  
 sum gypso albumine oui madefacto integere con-  
 fert. Aures quoq; ualidē linteis & cera obturare, &

E ii ore

L. gaturæ

Cucurbitæ

Medicamē

ta re frige

rantia &amp;

adstringē-

tia.

Epithema.



In ore aquam pluuialem frigidaꝝ continere. Succum  
etiam folioruꝝ urticæ linamento impositus, sangu-  
nem ex naribus erumpentem reprimit. Idemqꝫ etiam  
potest caudę equinę succus, aut ipsamet trita applica-  
ta. Cochlearum carnem cum aceto tritam, aut eadẽ  
cum suis domiciliis uistas tritasqꝫ, fronti ac naribus  
ex aceto admouere conuenit. Supra omnia conferri  
sanguis, qui ex egrotantis promanauit naribus, si in  
uase figulino tostus fuerit, de quo. R. 3. iiii. boli armati  
nię, gypsi. añ. 3. i. caphure. 3. i. cum ouĩ candido ⁊ ex  
quo aceto reducantur ad mellis crassitudinẽ, ⁊ fro-  
nti imponantur. Necessitate urgente, grana duo aut  
tria opii adicere licebit. A tota substantia stercuris  
asininum exiccatum, ⁊ in puluerem redactum, con-  
ducere uidetur. Id quod porcinum etiam efficere po-  
test. Intra corpus adhibenda ea quę infrigidant ⁊ ac-  
stringunt medicamẽta, ut sunt syruꝫ rosaceus, myr-  
thinus, ⁊ nymphę, ⁊ de papauere. Conseruę rosarũ  
nymphę, ⁊ oxalydis. Pastilli de terra sigillata, de su-  
cino, de ebore seu spodio, cum succis paulo antea  
memoratis. Porro si quid interea ex sanguine ab-  
sorptum esse uideatur, etiam idipsum ubi multa eius  
fit copia, per medicamentum quod uacuare potest  
educito. In uentre enim ⁊ intestinis in grumos coac-  
tum, incensionem facit.

*Que ad-  
bibenda in  
tra corpus*

*De dolore dentium.*

*Cap. XXIX.*

*Causa.*

*Signa.*

**F**it interdum ab intemperie uel frigida uel calida  
interdum uero propter defluxum humorum ex  
capite in radices eorundem, qui sua acrimonia  
illos aut erodunt, aut consimilem in eis passionem  
sua copia excitat, qualis est circa carnosas partes in-  
flammatiõ. Si a nuda qualitatis intemperie dolor  
ortus sit, minime grauatiuus erit. Sin ab humore co-  
pioso influente, non solum grauatiuus dolor in den-  
tib. sentitur, uerũetiaꝫ in reliquis partibus quas per-  
transit.



infit. Calidus autem humor uehementiores, frigi-  
 s uero remissionem mitioremq; dolorem excitat.  
 iustus ratio, quæ maxime ne dolor accidat efficere  
 rest, talis sit, ut supra modum calida aut frigida de-  
 tentur: potissimum uero cauendum, ne statim sese  
 quantur. Vitanda acida, acerba, et uiscosa omnia.  
 actis etiam frequens usus dentibus mirifice obest.  
 udium et diligentia assidua sit in purificatione de-  
 um, quæ sanè res eos à corruptione omnium maxi-  
 e tutos reddit. Utendum cibus boni succi, et conco-  
 u facilibus. Dolore autem infestante, iuxta causæ  
 iuersitatem uictus instituitur. Curandi ratio, si à  
 uda sit qualitatium intemperie, solis iis quæ altera-  
 e possunt medicamentis perficitur. Si à frigore, pro-  
 lerit uino tepido colluere dentes. Extrinsecus ma-  
 illæ calefacientibus oleis, chamæmelino, rutaceo, iri-  
 no et similib. inungantur. Ad oris etiam collutionē  
 n aceto decoquenda erunt origanum, calamintha,  
 yssopus, pulegium, satureia, uerbenacæ recte radix,  
 et similia. Sin à colore dolere dentes coperint, in ace-  
 to decoquere conuenit portulacam, parietariā, sem-  
 peruiuum minus, et glycyrrhizā. Quod si intolera-  
 bilis existat caloris iensus, utendum est seminibus la-  
 tucæ, intybi domestici, et papaueris hortensis, deco-  
 ctis in aceto. Forinsecus oleis frigidis partes inungē-  
 de. Porro si à redundantia humorum dolor excita-  
 tus fuerit, si ætas, tempus anni, et alia permiserint, ple-  
 nitudoq; corporis affuerit, à sanguinis missione cu-  
 ratio inchoanda erit. Detrahendus autem sanguis ex  
 humerali uena, quæ è directo affectum locum respi-  
 cit. Quo peracto, uenas sub lingua incidere opz, aut  
 scapulis cucurbitas affigere. Si uero unus duntaxat  
 humor exundauerit, medicamento quod eu; humo-  
 rem purgare consuevit euacuetur. In quem usus cly-  
 steres etiam, qui ad inferiora auertunt humorum im-  
 petum, adhibere licebit. Vacuato corpore, ea quæ

Victus.

Curatio.

Vena se-  
ctio.

Purgatio

E iii repri.



*Reprimen  
tia.*

reprimunt medicamenta admovebis : ut sunt, succi plantaginis, rosarum, portulacæ, lactucæ, in tybi domestici utriusq;, aut prædictarum herbarum decoctum cum modico aceto. Prodest uero mirifice, dolentes acri aceto calido cum galla immatura collure. Adicienda etiam interdum erit caphura. Emplastrum quoq; ex farina ordeacea, cum decocto solani, halicacabi, et lactucæ confert. Inungendæ etiam uncine partes ex trinfecus oleo rosaceo, nymphæ, ex quo caphuræ adiecto. Principio morbi iam transacti, reprimentibus admiscenda erunt discutientia

*Discutien  
tia.*

*Stupefa  
cientia.*

*Quæ a to  
ta essentia  
conducunt*

ut est decoctum fœnigræci, seminis lini, pyrethri, et hyssopi. Ad stupefacientia, nisi summa urgente necessitate, non est perueniendum. In hunc autem usum adhibebis decoctum seminis aut foliorum hyoscyam cum aceto. Philonii etiam drachma una in aqua aut uino diluta, non parum auxilii confert. Inter ea tamen quæ à tota essentia conducunt, egregie facere fertur rang in aqua et aceto probe coctæ decoctum, diutius ore retentum. Præclare prodest etiam senecta sepenis, in uino aut aceto cocta. Eadem quoq; uita ac trita, cum oleo ad mellis crassitudinem redacta, dentibus adfricta, non parum conducet. Origanum præterea dentium dolorem lenit, et protinus tollit, si redactum in puluerem cum nitro inspargatur. Quod si uero prædicta nihil contulerint, dens aut ferro aut medicamentis auferendus erit. Quæ autem sint medicamenta ea quæ citra dolorem et absq; ferro dentem extrahere queunt, docet Aëtius lib. 8. Cap. 34.

De aphthis.

Cap. XXX.

*Aphthæ.*

**A**phthæ, ulcerationes quæ in superficie oris accidunt, igne caliditatis quippiam habentes, Græcis appellantur, quæ nunc subalbide, nunc subrubre sunt; alias crustæ modo nigrescunt, et hæc omnium periculum.



periculosissime existunt. Barbari hunc affectum aliam nominant. Fiunt ut plurimum infantibus puerisque; lactentibus, quum aut uitiosum fuerit lac nutriticis, aut non probe ipsum concoxerit infans. Fiunt etiam aliquando in his qui ad perfectam etatem perueniunt, tum propter uitiosorum humorum ad os refluxum, tum propter acrimoniam eorum quæ bibuntur ac comeduntur. Cognitio omnium facilis est, utpote uisui ac tactui subiecta. Ad tactum quidem, calidiores quàm conuenit partes fiunt, tumoresque excitantur. Visu uero, ex colore cognoscuntur. Quæ enim rubicundiores existunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulæ; albidiores, pituitæ; liuentes uero et nigrescentes, bilis atræ. Quæ infantibus accidunt, facile curantur, utpote quæ ex moderate adstringentibus sedantur. Infantibus uero ea potissimum conueniunt, quæ in cibis offeruntur. Oportet itaque miscere cibis aliquid ex malis cotoneis, et aliis acerbis, pirisque; ac mespilis. Aliquando etiam lactucæ quiddam et intybi, ac portulacæ cibo admiscendum est inflammata uidelicet ulceratione existente. Conuenit etiam lens cum aceto et aqua decocta, cum modico pane commanducata. Quod si infans ipse cibum capere haud possit, nutriceque eius huiusmodi uictu curare oportet; nec non infantium ora medicamentis conuenientibus illinire. Si quidem subrubræ infantium ulcerationes fuerint, à principio his quæ mediocriter adstringunt et refrigerant, est utendum. Si uero subflauæ fuerint, iisdem quidem utendum, sed magis refrigerantibus. Si pituitosiores, adstringentibus. Si nigrescentes, iis quæ generosius discutunt. Sufficit itaque pro iis rosarum flos, ipsaque rosarum folia sicca contusa, galla, et thus, cum mulso aut melle rosaceo illita. Collutiones etiam oris ex succis rosarum, plantaginis, solani, aut decocto gallarum, balaustrorum, rhoë obsonio

E iiii rum,

Causa.

Signa.

Curatio  
infantum



**Curatio a  
dultorum.**

**Victus.**

**Vene se  
ctio.**

**Purgatio**

rum, admixto R ob de ribes, aut confectioe diame-  
ron, profunt. In eis qui iam perfecte etatis sunt, du-  
rioraq; corpora habent, efficacioribus remediis uti-  
mur. Primum itaq; quod ad uictus rationem attri-  
net, qui in hac etate constituti, ab omnibus que salu-  
sa & acris sunt, quæq; uitiosos succos generant  
possunt, abstineant. In plenitudine totius corporis  
primum uene humeralis, & dein earum que sub lin-  
gua sunt, sectio fiat. In cacochymia, humoris redun-  
dantis purgatio conuenit. Qua peracta, medicamen-  
ta quibus adstringendi & reprimendi facultas inest  
adhibenda erunt. Deinde, uero ea que citra mordaci-  
tatem discutunt, ut est fœnumgræcum, glycyrrhiza  
radix, melilotum, & alia prius sepe commemorata.  
In his uero omnib. corporum naturas contemplari  
opz, nuz molles sint & humide, uelut in pueris, eunu-  
chis, & mulierculis; an dure & aride, uelut in piscato-  
ribus, nautis, uenatoribus atq; agricolis. Fortiorib.  
enim corporibus fortiora adhibenda medicamenta  
mollioribus imbecilliora. Atqui si exulcerationes  
putrescere incipiant, maxime in infantibus, preclare  
facit ex decocto gallarum & melle illitio. Gallarum  
itaq; contusas aqua decoq; & cum decocto pcola-  
to parem mensuram mellis pmiscens, rursus decoq;  
donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur.  
eoq; ut maximo remedio utere, ita ut locis illitū sa-  
tis diu digitis adfrices. Nec minus egregie facit cen-  
taurii minoris exusti cinis illinitus cum melle. Cor-  
nu etiam ceruinum ustum, tritum, & adfrictum, miri-  
fice conducit. Ad aphthas q̄ proserpunt, summe effi-  
cax est fœniculi radix usta per se, & cū melle illita.

**De foetore oris.**

**Cap. XXXI.**

**Causa.**

**M**olestus oris odor primū ob putrescentes gin-  
giuas, dentes, aut ciborū reliquias illic detene-  
tas accidit. Deinde pp cutis oris calidaz intem-  
periem,



eriem, humiditatem, quę in eo multa est, corrumpē-  
 em. Interdum etiam ob humorem corruptum aut  
 utrefactum, in ore uentriculi herentem. Nonnun-  
 quam uero oris aut pulmonis exulceratione fit, ut  
 molestus sit oris halitus. Si propter putrescentes uel  
 gingiuas uel dentes, uel ciborum reliquias oris fœ-  
 or accidit, facile uisu aut de egroti sermonib. depre-  
 nendi potest. Si ob calidam cutis oris intemperie, tu-  
 calor in ore sentitur, ac fitis adest. Si propter os uen-  
 riculi, tunc ante eibi sumptionē precipue oris odor  
 molestus esse solet. Oris et pulmonis exulcerationes  
 uisus etiam agnoscit, totius enim corporis extenua-  
 tio phthisicos concomitatur. Victus ratio talis sit,  
 ut omnia quę facile in ore aut uentriculo corrup-  
 puntur, euitet egrotus: lac, pisces, fructus omnes, me-  
 dullas, et pingua, aquas prauas, et similia. Utatur po-  
 tius cibus boni succi, potissimum uero assis. In cœne  
 et prandii sine adstringentibus, piris, cotoneis malis,  
 et eiusmodi. Potus iuxta causę diuersitatez sit uel ui-  
 num, uel cinnamomi aut hordei decoctum. Somnū  
 statim à cibo fugiat. Si propter gingiuarum aut den-  
 tium corruptionem factor oris acciderit, corporisq;  
 plenitudo fuerit, ex uena humerali primum sanguis  
 mittendus erit, et dein cucurbitule ceruici affigende.  
 Sin cacochymus fuerit corpus, medicamēto idoneo  
 humor redundans ac molestas uacuandus erit. Cor-  
 pore uacuato localibus utendū; in quem usum col-  
 lutiones mirifice conferunt, qualis hęc est, quę. R.  
 rosarum rub. plantaginis. añ. M. i. s. gallarum, balau-  
 stia. nucis cupressi. añ. 3. ii. corticum granatorum. 3. i.  
 s. aluminis liquidi, roche nominant. 3. i. Decoquan-  
 tur in aqua sufficiēti, usq; ad tertie partis absumptio-  
 nem. Colaturę adde mellis rosati colati, rob nucum  
 uiridium. añ. 3. s. diamoron. 3. ii. fiat collutio, cum q̃  
 calida dentes et gingiue colluantur. Proderit etiam  
 frequens collutio ex aqua, cui acetus sit permixtus,

mane

Signa.

Victus.

Curatio.

Venę se-  
ctio.

Purgatio

Localia.  
Collutio



Si acalida  
intemperie.

mane & statim à cibo . Non parum etiam confert cō  
manducatio pyrethri , tamaricis & rutę . Collutio  
item ex aceto scyllitico , aut decocto saluigę , aut cum  
solo uino . Decoctum mentę ex aceto & aqua iuuat ,  
si illo assidue os colluatur . Si à calida intemperie fit  
oris fœtor , contrariis curetur medicamentis . Sin ab  
humore in ore uêtriculi corrupta accidit , per ea quę  
humorem illum uacuare possunt sanetur . Commo-  
de autem per uomitum uacuabitur , qui iis quę Cap.  
20. diximus , concitandus medicamentis uenit . Dein  
confectiones stomachum roborantes , ut est aroma-  
ticum rosaceum , diambre , miuaq; cotoneorum ex-  
hibenda . Medicamenta uero quę in omni cau-  
sa competere solent , sunt gariophylli , masti-  
che , macer , lignum aloës , cinnamomuz ,  
rosę , santali , nux myristica , cube-  
bæ , & alia eiusmodi .

### LIBRI PRIMI FINIS.



# DE ONHARTI EVCHSII

## DE MEDENDIS SINGULA

rum corporis partium à sum.

mo capite ad imos usque  
pedes passionibus.

LIBER

SECUNDVS.

De Columellę Inflammatione.

C'p. I.



AR NOS A Quædam parti  
cula in summo ore appet depē  
dens, si quis aperto plurimum  
ore toto linguaz deprimat. Hęc  
ueteribus Grecis duob. appella  
tur nominibus, γὰρ γὰρ αὖ τ' αὖ  
ωρ, idest, gurgulio et colūna. Po  
steriores autem ferē omnes κιο  
vi δ' α, hoc est, columellaz uocat.

Columel  
ia quid.

Sepe admoduz inflammatione afficitur, id quod ex  
influxu humorum ad illam contingere solet. Visu  
apprehenditur potissimum passio, acceditq; in deglu  
tiendo difficultas, dolor, tumor partis patientis, et  
febris. Viētus ratio talis sit, qualis in ceteris ferē  
inflammationibus. Conuenit autē præcipue quies,  
inediaq;. Curandi uero ratio si plenitudo affuerit,  
etasq; et alia permiserint, à uenę sectione auspiciāda  
erit. Incidenda autēz primū uena in cubito exterior,  
quam humeralem uocant, deinde ea quę sub lingua  
est. Alius etiam clysteribus subducenda, ut hac ra  
tione non tantum uacuentur, uerum etiam auertan  
tur à loco patiente, humores confluentes. In quem  
usum etiāz conuenit scapulis affigere cucurbitulas.  
Neq; hic negligenda sunt auxilia quę fluxum repri  
munt, qualia sunt quib. adstringendi facultas inest.

Causa.  
Signa.

Viētus.

Curatio.

Venę se  
ctio.

Auerfio.

Reprimen  
tia.

Vten



Gargaris  
ma.

Utendum itaq; hac collutione, quæ. R. Succirof-  
rum, plantaginis, prunelle, oxalidis, solani. añ. 3. i.  
diamoron, rob de ribes. añ. 3. s. rob de oxyacanthi  
quam berberim uocant. 3. ii. aceti in quo rhus, hoc  
est sumach, maceratus sit. 3. i. succi malorum gran-  
torum. 3. s. misce, fiat collutio. Vel hoc gargarismen-  
tum. R. Rosarum rub. rubi. añ. M. i. balauft. cortice  
cis malorum puniceorum, gallarum, glandium. añ. 3. i.  
iii. s. rhois, hoc est, sumach, hypocistidos. añ. 3. i. s. f.  
oxalidis, sc. citoniorum. añ. 3. i. Decoquantur in li-  
1. aque fontane, dum altera pars absumatur. Cola-  
tur adice diamoron. 3. i. rob nucum uiridium. 3. i.  
aceti optimi. 3. vi. misce, fiat gargarismus. Et iis qui  
dem in principio utendum: et tum maxime, ubi affe-  
ctus non habuerit maiorem causam, nec ægri corpus  
multis humoribus refertum fuerit, aut particula a-  
fecta natura debilis. Sin contra acciderit, sepe quid-  
in principio, sepe uero paulo post, id est, in tertio die  
quipiam ex discussoriis commiscendum erit, ut est  
semen lini, fœnigræci, et althææ, radix iridis, atq; me-  
Omnia autem hæc tepida sunt exhibenda: frigus enim  
non tolerant inflammata. Si uero in uigorem peru-  
nerit passio, gargarisset decoctionem fursurum ca-  
lidam, aut decoctum glycyrrhiæ, hyssopi et ficuum  
hæc enim non solum discutere, uerumetiam mitiga-  
re malum possunt. Extrinsecus proderit, spongiæ  
oleo amygdalino madefactis et expressis fouere cer-  
uicem. Aut lana mollis oleo tineta, collo circumpo-  
nenda. Cataplasmata quoque ex farina hordei, aut  
semine lini, aut fœnigræci, aut ex iis simul mixti  
ad mouenda.

## De angina.

## Cap. II.

Κυράγχη

**K**υράγχη καὶ οὐράγχη Græcis, Latinis uero angina, proprie est inflammatio, quæ in gutture ue-  
faucibus fit: sic dicta ἀπὸ τοῦ κυράγχου ἢ οὐράχου

Χσγ



sv, hoc est, à suffocando, quoniam pestiferum & acu-  
 tissimum sit malum, quod strangulatu præsentaneus  
 ite discrimen inferre solet. Hippocrates tamen &  
 alii ueteres, omnes passionis iis locis accidētes, quas  
 spirandi difficultas comitatur, angine nomine appel-  
 ant. Suntq; eius proprie loquendo quatuor diffe-  
 rentie. Vna, ubi fauces inflammantur. Altera, quum  
 neq; fauces, neq; relique oris partes, neq; etiam ex-  
 ternarum partium ulla inflammata uidetur, eger tñ  
 suffocationis periculum in gutture sentit. Tertia, ubi  
 gutturis partes tum externe tuz interne similiter in-  
 flammantur. Quarta, ubi ad anteriorem regionem  
 ceruicis uertebre luxantur, unde cauus apparet lo-  
 cus, & dolorem quum tangitur eger sentit. Recentio-  
 res, ut Paulus lib. 3. Cap. 27. & alii quidam, inter cynā-  
 chen & synanchen, item paracynanchen & parasynā-  
 chen, discrimen fecerunt, quod tamen Galenus lib.  
 4. de Locis patientibus Cap. 5. reprehendit. His itaq;  
 πυρρὰ γλχη dicitur inflamatio, que in interioribus fau-  
 cium musculis oritur. Quæ uero in exterioribus  
 earundem musculis fit, παρασυναγλχη iisdem nomina-  
 tur. Eodem modo & in gutture se habet. Si enim in-  
 teriores eius musculi inflammatione confluentur,  
 πυρρὰ γλχη: si autem exteriores, παρασυναγλχη his ipsis  
 appellatur. Oriuntur à sanguine copioso ac calido  
 præter naturam ad loca iam cōmemorata confluen-  
 te. Cognoscuntur iis notis. Spiritus non nisi recta  
 ceruice, aut difficulter trahitur. Nonnullis febris orit̃  
 dolor, faciei rubor, & colli. Ad hæc tumor etiam in q̃  
 busdam superuenit. Aeger ore hiat: cibuz non deuo-  
 rare, non potionem potest. In principio itaq; p̃ceps  
 ac compendiarium auxilium omnis angina requirit.  
 Protinus igitur cubiti uenam anteriorem eiusdeꝫ la-  
 teris incidere oportet, nisi quiddam maioris pericu-  
 li impediatur. Parcè autem, & pluribus interpositis uici-  
 bus, non uniuersis, sanguis auferendus. Quippe cu-  
 mulata

Παρσιν  
 γλχη.

Κυναγλχη  
 Causa.

Signa.

Curatio.

Venæ se-  
 ctio.



mulata uniuersumq; facta uacuatione, anima ipsis  
 deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum  
 materia in affectam partem ubertim prorumpit. Cu-  
 randum etiam, ut modica fiat uenę diductio. Nam  
 quum in aliis, tuz in magnis uenę diductionib. acer-  
 uatim animi defectus irruit. Neq; tamen angustiores  
 facere uenę incisionem conuenit, ne sanguis uelut  
 percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, quę  
 causa huius passionis existit. Si per hęc parum profi-  
 citur, eas quoq; uenas incidere cōuenit quę sub lin-  
 gua sunt. idq; primo statim die. Quod si quid uenę  
 incisionem fieri prohibeat, alius acriore clystere q̃-  
 lem in Cap. de Apoplexia descripsimus, subduci de-  
 bet. Post uniuersales autem euacuationes, cucurbi-  
 tas apponere oportet. Et si quidem tumor circa ma-  
 xillas, aut sub mento persistat, in ipsum tumorem, &  
 cum scarificatione plurimum sanguinem extrahere,  
 saleq; respergere scissuras, & confricare. Quod si nul-  
 lus extrinsecus appareat tumor, retro in collo iux-  
 ta primam uertebam cucurbita infigenda erit, & cō-  
 stanti attractione utendum, frequentiusq; cucurbi-  
 ta auellenda. Auertendi etiam humores, ne ad lo-  
 cum affectum confluant. In quem usum pedes aqua  
 calida foueri debent, extreme partes ualide deligari  
 & fricari. Collum quoq; lanis oleo calido imbutis  
 contegatur. Gargarizandum etiam statim per initia  
 ex iis quę Cap. i. de Columellę inflammatione dicta  
 sunt. Cum morbus uiget constituē, iis quibus di-  
 scutiendi uis inest utendum propere p̃sidiis, ut est  
 decoctum fœnigręci, ficuum, passularum, glycyrhizę  
 uel ualentiorum, iridis radice, hyssopi, nigellę, abro-  
 tani, cum oxymelite. Tale itaq; gargarisma, proderit  
 quod. ℞. Glycyrhizę decorticatę. ʒ. i. passularu. ʒ. s.  
 ficuum aridarum numero. vi. fœnigręci. ʒ. ii. hyssopi  
 abrotani. añ. M. s. Coquantur in lib. i. aque fonta-  
 nę, usque ad medietatis consumptionem. Colaturę  
 adice

Clyster.

cucurbita

Averso.

Gargaris-  
mi.Gargaris-  
ma.



liice mellis rosacei colati. ʒ. i. s. oxymelitis simpli-  
s. ʒ. i. misce, fiat gargarisma. Item stercus caninū ar-  
um contusum, & cum melle perunctum, præstantis-  
simum est remedium. Atq; huius generis albus ma-  
ime, tum hirundinum similiter cinis efficax est. Fo-  
s ceruici etiam adhibeantur, quæ discutere ualent  
utaplasmata & emplastra, quale est quod. R. Faring-  
e minis lini, fœnigræci, hordeaceæ. añ. ʒ. i. se. altheæ. ʒ.  
maluæ, flor, camomillæ, meliloti. añ. M. i. ferueant  
in aqua, donec mollescant: dein in mortario contū-  
antur, adiectis oleorum chamæmelini, liliorum al-  
poruz. añ. ʒ. i. s. fiat cataplasma. Non inutile est, si col-  
um oleis chamæmelino, anethino, liliaceo inunga-  
ur, aut decocto fœnigræci, meliloti, chamæmeliq; fo-  
leatur. Qui angina infestantur, triduo aqua mulsa  
pro cibo utantur: inde ptisanæ cremore per se, aut cum  
uiaui quadam portione. Præditus enim est is succus  
facultate extenuandi, discutiendi, alendi, & refrigerā-  
di. Deinde ubi inflammatio imminuta fuerit, & egrī  
melius iam deglutire cœperint, ouoꝝ lutea perliquida,  
ac sorbitiones ex alica exhibebis. In summa, cibi egrī  
uiribus respondeant: ideoq; inmodica alimenta ui-  
tanda. Somnus quoq; ut in omnib. aliis inflamma-  
tionibus, sic in angina omnium maxime fugiendus.  
nā Hippo. teste, sanguis in summo intrō magis repit.

De tussi.

Cap. III.

**T**ussis uarię sunt causę. Nam intemperies frigi-  
da respirationis instrumentorum tussis efficit.  
Humor etiam à capite in asperam arteriam de-  
stillans, & sola asperitas membranę asperam arteriā  
intrinsecus ambientis, tussim irritant. Qui præter la-  
buntur etiam potus & cibi, tussim mouent. Lumbrici  
quoq; stomachum infestantes, tussiculas paruas exci-  
tant. Acris deniq; humor stomachū perturbans, ac  
irritatiuā aliquā qualitātē ad fauces demittens, tussim

Cataplas-  
ma.

Vitis.

Cause.



Signa.

sim producit. Humor etiam in pulmone et thorace detentus, in morbo laterali, inflammatione pulmonis, et tabe, maxime tussis causa existit. In summa, quod quid asperam arteriam exasperare potest ueluti fumus, puluis, et eiusmodi, tussis causa esse potest. Signum autem obsolam intemperiem frigidam tussis est, si per crebras inspirationes irritentur, frigiditate uidelicet exinde intensiore facta et aucta. Facie denique sunt pallida, si ti nulla premuntur, calidis optime, frigidis male afficiuntur. Moderate et minime uolenter tussunt. Id quod. 6. Epid. 2. par. Aphor.

12. sic scribens testatur Hippocrates: Tusses siccae, leuiter irritantes, non a maligno, sed uento potius accedunt. Id uero hinc manifestum fit, quando loquuntur, aut os aperiunt, tunc tussunt: cum uero non, minime. Quae uero cum titillatione partium ab utraque palati parte contingunt tusses, palam ostendunt de fluxum a capite ad asperam arteriam deferri, itemque ad pulmonem. Id quod ex difficili, quae comitatur, spiratione deprehenditur. Quod si sic affecti nihil expuant, tenuem defluxum indicat, qui expulsionem spiritus dissectus, praetenuitate sua rursus fluxum reuertit. Ratio uictus iuxta causarum diuersitatem

Vitus.

uariabitur. Si enim ex frigida intemperie instrumentorum respirationi deseruientium orta fuerit tussis aer et uentus, cibi et potus frigidi uitandi erunt. Sin ob humorem a capite destillantem excitabitur, talis fit uictus ratio, qualem supra in Cap. de Destillatione descripsimus. In uniuersum uero salia, acrida, et quaecumque arteriam exasperare ualent, uitanda. Tussis ex frigiditate orta, per ea quae instrumenta respirationis calefaciunt curabitur. Cervix itaque lanis calidis uestiatur, raro inspirandum, adeo ut non solum per spiritus compressionem retinere queant aegrotates et impedire tussim, sed sanare etiam sepiissime, per respirationis inhibitionem frige factas particulas calefaciendo.

Curatio

ciendo.



endo. Quapropter si hi leniter inspirant & aëres at-  
 ahunt, ac in calida domo uersantur, parū uel om-  
 ino nihil tussunt. Thorax etiam calidis unguētis,  
 t est oleū irinum, liliorum alborum, anethinum, &  
 iusmodi. Si uero humor tenuis & acris ex capite in  
 horacem destillans tussim excitauerit, tū per cibos  
 otis. boni succi, & per medicamenta quę refrigerāt,  
 pissant, & acrimoniam mordacitatemq; arcent & ob-  
 undunt, curabitur. In hunc sanē usum conuenit ex-  
 hibere syrupum uiolaceum, nympheę, de papauere,  
 confectiones diatragacanthę, diapenidii sine specie-  
 bus pilulas bechicas, & eiusmodi. Item ea etiam medi-  
 camenta, quę a ueterib. dolorem leuantia & arteriaca  
 dicuntur. de quibus Galenus copiosissime scribit lib.  
 7. de Comp. medi. secundum locos. Potissimum au-  
 tem hoc conferet, quod. R. Conseruę uiolarum, &  
 nympheę. añ. 3. s. diatragacanthę frigidę, diapenidii  
 sine speciebus. añ. 3. vi. succi glycyrrhizę. 3. ii. pilula-  
 rum bechicarum. 3. i. styracis calamitidis. 3. i. s. myr-  
 rhę, rosarum siccarum. añ. 3. i. tragacanthę, nucū pi-  
 nearum. añ. 3. s. cum syrupo uiolaceo quod satis est,  
 fiat ecligma. Conueniunt etiam quę suprā in Cap.  
 de Destillatione dicta sunt. Si autem crassus aut ui-  
 scosus fuerit affligens humor, per ea quę extenuant  
 & incidunt medebimur. Exhibebimus itaq; syrropos  
 de glycyrrhiza, de hyssopo, de prasio, de calamintha,  
 & similes. Aut decoctum hoc, quod. R. Radicum iri-  
 dis, petroselini, glycyrrhizę. añ. 3. i. radicis inulę cam-  
 panę uocatę. 3. s. caricarum numero. vii. passularum  
 mundatarum. 3. i. se. urticę, anisi, fœniculi. añ. 3. ii.  
 hyssopi, adianti, scabiosę, prasi. añ. M. i. s. agari-  
 ci op-  
 timi. 3. iii. Decoquantur in aqua fontana iustę quā-  
 titatis, donec tertiā pars absumatur. Deīn colentur,  
 & colaturę adiiciantur syrapi de hyssopo, de pra-  
 sio. añ. 3. ii. s. misce, fiat potio. Posthęc, si uidebitur  
 utile, corpus per ea quę crassos & glutinosos humo-  
 res

Tussis a  
 tenuibus &  
 acris hu-  
 moribus cu-  
 ratio.

Ecligma.

Tussis a  
 crassis &  
 viscidis hu-  
 moribus  
 curatio.  
 Decoctus

Purgatio

F res



Agarici  
dilutum.

Loch.

Unguen-  
tum.

res purgant, uacuandum. Inter alia uero multa quae  
supra dicta sunt, unice confert agarici dilutum, quod  
sic fit. ℞. Agarici electi. 3. ii. 3. i. gingeris. 3. i. salis generosi  
me gr. iii. macerentur per noctem in uini albi odorati  
feri. 3. ii. succi absinthii et fœniculi. añ. 3. i. Mane co-  
lentur et exprimantur, et dissoluatur in iis ecligmati-  
indi. 3. ii. oxymelitis scyllitici. 3. s. et fiat potio. Vacuo  
to corpore ecligmata (quæ officinis Loch appellantur)  
exhibenda, de pino, sanuz et expertum, de scylla, diab-  
ris solomonis confectio, et similes, quæ singula in  
hunc modum coniungenda sunt. ℞. Loch de pino  
sani et experti, de scylla. añ. 3. ii. s. diaris solomonis  
3. i. trochiscorum pectoralium. 3. i. s. pulueris diape-  
nidii cum speciebus. 3. i. pulueris radicis inule, iridis. añ.  
3. ii. s. succi glycyrrhizæ. 3. i. s. cum syrupo de prasio quod  
satis est, fiat ecligma. Thorax extrinsecus inungatur  
oleis calidis liliorum alborum, irino, amygdalarum  
dulcium, adiectis pinguedinibus et aliis, in hunc quidem  
modum. ℞. Oleorum liliorum alborum, amygdala-  
rum dulcium. añ. 3. iii. pinguedinis gallinæ. 3. i. buty-  
ri recentis. 3. ii. muci fœnigræci, radicis althææ. añ. 3. i.  
s. styracis calamitidos. 3. s. pulueris radicis inule, iri-  
dis. añ. 3. i. croci. 3. s. cum cera quod satis est, fiat un-  
guentum. Reliqua quæ ad tussis curationem requi-  
runtur, ex Capite de Destillatione petenda erunt.

De asthma.

Cap. III.

Asthmati-  
ci.

Suspensio  
fi.

Orthop-  
noia.

Causa.

**Q**ui citra febrem crebro respirant, quemad-  
modum solent qui citatiore cursu fatigati  
sunt, eos medici Greci Asthmaticos, Latini  
Anhelosos et suspiriosos uocare consueuerunt.  
Eosdem etiam propterea quod thoracis corpus peni-  
tus rectum habere coguntur, ob suffocationis timo-  
rem, orthopnoicos nominant. Fit autem asthma, quum  
aut crassorum humorum ac uiscosorum multitudo  
pulmonis bronchiis fuerit infarsa, aut tumor quif-  
piam



in abscessui similis in ipso cōstitit. Similiter au-  
tem difficulter spirant, qui asperam arteriam à mul-  
ta destillatione habent repletam. Facile autem inui-  
si hę passiones distinguuntur. Nam destillatio etiā  
nis ex manifesta causa repente accidit, in totum fe-  
citra febrem, concomitantibus etiam propriis de-  
illationis signis. Si uero tumor abscessui similis in  
ulmone fiat, necessariò febris consequitur: neque  
a diu post, inflammatione in pus transmutata, pus  
eicitur cum tussi. Si autem crudum tuberculum gi-  
natur, hi neq; grauitatem magnam sentiunt, neque  
difficultate spirandi admodum infestantur. Qui p-  
rie asthmatici et orthopnoici appellantur, in totum  
ebrem non habent grauitatis uero sensus eis con-  
ingit, neq; quippiam purulentum per sputum reie-  
tant. Viētus ratio in uniuersum calida et sicca sit.  
Vitandus itaque aēr frigidus et humidus. Utendum  
carnibus perdicum, auicularum montanarum, galli-  
narum, caponum, et similibus. Fugiendi pisces, fru-  
tus, item legumina, et omnia alia quę crassos ac glu-  
tinosos humores procreare possunt. Utendum fre-  
quenter hyssopo, oreoselino, et fœniculo. Vini autē  
potio ambabus conuenit affectionibus, saltem te-  
nuis substantiæ. In uniuersum autem paucus potus  
conuenit, quibus abscessus oboritur: multus uero,  
quibus bronchia tenacibus et crassis humorib. sunt  
obstructa. Etenim hos humores repurgantia medi-  
camenta necessario ruses commouent. uerum non  
facile per sputum reicitur ob crassitudinem id quod  
repurgatum est: humectatione igitur multa indi-  
get, quo facilius efferatur. Exercitio utendū ante ci-  
bum at non subito, quod multi hac ratione extincti  
sint. Frictiones etiam thoracis prosunt. Fugiat eger  
irram, mororem, et alias animum uehementer pertur-  
bantes affectiones. Porro curatio predictarum pas-  
sionum quiddam commune habet, quiddam etiam

Signa.

Viētus.

Curatio.

F ii pro



proprium. Commune quidem utrisq; ut redundanti-  
 tia humoris has passiones generantis consumatur  
 aboleatur. Proprium autem, ut si à crassis ac tenaci-  
 bus humoribus fiat passio, per extenuantia & exten-  
 gentia medicamenta sanetur. Si uero à tumorib. a  
 scessu similibus oriatur passio, p extenuantia & ex-  
 cantia. Quæ sanè curandi ratio omnibus in profun-  
 do corporis ab scessibus communis existit. In crassis  
 itaq; & tenacibus humoribus, conueniunt extenuan-  
 tia & abstergentia citra uehementem calefactionem  
 ab immodico si quidem calore, quemadmodum etiam  
 frigore, prædicti humores magis crassescunt, coagu-  
 tur, & contrahuntur, ita ut subinde difficulter aue-  
 abstergiuè possint, Quapropter maxime prodest  
 oxymeli scylliticum, ipsaq; scylla assa, cum melle  
 ta & delineta. Syrupus item de glycyrrhiza, de prasi,  
 aut hyssopo, & decoctum quod supra in Capite  
 Tussi commemorauimus. Quod ad euacuationem  
 attinet, si necessitas urgeat, uena in cubito media  
 aut interna ante hæc omnia incidenda, & tantum san-  
 guinis quantum uires patiuntur detrahendum. Si  
 corpus plethoricum non fuerit, facta humorum  
 euacuationem præparatione, medicamenta quæ cras-  
 sos & tenaces humores uacuare possunt, frequenter  
 exhibenda. Conueniunt in hunc usum pilule de ag-  
 rico, & cochleæ. Confectio diaturbit cum rhabar-  
 ro, ecligma Indi, diaphenicon. Dandum etiam dis-  
 tum agarici, quod præcedenti Cap. descripsimus. Alui  
 quoq; clysteribus fortibus eluenda. Vomendū etiam  
 per interualla ex sumpta radícula, & aliis quæ uo-  
 tum mouent, de quibus diximus lib. 1. Cap. 20. In  
 rea dum frequentior fit purgatio, exhibenda etiam  
 medicamenta quæ sensim & paulatim extenuare  
 discutere humores in thorace possunt. Intro corpus  
 quidem, aristolochia rotunda, inule & iridis radi-  
 semen urticæ, hyssopus, nigella, calamintha, & eius-  
 modi

Prepara-  
tio.

Vene se-  
ctio.

Purgatio.



De Medend. Morbis. Lib. II. 85

odi, ex quib. decocta uel ecligmata construenda.  
hunc usum loch, quę in Cap. de Tussi recensui-  
us, conuenient. Thoraci forinsecus cataplasmata  
ficub. & hordeacea farina, cui adiecta sit refina, ce-  
& mel imponenda. Vnguenta etiam & olea, magis  
alefacientia, irinum, anethinum, & rutaceum admo-  
tenda thoraci, in hunc confecta modum. ℞. Oleoꝝ  
anethini, rutacei. añ. 3. iiii. s. adipis anatis, gallinę. añ.  
ii. radicis iridis, inulę. añ. 3. i. se. lini. 3. i. styracis ca-  
amitidis, 3. iiii. cum cera quantum sufficit, fiat unguē-  
tum. Thorax tamen nunquam non antea fricandus  
panno aspero, quo apertis meatibus facilius uis me-  
dicamentorum ad profunda penetrare possit. Cæte-  
rum abscessus qui attenuantib. & reficcantibus indi-  
gent, ut diximus, maxime aromatum gaudent facul-  
tatibus, quas omnes constat esse tenuium partium &  
reficcatorias, nec non calefacere. Conuenient itaq;  
tum theriaca, mithridatis confectio, diamoschi dul-  
cis, aromatici rosacei, & similes.

Cataplas-  
mata.

Vnguen-  
tum.

abscessus  
curatio.

De pleuritide. Cap. V.

**I** Vespertis est inflammatio membranę, intrinse-  
cus costas succingentis. Fit ex sanguine co-  
pioso calido, ut alię inflammationes, ad mem-  
branas prædictas præter naturam confluente. Hujus  
accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua,  
dolor uehementer pungēs, pulsus durus, & ferre mo-  
do asper. Et si sputum rubrum & cruentum fuerit, san-  
guinem superare significat. si flauum & subpallidū,  
flauam bilem. Quemadmodum rursus, si album fue-  
rit, & leuiter spumosum, pituitam; nigrius uero, me-  
lancholiam in sanguine præualere monstrabit. Suc-  
co ptisanę primis duob. dieb. contentus in cibo sit  
eger. Dein cum ptisana amygdalę mundatę & tritę  
decoquantur, idq; matutino potissimum tempore.  
Vespere sumat lac amygdalarum, aut panis puri mis-  
E iiii cas

pleuritidis  
Causa.

Note.

Vitius.



Curatio.  
Vena se-  
ctio.

2. Visc. a  
cut. 10.  
Clyster.

Famenta.

Empla-  
strum.

cas cum iure gallorum, maxime ubi egri vires imbecillas uideris. Pisces etiam saxatiles in declinatione potissimum morbi dare conuenit. Acerba et adstringentia omnia uitanda. Potus sit, aqua decocti cinnamomi. Frigidam aquam, quod sputum in crudefcere faciat, uitabit æger. Decumbat in latus affectum, iramque et mororem fugiat. Curandi ratio confestim à uene sectione incipienda. Secunda uero uena cubiti interna in brachio è directo posita. hæc enim non solum à loco affecto retrahit, uerum etiam euacuat, ut in nostra Apologia ea de re conscripta fusissimè demonstrauimus: id quod in pleuritide et aliis inflammationibus internis maximopere requiritur. Eousque autem detrahendus sanguis, donec uel multo rubicundior, teste Hippocrate, uel pro puro rubidoque; liuidus effluxerit. Dein clyster aluo infundatur leuis, si non ut conuenit, sua sponte deiciat. qualis est qui. ℞. Maluæ, foliorum uiolarum, mercurialis, spinachie, intybi domestici utriusque. añ. M. i. hordei integri. ʒ. i. Coquantur in aqua iustę quantitatris, quoad tertia pars absumatur. ℞. Colaturę libra 3 unam, casie recens extractę. ʒ. i. s. oleorum chamæmelini, uiolacei. añ. ʒ. i. s. butyri recentis salis inextertis. ʒ. s. salis communis. ʒ. i. misce, fiat clyster. Forinsecus à corporis uacuatione calorifica ac dolo-rem leuantia fomenta adhibenda erunt, ut sunt sacculi ex floribus chamæmeli, anethi, meliloti, phlomis (tapsum barbatus nominant) seminibus lini et scenigræci, milio et furfure compositi. Aqua etiam calida, aut decoctum prædictorum medicamento- rum, aut olea calida in utre, uesica, uel uasculo adhibenda. Quinetiaque utiliter admouetur sponsia magna mollisque; iam dictis rebus intincta, et subinde expressa. Vestienda uero fomenta sunt, ut eorum uis non celeriter euanescat. In hunc etiam usum conuenient emplastra, in eum modum composita. ℞. Florum



lorum chamæmeli, uerbasci (tapsum barbatum uo-  
ant) anethi. añ. M. s. seminis lini, fœnigræci. añ. 3.  
i. seminis anisi. 3. i. farinæ hordei p. i. Buliant in aq̃  
sq̃ ad mellis crassitudinem. Dein adice oleorum  
hamæmelini, anethini, nardini. añ. 3. i. s. Buliant de  
uo, & addantur duo uitelli ouorum, croci. 3. i. & fi-  
t enplastrum. Post septimum diem, si eodem modo  
olor persistat, cucurbita lateri affigenda est, & cutis  
scarificanda. Manifestissima enim in pleuriticis uti-  
tas ex cucurbitæ appositione apparet. Vulnuscula  
autem scarificati loci sale inspergenda, si egri sustine-  
re queant. in aliis uero linteolum oleo madefactum  
siciale conspersum imponatur. Sequenti deinde à  
scarificatione die optimum est, rursus cucurbitam  
affigere, quo sanguis saniosus ex impactis uulnusu-  
lis extrahatur. Non negligat etiam medicus exhibe-  
re intro corpus ea quæ ad sputi facilem excreatio-  
nem faciunt medicamenta, ut sunt diapenidion, dia-  
dragacanthum frigidum, saccharum uiolaceum, tro-  
chisci pectorales, adiectis etiam interdus loch, & aliis  
in Cap. de Tussi commemoratis. Extrinsecus adhi-  
benda medicamenta quib. discutiendi inest facultas  
ut sunt fœnumgræcum, anethum, melilotum, hyssop-  
us, & similia iam sepe commemorata. Quod si per-  
mutationis in pus signa appareant, coadiuuare per-  
mutationem oportet, hoc autem simili unguento:  
quod. R. Oleorum chamæmelini, amygdalarum dul-  
cium liliorum alborum. añ. 3. iii. butyri salem nō. ex-  
pertis, pinguedinis gallinæ. añ. 3. ii. ceræ quod satis est  
fiat unguentum. Rupta phlegmone, ea quæ ex terget  
atq; purificant à pure ac sanie exhibenda: ut est aqua  
mellis, aut decoctum, hordei, aut sacchari rubei. Fa-  
cta absterfione puris & saniei, glutinantia adhiben-  
da medicamenta: de quib. omnib. in Cap. de phthisi  
copiosè dicemus.

E iiii De

Cucurbita

Spull eda

Etionez fa

cillem f am quid

oier.lla. huc an

collige, i. bi. si

et alia in ista

suppura

tionem tu

uantia.

Vnguen

tum.



Peripneu  
monia.

Causa.

Signa.

Vicus.

Curatio.

**P**eripneumonia est inflammatio pulmonis, cum febre acuta. Hec plurimuz ex ualentibus in pulmonez destillationibus, aut angina, aut asthma, aut pleuritide aliisue morbis contrahitur. Aliquando etiam ipsa inflammatio passionis origo est. Huiusmodi affectum subsequitur difficultas spiritus, febris acuta et ardens, grauitas distensioque thoracis citra dolorem. Quod si pellicule ipsius, que cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexę, fuerint inflammate, etiam dolorem percipiunt. Male in his rebus habent, nalis in summo fit sinus, uenę temporum eluantur, oculi intumescunt, prostratus est appetitus, lingue adest siccitas, aque frigide, magis autem aeris frigidi concupiscentia, expiratio calida, tussis sicca. Si uero quid efferatur, spumosum est ac biliosum, ampliusque cruentum et floridum uehementer. Quod ad cibum attinet danda est peripneumonicis sorbitio ex ptisanę cremore cum melle, origano aut hyssopo: magis enim quam in pleuritide, extenuationis cibis opus est. Chondrus etiam seu alica coctus ex aqua mulsa iis conuenit. Potus exiguus sit quantitate, humiditas enim nocet pulmoni. Possunt uirginitatis tuende gratia, potissimum si suffocatio urgeat, uti mulsa per se, et cum nucleis pineis: aut mulsa in decoctum sit hyssopum aut iris sicca aque mulse inspergenda. In uniuersum autem uictus ratio eorum qui peripneumonia afficiuntur, eadem fere sit quam pleuriticorum. In iis qui ex aliis morbis in hunc incidunt affectum, sanguinis detractio uitanda est, maxime si diu malum hoc durauerit, uel si per initia sanguinez miserint. Alius clysterib. ducenda, si egre deiecit aut cucurbitule, ubi nihil obstat, thoraci et lateribus admouende sunt, eaque per grandes et multe, cute incisa. Sin autem peripneumonia statim ab initio inuaserit,



alerit, confestim uena in cubito interna secāda est, si sustinuerint uires, ex utroq; brachio sanguis ex-  
rahendus: primus quidem modicus, & non usq; ad  
nisi defectiōem, ut uidelicet asseruetur ad repetē-  
lam extractiōem. Si uero quid prohibeat uenę se-  
ctiōem, cucurbitulas certe uniuerso thoraci late-  
ribusq; affigere opz iisq; tantuz sanguinis eliciendū,  
quantum uires patiuntur. Aut acri clystere aluum  
eluere conuenit ex decocto nimirum hyssopi, iridis,  
rutæ, adiecta colocynthide, sale & aliis quę suprà in  
Cap. de Apoplexia dicta sunt. Posthęc curanduz ut  
sputi eductio quā celerrime & facillime fiat. In quę  
sanē usum ea quę suprà in Cap. de Pleuritide memo-  
rata sunt ecligmata, unguēta, & emplastra cōueniūt,  
tantum in eo diuersa, quod hic omnia ualentiora, &  
maiori extenuandi facultate prędita esse debent. Cō-  
uenient itaq; loch, decoctum hyssopi & iridis, oleum  
rutaceum, nardinumq; ceratum ex oleis iaz dictis, te-  
rebinthina, medulla ceruina, iride & hyssopo tenuissi-  
mē tritis p̄fectum thoraci & lateribus impositum,

Sputi eductio.  
Cap. VII.

## De cruento sputo . Cap. VII.

**A**ιμοπτοῖς aut rectius αιμπτῖσις, est sanguinis  
spuitio seu reiectatio. Fit ex causa interdum  
externa & manifesta, nempe delapsu ex alto, aut  
si grauius aliquod corpus thoraci inciderit, clamo-  
re magno aut frigore, nam id rumpere uenas scribit  
Hippocrates, & consimilibus; Nōnunquam ex occul-  
ta, ueluti plenitudine, aut oris uenarum apertione,  
aut earundem erosione. Venarum autem ora aperiū-  
tur ob calidas dispositiones pręcedentes, ueluti si ca-  
lidis balneis plurimis usus sit homo, habiterq; in ca-  
lida regione, consimili existente maximē anni tēpo-  
re, cibis quoq; & potionibus calidis utatur. Ipsa uero  
uaforum erosio ex acribus contingit humoribus, si  
ne à capite in pulmonem delabentibus, seu in ipso  
pul-

Αιμοπτοῖς  
τῆς.

Causa.

6. Epid.

par. 3.

Apb. 10.



Signa.

pulmone generatis. Porro sanguis modò ex thora-  
 ce ⁊ pulmone, aut aspera arteria educitur: modo ex  
 aliis locis, oris, aut gingiuarum, aut faucium, aut co-  
 lumelle, aut uentriculo, ad quem ex uenis ac partib.  
 adiacentibus, iecore nimirum ⁊ liene, sanguine dela-  
 bitur. Cause externe ⁊ manifeste è sermonibus æ-  
 grotantis aut assidentium cognosci possunt. Si ob  
 plenitudinem accidit, tum confertim sanguis reiici-  
 tur. At si propter oris uenę apertionem, tum ea quę  
 diximus precesserunt, ⁊ neq; inflammationes, neq;  
 febres, neq; labores torquent, sicut in iis euenit q ob  
 exesas uenas sanguinem expuunt, sed contrà uacua-  
 ti melius leuiusq; agunt. Si uero ex uenarum erosio-  
 ne cruentum sputum editur, non confertim, sed pau-  
 latim sanguis reiicitur, ⁊ semper peius habent. Cete-  
 rum sanguis qui spumosus ⁊ subalbidus atq; ex in-  
 teruallo cum tussi absq; dolore reiicitur, ex pulmo-  
 ne fertur. Si uero pituitosa cum tussi leuiore reiiciā-  
 tur, ex aspera arteria prodire scito. Si ater sanguis ⁊  
 in grumum concretus fuerit, doloremq; in loco in-  
 tēdat, ex thorace educi significatur. Si uero ex locis  
 circa fauces aut columellam sanguis feratur, per ex-  
 creationes excernitur. Si uero ex aliquo loco oris  
 aut gingiuarum, simpliciter expuitur. Accidit autē  
 nōnunquam per palatum sanguinem educi, propter  
 hirudinem deuorata, ⁊ alicui indidem particula  
 adhærescentem, id quod localis dolor qui concomi-  
 tatur patientēz particulam, ⁊ sanguis ipse qui tenuis  
 est ⁊ serosus, ostendent. Si ex stomachoeductio fiet,  
 non magna sanguinis eruptio continget, graciles  
 enim stomachi uenę. Si uero ex iecore ⁊ liene san-  
 guis in uentrem deferatur, aderit tumor. Si autem  
 a capite sanguis feratur, titillatio palati accidit, ⁊ fre-  
 quens excreatio, atq; hoc modo expuunt; irritantur  
 enim ad tussim, ⁊ tamen non ualde tussunt. Sanguis  
 etiam colore niger est, mixtus cum aliquo pure uel  
 pituita,



ituita, & cum excreatione statim se in linguam in-  
 ert rotundus, facileq; reiicitur per sputum. **Victus** **Victus.**  
 rio fit talis quę moderatam quandam adstringen-  
 i facultatem obtineat. Utatur itaq; oryza, alica, fru-  
 mentaceisq; aliis cibis, quibus succus mali granato-  
 um, aut pirorum adiectus sit. Conuenient ex carni-  
 bus columbe syluestres, turdi, perdices, si cum ompha-  
 io seu uua acerba rhoë obioniorum coquantur.  
 Tendendum etiam cotoniis, piris, pomis adstringenti-  
 noris rubi, & aliis supra in Capite de profluvio san-  
 guinis narium memoratis. Bibendum uinum crassū  
 ubeum, aut pro eo aqua, in qua chalybs ignitus ex-  
 inctus est. Cauendum ab iracundia, clamore, frequē-  
 ti locatione & omni corporis motu. Curandi ratio  
 iuxta causarum diuersitatem uariatur. Si enim à ca-  
 pite feratur sanguis, simplicior & exigua sufficit cu-  
 ratio. Adstringentia enim per collutiones palato ad-  
 hibita frigida, nisi quod defertur multum sit, cura-  
 tionem perficient, quę sanè ex Cap. de Columellæ  
 inflammatione petenda sunt. Multum enim si à capi-  
 te defluerit, euacuatione sanguinis per nares, aut ue-  
 nę alicuius incisione opus erit. Qui ob destillatio-  
 nem sanguinem expuunt, his statim in principio ue-  
 nam incidere oportet, ac pro uirium modo sangui-  
 nem detrahare. Clysteri etia; adhibito alius euacua-  
 da. Deinde frictis quàm plurimum brachiis ac cruri-  
 bus extreme eorum partes ligentur. Postea uero ca-  
 piti raso medicamentum cui exiccandi & discutiēdi  
 facultas inest, quale est quod ex fimo syluestrium co-  
 lumbarum constat, imponendum. Aliaq; deinceps  
 omnia quę destillationem reprimere & sistere pos-  
 sunt, de quibus suo diximus loco, adhibenda. Qui  
 ex pulmone sanguinem reiiciunt, ruptis scilicet ue-  
 nis, aut earundem oris patefactis, iis præcipiendū in-  
 primis ne respirent ualde, sonumq; edant, & ut parū  
 loquantur & sileant. Incidere etiā statim uenā oportet.

Curatio  
 sanguinis  
 a capite  
 destillan-  
 tis cura-  
 tio.

Curatio  
 eorum quę  
 ob destil-  
 lationem  
 sanguinē  
 expuunt.  
 Frictio.

Curatio  
 eorum quę  
 ex pulmo-  
 ne sangui-  
 nem reici-  
 unt.



Adstringe  
gentia.

Ecligma.

Unguen-  
tum.

tet in cubito internam, ac sanguinis detractionē bis  
aut etiam ter reiterare pualatim reuellendī gratia.  
enim euacuatione copiosa indigent tales, nimirum  
à passione ipsa euacuati. In hunc sanē usum frictio-  
nibus extremitatum, et earundem cum latis lintheo-  
lis constrictione et ligatura utendum. Postquāz hæc  
peracta fuerint, primum quidem poscam dilutam et  
tepidam bibendam exhibere conuenit, ut si quis san-  
guinis grumus in uiscere hereat inde dissolutus eii-  
ciatur, neq; quicquam obstat bis et ter in tribus ho-  
ris hanc potionem iterare. Post hæc autēz medicamē-  
ta adstringentia et obstruendi meatus uim habentia  
intrinsicus et extrinsicus adhibeantur. Per os quidē  
sumpta proficiunt portulaca comesta, succus autem  
eius bibitus efficacior est; succus plantaginis, poly-  
goni, uue acerbe, decoctus rhois (sumach appellant)  
galle, corticis glandium, radicis rubi, balaustiorum,  
seminis oxylapathi, radicis equiseti, et aliorum quæ  
in Capite de Sanguinis ex naribus profluuiū dicta  
sunt. Vtus etiam sit huius ecligmati, quod. R. Con-  
serue rosarum ueteris, rob de ribes. añ. 3. i. diatraga-  
canthi frigidi, diacitoniton simplicis. añ. 3. s. pulue-  
ris corallorum, lapidis æmatidos, terræ lemnix (fi-  
gillatam uocant.) añ. 3. ii. boli armenix. 3. i. sangui-  
nem draconis. 3. s. balaustiorum, thuris. añ. 3. i. s. cum  
syrupo myrthino quod satis est, fiat ecligma. Extrin-  
secus thorax ex uino adstringente oleisq; cotoneo-  
rum, rosaceo, aut myrthino irrigandus. Si uero mul-  
ta sanguinis eruptio fiat maxime in estate, et citra tuf-  
sim eius reiectiones contingant, neq; debilis sit eger  
sed robustus et carnosus, acetum pro uino adinuen-  
dum est spongiis exceptum. Proderit iam dictis oleis  
adiicere bolum armeniam, terram lemniam, coral-  
los, et similia, ac cum cera componere unguentum  
quale infra lib. 3. Cap. 3. describemus. Cataplasma  
quoq; ex palmulis (dactylos uocant) acatia, sym-  
phyti



hyti radice, cortice mali granati, & lentium farina  
 pparatum, adhibendum. Nec minus confert quod  
 x carnibus malorum punicorum, thure, corallis  
 ubeis balauftiis, bolo armenia, terra lemnia, & eius-  
 modi componitur. Maximum enim hoc est, cui dili-  
 genter animum attendere oportet, ut mox facta ua-  
 lorum ruptura, & dum adhuc cruentum est uulnus,  
 concreſcat priuſquam inflammatio apprehendat.  
 Etenim ſi inflammatio præuenerit, parum ſpei eſt ad  
 huiusmodi uulneris conſutationem, quippe quæ  
 ſe in multos dies extendit. Eluere enim oportet tuſ-  
 pus, tum ſeroſum ſanguinem ipſius ulceris, poſtea-  
 quam inflammatio fuerit ſoluta: reliquam autem  
 curationem, quemadmodum in tabidis fieri ſolet,  
 ordinare oportet. Qui ab eroſione ſanguinem ex-  
 puunt, iis primum quæ acres humores in pulmonem  
 deſtillantes purgare poſſunt medicamenta exhiben-  
 da, ut in Capite de Deſtillatione dictuſ eſt. Deinceps  
 ea quæ alterare & incrāſſare acres & tenues humores,  
 atq; adeo ſiſtere deſtillationeſ ualent, ut eſt ſyrupus  
 uioſarum, roſarum, myrthinus, miua cotoneorum,  
 & alia quæ paulo ante memorata ſunt. In hunc uſuſ  
 interdum ſyrupum de papauere, & alia narcotica &  
 ſtupeſacientia adhibemus. Deſtillatione ceſſante,  
 corroſe partes cibis boni ſucci, & medicamentis car-  
 nem generantibus reſciantur. Porro qui uomunt  
 ſanguinem, eadem uictus ac curandi ratione, quæ an-  
 tea dicta eſt utantur, ſola hac cura adhibita, ne cre-  
 bro cibum, aut potum ſumant. Quippe facile curan-  
 tur, ſi auxilia quæ bibuntur particulis ipſis ſanguis-  
 nem fundentibus applicentur. At ſanguine in uen-  
 triculo inſtar grumi concreto, coagulum potandus  
 eſt, maxime leporinum, uel thymbra ſeu ſatureia cū  
 aceto, uel ex aloë ſic affecti uacuari debent. Qui  
 per palatum ſanguinem excreant, gargarizabunt ex  
 adſtringentibus, frontiſq; & capiti admouenda ſunt  
 quæ

Curatio  
 eorum qui  
 ab eroſio-  
 ne ſan-  
 guinem  
 expuunt.

Curatio  
 eorum qui  
 uomunt  
 ſanguinem

Curatio  
 eorum qui  
 per pala-  
 tum ſan-  
 guinem  
 excreant.



que ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur. Porro postquam omnia, ut postulat ratio, peracta fuerint, et sanguinis fluor substiterit, vires ipsi reficiendæ sunt, roburque adhibendum. In primis autem cauendus frequens usus balnei, vini potio, ira et uenus.

## De Empyemate.

## Cap. VIII.

Empyema

Causa.

S. aph. 10.

Signa.

**E**ΜΠΥΗΜΑ, purulenta excreatio atque suppuratio Latinis dicitur. Et ΕΜΠΥΗΜΑ, hoc est suppurati seu purulenti uocantur. Fit quando abscessus in membrâ intrinsecus costas succingente, aut aliqua alia thoracis factus aceruatim rumpitur, et in uacuum thoracis locum effunditur inter pulmonem, et membranam costas succingentem. Interdum propter sanguinis eruptionem ulcere ad cicatricem non perducto, interim etiam propter confluxum ex capite et aliis partibus superioribus illuc manantem, ut in angina iuxta hoc Hippocraticum: Quicumque ab angina liberantur, his ad pulmonem uertitur, et in septem diebus pereunt: si uero has effugerint, suppurantur. Cognoscas autem suppuratos hoc pacto. Grauitas adest thoracis, tussis ualida siccaque cum dolore, aliquando etiam cum humiditate, ob quam releuari quodque uidentur, febricula per initia affligit, languida, inordinata, et ad iudicandum difficilis. Postquam uero ruptura abscessus iam appetit, uehementius cum quodam horrore febricitant, ac in sermone conturbantur, offendunturque spiritu. Rupto abscessu aliquid in profundo thoracis transfluere apparet, iuxta multiplices reclinacionis permutaciones, et maxime quum ab uno latere in alterum decumbunt, tunc sanè multitudo puris manifestatur, et fluctuationis cuiusdam sonitus sepe sensibilibus in reclinacionibus ipsorum auditur. Pus etiam educitur, nunc purum, nunc faculentum. Erumpunt autem suppuraciones aliquæ



quæ quidem sursum in uacuum uidelicet thoracicum locum, & hæ periculosiores existunt. Aliquæ uero orsum, & hæ quidem in aluum & intestina ac uesicam transfunduntur, per uasa quædam transmissione eas partes facta. Semper autem hectica febris laborant suppurati, quoad sursum omnia fuerint educuntur. Victus ratio suppuratorum talis sit. Aërem inhibent siccum. Cibis utantur boni succi & concocti facilibus, iure gallorum, carnibus gallinæ, pullo, auium montanarum; iure etiam cicerum cum herbis hyssopo, & oreoselino (petroselinum officinale vocant.) Potus sit aqua mulsa, aut uinum album ac lenue. Porro nisi in iis summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio tabes accersit. Primum igitur puris concoctio & digestio adiuuanda fomentis per spongas, cataplasmatibus & emplastris hordei, fœnigræci, & seminis lini farinis, caricis, inguibus, columbarum fimo, althea, & resina modica compositis. Cerata etiam ex butyro, iride, baccis auri & ruta confecta adhibenda, & alia quæ collectiorem maturare & discutere possunt: qualia multa in Capite de Asthmate dicta sunt. Posthæc si malum non discutitur quæ abscessum rumpunt admoventur. Rupturam autem promouet in latus sanum decubitus, salsorum esus, & catapotia illa dormituro data, quæ. R. pulueris hieræ picræ Galeni. 3. i. pulpæ, colocynthidis. 3. i. cum succo absinthii fiant pilule, quarum una aut altera teneatur in ore. sic enim eger expuere conabitur, ac nimium expuendo abscessus rumpetur. Ruptione facta diligenter animaduertendum erit quo pus proreptet. eius enim excretionem adiuuare oportet. Quod si ad aluum prorepat, magis emollientia sint ea quæ offeruntur. Si uero ad uesicam serpat, ea quæ urinam magis cient adhibenda. Si uero per uesicam puris repurgatio fiat, nihil conuenientius aut familiarius exhiberi potest, quàm ptisana optio melle permixta.

Victus.

Curatio.

Rupturam  
abscessum.



Pur repur  
gantia.

mixta. Possunt etiam ea abstergentia quæ partim in  
Cap. de Pleuritide dicta sunt, et partim subinde in  
Cap. de Tabe dicuntur exhiberi. Ceterum quæ urinam  
ciant, cibis comode admiscuntur, undecumque tandem  
puris excretio contingat. Ad puris uero repurgatio-  
nem mirifice utilis est aqua mulsa cum iride, et plu-  
ma glycyrrhiza decocta. Radicis etiam dulcis succus  
comanducatus prodest. Conuenit et decoctum hyssopi,  
iridis, marrubii, et similibus quæ ex Cap. de Asthmate  
petenda erunt. Porro quæ deinceps in curatione suppu-  
ratorum necessaria sunt, ea in sequenti Cap. dicemus.

### De tabe. Cap. IX.

Tabes.

Cause.

Signa.

s. aph. 14

s. aph. 11

c. 12.

Curatio  
cur diffi-  
cilis.

Videtur.

**T**Abes quam quidam etiam Græci appellant, pro-  
prie est corporis extenuatio quæ pulmonis ex-  
ulceratione sequitur. Fit propter humoris acris  
et erodentis à capite in pulmonem defluxum. Et quæ  
puris aut sanguinis eruptio in suppuratis, peripneu-  
monicis, et pleuriticis cohibetur. Tabidi cognoscuntur  
tur corporis totius et carnis extenuatione, nares  
etiam iis acute, collapsa tempora, oculi concaui, spæ-  
ruleque instar alarum prominent. Tussunt quoque ac  
febre hectica febriunt, difficulter spirant, genæ liue-  
scunt, ungues curuatur, pallidi que apparēt. Malo uin-  
cente, uenter turbatur, sitis ipso magis conficit, cap-  
illi defluunt, et id quod per sputum reicitur uehemen-  
ter foedi odoris est. Difficillime autem curantur ul-  
cera pulmonis, propterea quod citra tussim non re-  
purgantur. Tussientibus autem ulcus dirumpitur,  
atque quasi circuitu quodam malum reuertitur. Medi-  
camentorum præterea uires ad ulcus priusquam in  
uentriculo permutentur peruenire non possunt. De-  
nique per respirationem pulmo semper mouetur, ac tussien-  
do lacinatur. Vt cumque aut difficilis sit curatio,  
tamen nihilominus conandum ut ulceratio illa curetur.  
**Primum itaque curandum, ut conuenienti uictus ratioe**  
utantur.



utantur tabidi. Aërem siccum & in calore & frigore  
temperatum inhabitent. Cibus illoꝝ sit ptisana hor  
dei, lac amygdalarum, oua sorbilia, carnes auiũ mō  
tanarum, perdicum, phasianorum, merularuꝝ, turdo  
rum, gallinarum, caponum, uituline, hēdi lactantis.  
Pisces squamati, saxatiles, potissimuꝝ uero cancri flu  
uiatiles. Lac uero inter omnia cibaria tabidis opti  
mum, primum humanum, dein asininum & caprinũ,  
quod ex mammis, si fieri potest, sugatur, aut statim  
mulctum dum adhuc calet bibatur, quēadmodum  
fussimē Galen. lib. 5. Ther. meth. docuit. Animad  
uertendum tamen ut statim à lactis usu alius cibus,  
potissimum uero uinum, non sumatur, quod sic in  
uentriculo corrumpetur. Quod si tamen impen  
se febricitarent, putrida maximē febre, lactis usus  
non cōduceret. Inter fructus prosunt passule, amyg  
dale dulces, nuces pineæ, ficus, palmulæ, (dactylos  
uocant) pistacia. Exercitia & motus uehementes de  
uitent, suauiter tum ante cibum deambulare haud  
incommodabit, à cibo penitus quiescant. Somno  
utantur nocturno & mediocri. Fugiant iram, tristi  
ciam, uigilias immodicas, famem, sitim, coitum, laco  
nicuꝝ, & quicquid corpus exinanire potest. Potus sit  
uinum aquosum & tenue, aut si febris est uehemens,  
cinnamomi decoctum, aut Hippocras uulgo nomi  
natum, cuius compositionem pete ex Cap. de Reso  
lutione. Curandi uero ratio si à defluxu humoris  
acris ex capite sit, à destillationis amolitione incho  
anda erit, quam peculiari Capite supra docuimus.  
In præsentia quæ ulcerationeꝝ pulmonis curant do  
cebimus. In primis itaq; quæ abstergerendi ui prædita  
sunt, & quæ ut facile pus sursum feratur efficiunt ex  
hibenda erunt. In quem usum conuenit hydromeli,  
decoctum hordei cum saccharo & melle. Item hyssō  
pi, iridis, caricarum, adianti, & similium. Syrupus  
de hyssopo, prasio, & glycyrrhiza. Si febris accedit,  
G semi

Curatio.



Glutina-  
tia.

Ecligma.

Pulvis.

Vires re-  
parantes  
mor juli.

semina frigida predictis comisceri haud inutile erit. Extrinsecus adinouenda emplastra & cataplasmata ex semine lini, fenogreco, & aliis in Cap. de Emphyemate memoratis. Ex Cap. etiam de Asthmate multa remedia ad presentem usum conducentia petenda erunt. Absterfo iam & a pure purgato pulmone ea quae ulcera eiusdem glutinare possunt medicamenta sunt exhibenda. Commendatur in hunc usum ab omnibus saccharum rosaceum, quod & abstergendi & glutinandi facultatem obtinet. Abstergit autem magis recens, glutinat uero antiquius. Mirifice etiam confert bolus armenia, sanguisq; draconis (hodie appellatus,) succinum coralli, se. portulacae, & similia quibus adstringendi & glutinandi facultas inest. Prodest etiam loch de pulmone uulpis, conserua symphyti maioris & adianti, ut. R. Conseruarum symphyti maioris, adianti, hoc est, capilli ueneris. añ. 3. s. sacchari rosacei. 3. i. loch de pulmone uulpis. 3. ii. specierum dragacanthi frigidi. 3. iii. boli armeniae. 3. ii. cum syrupo de papauere fiat ecligma. Conueniet etiam is pulvis quotidie exhibitus, qui. R. Se. papaueris albi. 3. v. gummi arabici, amyli, dragacanthi. añ. 3. i. s. seminum portulacae, althaeae, maluae. añ. 3. ii. s. seminum cucumeris, melonum, citrulli, cucurbitae, cotoneorum. añ. 3. iii. s. Eboris usti, succi liquiritiae. añ. 3. i. s. penidiorum ad pondus omnium & fiat pulvis, de quo mane dentur quotidie. 3. ii. cum syrupo de papauere, aut rosaceo. Hoc quoque tempore quo cicatrix obducitur, extrinsecus thoraci oleum myrthinum, aut rosaceum adhibendum, adiectis interdum rhoë obsoniorum, hyposisthidae, malicorio, acatia, galla & similibus. Postremum corpus iusta & conuenienti uictus ratione reficiendum, in quem usum mirifice confert hoc medicamentum quod. R. Pulpe caponis. 3. i. testiculorum galli, nucum pinearum, pistaciorum, amygdalarum dulcium. añ. 3. s. specierum ecligmatis de gemmis. 3. s. specie



specierum diarhodon abbatis, dianthos, aromatici  
rosacei. añ. 3. i. santaloꝝ alborum, cinnamomi electi  
añ. 3. s. maceris. 3. i. sacchari cādidissimi lb. i. dissoluti  
in aq̃s boraginis ⁊ rosarum fiat p̃fectio in morsulis.

## De cordis palpitatione.

## Cap. X.

**C**ordis palpitatio est passio, quam alio nomine *cordis pal-*  
tremorem cordis appellant. Practicarum uero, *pitatio.*  
ut uocant scriptores, perperam cardiacaz nomi-  
nant. καρδίακὴ enim ad stomachum, queꝝ ueteres olim  
καρδίακὰν dixerunt, pertinet, ut alibi copiose monstra-  
uimus. Fit ab omni eo quod cor præter naturaz affi- *Causa.*  
cere potest, ut est intemperies omnis, aut humoris mul-  
tudo in ambiente cor tunica contenta, aut tumor  
præter naturam, ⁊ alia quæ à Galeno lib. 5. de Patiē-  
tibus locis Cap. 1. recensentur. Dignoscitur facile *Signa.*  
de sermonibus egri palpitationem hanc euidenter  
sentientis, ⁊ ex pulsu. In calida intemperie febris, ⁊  
pulsus uelox atq; magnus existit. In frigida, contra.  
Si humoris multitudo in pericardio contenta palpi-  
tationem fecerit, pulsus est mollis ⁊ languidus. *Vi-*  
ctus ratio iuxta causas morbuꝝ efficientes uariatur.  
In calida itaq; intemperie aēr sit mediocriter frigi-  
dus, in frigida, mediocriter calidus. Quapropter  
ad eum modum, quem in doloribus capitis curan-  
dis exposuimus, instituatur. In uniuersum autem ui-  
tandum q̃cqd spiritum uitale resoluat ⁊ perturbat: ni-  
mius estus, ira, fames, uigilia, coitus, frigus immodi-  
cum, cibi mali succi. Si multitudo humoris in ambiē-  
te cor membrana contenta palpitationem procrea-  
uerit, tota diēta sit extenuatoria. Potus in calida in-  
temperie sit uinum aquosum ⁊ tenue, aut iuleb uiol-  
larum, uel rosarum, aut decoctus buglossi (quod ho-  
die borrago dicitur.) In frigida uinum meracius bi- *Curatio*  
batur. Qui ob calidam intemperiem palpitatione *calida in*  
corripiuntur, iis per frigida queꝝ intemperie corrigere, *temperet*

G ii ⁊ cor



et corroborare possunt succurrendum: ut ex simpli-  
 cibus medicamentis sunt rose, uiole, nymphaeae flores  
 sautali, coralli, caphura, et similia. Ex compositis dia-  
 margariton, diarhodon abbatis, saccharum rosaceum  
 uiolearum, buglossi, et earundem herbarum succi et  
 syrupi. Ex iis potiones, ecligmata et confectiones per  
 uniuscuiusque arbitrio componi possunt. Extrinse-  
 cus ad mouenda unguenta, emplastra: potissimum au-  
 tem epithemata et sacculi, et alia quae calidam intem-  
 periem asterare possunt. Tale itaque unguentum com-  
 ponatur, quod. *℞.* Oleorum rosacei, uioleae, nym-  
 phaeae. an. 3. ii. corallorum rub. santalorum rub. rosa-  
 rum rub. an. 3. i. caphure gr. ii. cereae albae quod satis  
 est, fiat unguentum. Potest eo spina dorsi, aut cordis  
 regio inungi. Imponatur cordi hoc epithema quod  
*℞.* Aquae rosarum, acetosae, buglossi. an. 3. iii. aquae  
 melissophylli. 3. i. specierum confectionis cordialis,  
 3. i. santalorum rub. corallorum rub. an. 3. s. caphure  
 gr. iii. croci gr. iii. misce, fiat epithema. vel fiat hic sac-  
 culus qui. *℞.* Florum buglossi, uiolearum, rosae rub.  
 an. p. i. santalorum omnium. an. 3. i. corallorum rub.  
 et alborum. an. 3. i. s. margaritarum. 3. i. Redigantur  
 in puluerem, et cum serico fiat sacculus. Ceterum qui  
 frigida cordis intemperie laborant, iis profunt am-  
 bar, moschus, crocus, lignum aloes, styrax, gariophyl-  
 li, macer, zedoaria, melissa, et similia. Ex compositis dia-  
 mbre confectio, dianthos, aromatici rosacei, plirisar-  
 coticon. Ex iam dictis uaria remediorum genera compo-  
 ni possunt, haud secus quam in calida cordis intem-  
 perie. Conuenit autem potissimum hoc unguentum quod  
*℞.* Oleorum de lilio, de spica, de croco. an. 3. ii. galli-  
 moschatae, aliptae moschatae. an. 3. i. ligni aloes. 3. s.  
 maceris. 3. i. croci gr. iii. cereae quantum sufficit, fiat un-  
 guentum. Epithema quod. *℞.* Aquarum melissae, maioris  
 nae, buglossi, an. 3. i. specierum diambre, diamoschi. an.  
 3. s. maceris, ligni aloes, an. 3. i. ambre gr. i. uini opti-  
 mi.



mi. 3. i. misce, fiat epithema. Sacculus qui. 2. Florum  
 melissę, buglossi. añ. M. i. cınamomi electi, gariophyl  
 lorum, maceris. añ. 3. i. ligni aloës. 3. i. corticum citri.  
 3. i. s. croci. 3. i. ambre gr. 1. R. edigatur singula in pul  
 uerem & fiat sacculus cuz serico ut suprà. Porro si ab  
 humore aliquo in pericardio ptento palpitatio oria  
 tur, extenuanti uictus ratione, & uenę sectione q̄ in  
 cubito est curabitur, Gal. lib. 6. de Patien. loc. Cap. 1.  
 teste, qui ibidem sic scriptuz reliquit. Palpitatio cor  
 dis pluribus integra ualetudine degentibus tuz ado  
 lescentib. tuz adultis, subito sine alio manifesto sym  
 ptomate euenire uisa est, atq; oēs eos sanguinis de  
 tractio iuuat. Nāq; hoc pacto pleriq; perfecte ab hoc  
 symptomate liberati sunt: p̄sertim qui utebantur  
 & uictu & medicamentis, quibus esset extenuandi fa  
 cultas. Facile itaq; quouis ex iis Galeni uerbis & quę  
 antea dicta sunt curandi rationē instituet, ita ut diu  
 tius in ea immorari superuacaneum putem. Aliun  
 de igitur petant, quod hic omissum est.

Sacculus

Si ab hu  
more fil  
palpitatio  
cordis.

## De syncope. Cap. XI.

**S**yncope Gale. lib. 12. Ther. meth. autore p̄ceptus  
 est uirium lapsus. Fit ob plurimā sanguinis, aut  
 uentris excretionē, motuz uehementez, dolorem  
 ingentem, uigilias, omnez immoderatā inanitionez,  
 timorem, terrorem, & alias animi perturbationes, ob  
 crudorum deniq; humorum copiam, inflātionis  
 magnitudinem, uitiosos & erodētes humores, aureq;  
 foetide inspirationē. Cognoscitur iis notis. Pulsus  
 est rarus & obscurus, extremarū partium frigiditas,  
 sudor circa faciē, nitoris cutis eiusdē ablatio, & toti  
 quasi corporis resolutio. Notę uero quibus causa  
 diuersitas deprehenditur ex aliis Capitib. quę partiz  
 p̄missa sunt, partim uero deinceps sequentur petē  
 de erunt. Generalis curandi rō nulla est, sed h3 ferē  
 quęuis causa symptomatis suam peculiare, curatio  
 nem.

Syncope  
Cause

Signa

Curatio



Si propter  
sanguinis  
excretionē

nem. Si enim propter sanguinis aut uentris excretio-  
nē, aut immoderatos sudores et repentinās alias eua-  
cuationes fit syncope, frigida faciem aspergere opz,  
aut aqua rosacea. Extremæ etiā corporis partes uin-  
culis uehementer constringendę, ac lintheis modice  
asperis fricandę. Crura quidem, si suprà eruptio fiat  
manus uero, si infrà. Cucurbitulæ quoq; pro diuer-  
sitate partiu, ex quibus sanguis erumpit, affigendę.  
Os quoq; aperiendum, pennarum aut digitorū im-  
missione: auditorius autem meatus, et nares compri-  
mendę, ut inspiratus aēr interiora petens, spiritus re-  
ficere ac excitare queat. Confestim etiam rebus odo-  
ratis animum reuocare conuenit. Nihil enim est, Hip-  
pocrate in lib. de Alimento teste, quod uires odore  
citius reuocet. Prodest itaq; pullos gallinaceos affos  
ac per medium discerptos, naribus egrorum admo-  
uere. Post hæc, iusculis concoctu facillimis alendus  
egrotus. Vinum etiam huic tenue et dilutum exhibē-  
dum. Balneum alui tantu profluuiū conuenit, aliis  
minime. Cubiculi aēr sit frigidus, stratis in pauimen-  
to rosas, uitium palmitibus, rubis, quercus foliis, et  
huiusmodi adstringentibus. In immoderato sudore,  
exudantibus partibus oleum myrthinum, rosaceu,  
cotoneorum illinendum: in primis uero collu, tho-  
rax, loca sub alis et inguinibus. In hunc usum etiam  
conuenit amyllum, et thuris pollinem, candido oui  
excepta, aliaq; adstringentia illinire. Odoramenta  
quoq; uaria offerenda, rosę, santali, poma cotonea,  
caphura, flores nymphae, et similia. Extremas autem  
corporis partes non oportet uincire. Si ob dolorē  
syncope fit, iis remediis quibus dolor aufertur, cura-  
bitur: quę singula suis locis, potissimum uero in Ca-  
pi. de Coli doloribus dicentur. Qui ob mœrorem,  
gaudium, et alias animi perturbationes syncope cor-  
ripiuntur, ii contrariis curandi erunt, odoribusq;  
et aliis quę per os sumpta spiritus recreare possunt.

Si pro-



Si propter crudorum humorum copiam syncope cor-  
 ripiuntur, tum neque sanguinis missionem, neque pur-  
 gationem sustinent, utpote quos etiam sine his syn-  
 cope subito aderiatur. Inaniendi itaque per frictiones  
 erunt. Initio igitur morbi statim incipere oportet, ac  
 primum crura à superiore parte deorsum, linteis, non  
 admodum mollibus, sed modice asperis: deinde et ro-  
 ta brachia ab humeris pariter ad infimas partes per-  
 fricanda. Vbi uero artus omnes abunde calidi uide-  
 tur, et metus est ne quis ex ampla frictione lassitudi-  
 nis sensus superueniat, oleo relaxante utendum, qua-  
 le est anethinum, et chamæmelinum. Cum iam artus  
 plurimum perfricueris, postea oleum detergetur. In-  
 de ad spinam dorsi transeundum est, hæcque tota per-  
 fricanda similiter: ab hac rursus ad crura, et hinc ad  
 brachia, exinde rursus ad spinam remeandum, et ita  
 toto die faciendum. Idque in splendido et minime hu-  
 menti cubiculo, cuius aer temperatus sit. Porro  
 mulla in qua hyssopum coctum fuit, his est aptissi-  
 ma. Cauendumque ne uel cibum, uel sorbitionem, uel  
 aquam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere si-  
 nas, nisi mullam tribus primis duntaxat diebus, ut  
 solum illud tempus intersit quod somno datur, qui  
 certe mediocris sit. Si pulsus robore mediocri sit, ac  
 magnitudine, considerata quæ ad aluum spectant:  
 et si iua sponte commode non deiciat, clysteri secu-  
 rus abluere. Accidit namque post aquam mullam, ut quæ  
 in primis uenis, quæ scilicet circa iecur et mesenterium  
 sunt, colliguntur superuacua, commode deiciantur.  
 Quod si iusto maior recrementorum impetus ad  
 aluum citeretur, mullam amplius percoquere oportet:  
 ita enim minus subducet. Si plenius superuacua  
 descendant, nec sic quidem sistenda aluus, sed exhi-  
 bendus pro aqua mulla ptisanæ cremor est. Si uero  
 fluere pergant, alicui sorbitione nutries. Si ex pul-  
 sus imbecillitate uires quoque collapsas didicerimus,  
 G. iiii panes

Si ex re-  
 dundantia  
 crudorum  
 humorum



*Syncope  
causae  
et curatio*

*Si ob  
tenuem  
humores  
syncope  
opprimuntur.*

*Si ob infla-  
mationis  
magnitudinem.  
Si propter  
erodentes  
humores.*

panes ex uino diluto exhibere conueniet: idq; si nec uenter, nec iecur inflammatione laboret. nam si hac infestentur, iam corpore crudis humoribus referto, nulla planè medicina periculo liberat. Atqui si quādo crassi abunde humores deprehendantur, oxymeli pro multa continuo exhibendum. Ergo si estas sit et eger frigide potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis: si hys sit, calidum omnibus. Sanè balneum iis est aduersissimum, tum aër ambiens uel nimium calidus, uel frigidus. Porro iis quos syncope iaz premit, si partes modo cōmemorate inflammatione uacent, panis exhibebitur modicus, isq; ex uino fuluo, quod celerem in corpus digestionem adiuuet. Et si estas adsit et constitutio calida, aqua frigida uinum dilues: si contra, calidam miscebis. Inde ad fritionem ueniendum est, quæ pro tradito quoq; iam modo administrabitur. Verum quibus ex flaua bili, quæ os uentriculi infestat, syncope incidit, iis frigida offerenda potio est: nonnunq; etiam uinum, quod calidum natura sit, fuluum colore, et substantia tenui. Qui tenuium humorū uitio syncope premunt, hos paulatim nutrire oportet, summamq; cutem densare et aërem cubiculi refrigerare. Ungendi sunt adstringentibus unguentis: tum cibi iis dandi, qui non admodum promptè diffuant, ut est panis, sorbitiones alicę, ouorum sorbilibus uitelli, gallorum testiculi, et eiusmodi. Vinum iis aquosum inter initia dandum est, sumptum à cibo. Si ob inflammationis magnitudinem syncope accidat, artus fricandi et fouendi, manusq; ac pedes uinciendi, uigilię imperandę. Quicūq; uero propter uitiosos humores erodentesq; syncope corripuntur, ii curandi sunt ad eum modum, qui infra de Doloře stomachi exponetur. Qui exquisitam et pleniorē syncope curandi rationem desiderat, is legat quę tradit Gale. lib. 12. Ther. methodi, et quę infra Cap. 4. Libri tertii dicuntur.

De



**L**actis defectus accidit propter siccam mammillarum, aut totius corporis intemperiez, propter sanguinis boni paucitatem, & quia infans imbecillis non probè ex mammis sugit. quāto enim plus sugendo ex illis adimit, tanto magis attrahitur. Notè, quibus caularum diuersitas deprehenditur, notiores sunt quā ut dici debeant. Sicca enim intemperies ex habitu corporis macilento, & aliis suprà dictis dignoscitur. Sanguinis boni paucitas, ex malo corporis habitu, & ex iis quę præcesserunt corporis, mensium nimirum aut alui profluuiis, exercitiis immodicis, inedia & similib. inanitionibus. Posthabito itaq; lactis defectu qui fit ex intemperie sicca, quę facile ex iis quę suprà dicta sunt, & deinceps in Cap. de Hætica dicentur, curabitur, de eius tm̃ qui ex sanguinis boni paucitate fit curatione dicemus. In quo sanè primū san- Causa.

guis est contemplandus, sic monente Galeno lib. 5. Simpl. Cap. 20. aut enim minor est quā conuenit, aut deterior. Itaq; qui minor est, uniuersaz uictus rationem exposcit humectantem & calefacientem mediocriter. Quęcunq; enim plus quā expediat calefaciunt, quęq; desiccant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis uitiantia, partim ipsum minorem reddentia, lac prouenire prohibet. Dare itaq; conuenit panem purum, lac, carnem uitulinam, pul- Signa.

lorum gallinę, perdicum, hędorum, oua sorbilia, pisces saxatiles & squamatos, passulas, amygdalas dulces. malas, lactucam, buglossum, melissophyllon, cucurbitas, & eiusmodi. Bibendum uinum aquosum, tenue. Fugiendum immodicum exercitium, ira, mœ- Vicius.

ror, & omnia quę sanguinem minorem efficere possunt. Si uero deterior est sanguis, si quidem biliosus fuerit, primum purgationem desiderat biliosi hu- Curatio

moris, mox uictum quem modo diximus, Sin pitui- tosis,



Lac gene  
rantia.

tosus, medicamenta requirit excalefacientia aut primo, aut secundo ordine: non tamen desiccantia. hec enim pituitosos humores excalefacientes in sanguinem uertunt. Verum inter ea potiora sunt, quæ non tantum sunt medicamenta, sed & nutrimenta: uelut eruca, feniculum, anethum, apium, fenum, eaq; uirentia priusquam siccentur. Nam sicca plus quam oportet & excalefaciunt & desiccant. Quæ autem & desiccant humorem sanguinis depalcentia, crassiores simulq; pauciores efficiunt. Et si natura quoq; sint calida, iusto etiam calidiores; si frigida, frigidiores. Debet enim esse modice calidus, ac nequiquam crassus, ut ex eo lac generetur. Proinde quæ mediocriter excalefaciunt, nullamq; insignem adiunctam habent siccitatem, lactis procreatricem facultatem obtinet: inter quæ, præter ea quæ dicta sunt, est sesamum in uino decoctum. Item butyri recentis. 3. i. cum uino pota. Præterea amygdalæ dulces, pistacia, nuclei pinearum triti, & cum butyro comesti. Laudatur etiam hoc ferculum, quod sic conficitur. R. Orizæ decies ablutæ, exiccatæ, & in puluerem redactæ, coquanturq; in lacte optimo iuxta carbones ignitos, adiciaturq; inter decoquendum sacchari albissimi quod satis est, & fiat pulmentum. Fit præstantius, si addantur amygdalæ dulces, pistacia, nuges pineæ, faria hordei, cicer, & eius modi. Annitendum etiam erit, ut cum leni frictione thoracis, & aliis medicamentis trahendi facultate præditis, ad mammas lac alliciatur.

#### De lactis redundantia.

#### Cap. XIII.

σπαργάνωσις.

Causa.

Signa.

Curatio.

**A**ccidit ut interdum ob lactis redundantiam mamillæ tumefactæ repleantur, & sic extendantur, ut copiam eius uix ferre queant. Qui sanæ affectus Græcis σπαργάνωσις dicitur. Fit à causa contraria, nempe boni sanguinis copia. Visu tactuq; apprehenditur. Succurrendum statim huic affectui, quod



quod aliàs metuendum sit ne mammæ inflammatio  
ne corripiantur. Inter initia itaq; uena secanda popli  
tis, aut media quæ est in cubito. Dein utendum iis q̃  
leuiter reprimunt, ne scilicet ad pulmonem impetu  
quodam trudatur sanguis. In hunc usum proderit  
spongia, in posca madefacta, apposita. aut, palmulæ  
(dactylos uocant) cum pane & posca tritæ adhibitæ.  
Conuenit etiam apponere emplastrum ex oleo rosa  
ceo, santalis, coriandro, psyllio, portulaca, farina fa  
barum, lentium, plantaginis succo, & aceto, in hunc sci  
licet modum confectum. R. Farinæ fabarum, farinæ  
lentium. añ. 3. i. portulacæ. 3. i. se. lini, altheæ. añ. 3. ii. s.  
plantaginis, coriandri. añ. 3. ii. Buliant in aqua, do  
nec ad mellis crassitudinem redeant. dein addantur  
olei rosacei. 3. ii. succi plantaginis, aceti. añ. 3. i. buliāt  
denuo, & adiciantur ouorum, uitelli duo, ac fiat em  
plastrum. Vel potest fieri ceratum, sic compositum.  
R. Olei rosacei, myrthini. añ. 3. i. s. farinæ lentium, fa  
rinæ fabarum. añ. 3. i. s. mentæ, rutæ. añ. 3. i. plantaginis,  
coriandri. añ. 3. s. cum cera & resina. q. s. fiat ceratum.  
Erysimon etiam (quod rapistrum hodie uocant) mi  
rifice prodest, cum aqua & melle illitum. Ricini etiaq;  
folia trita, & apium uirens illitum, non modice pro  
sunt. Vniuersa deniq; uictus ratio talis sit, quæ pau  
cum procreet sanguinem: adeoq; inedia non parum  
conferre in hac passione potest.

Empla  
strum.

Ceratum.

Victus.

## De lacte in grumos conuerso. Cap. XIII.

**G**Rumescit lac, & in casei formam transit inter  
dum, quam passionem Græci θρομβωσις, quasi  
diceret grumescencia, nominare solent. Fit ob  
lactis abundantiam, quum scilicet è mammis nõ su  
gitur: & deinceps à nimia caliditate, qđ in eo tenuiuz  
erat partiuꝝ digesto, quod reliquum est concrescit.  
Idem etiam à frigiditate accidere solet, quæ ut con  
crescat lac nonnunquam efficere potest. Interdum  
etiam

Θρομβω  
σις.  
Causæ.







## De inflammatione mammarum. Cap. XV.

**A**Ccidit interdum, ut alię inflammationes, ppter  
 defluxuz sanguinis copiosi & calidi ad mamas.  
 Nonnunq; ob lac casei modo coactum, atque  
 subinde suppuratum. Facile discernuntur, quod  
 prior inflammatio iis quę neq; grauidę, neq; puerpe  
 re sunt accidat: altera uero, iam commemoratis dū  
 taxat. In prima confestim sanguis mittendus ex cu  
 biti uena interna, uel media eiusdem lateris, nisi mē  
 sium subesset retentio. tunc enim consultius est po  
 plitis uenam secare. Posthęc ad reprimētia uenien  
 dum medicamenta, quę non oportet esse ualida, ne  
 ad interiores corporis partes nobiles humorum im  
 petus trudatur: aut aliqua, quę discutere possunt, iis  
 miscenda. In hunc itaq; usum conuenit oleum rosa  
 ceum cum succo solani, aceto, & decocto chamemeli  
 lintheis in iis madefactis, & impositis mammę. Va  
 let etiam emplastrum ex farina hordeacea, semine li  
 ni, santalis, bolo armenia, adipe porcino, & oleo rosa  
 ceo confectum. Quod si reprimētia medicamenta  
 non contulerint, ad ea quę discutiunt statim ueniē  
 dum est. Conuenit itaq; adhibere hoc emplastrum,  
 quod. ℞. Farinę fabarum, farinę fœnigręci, seminis  
 lini. an. p. i. meliloti, chamemeli. añ. 3. ii. s. medulle pa  
 nis triticej. 3. s. myrrhę. 3. ii. Buliant in aqua sufficien  
 ti usq; ad mellis crassitudinem, dein addantur olei  
 chamemelini, anethini. añ. 3. i. s. & buliant iterum, de  
 in adiciantur uitelli ouorum numero. iiii. croci. 3. i.  
 & fiat emplastrum. In hunc usum lini semen, uel fœ  
 num gręcū in oxymelite decoctū illini potest, & alia  
 quibus discutiendi facultas inest, de quibus iaz sepe  
 dictum est. Quod si uero spes discutiēdi sublata fue  
 rit, maturatione auxiliabimur, quę hoc cataplasma  
 te perficietur, quod. ℞. Maluę. foliorum althę, uio  
 larię, chamemeli. añ. M. i. s. radicis althę. 3. i. Ebuliāt  
 in exi

Cause.

Signa.

Curatio

Adstrin  
gerita.Discutien  
tia.Empla  
strum.maturatio  
Cataplas  
ma.



Ruptio.

in exigua aqua ad mollitudinem usq; dein contun-  
dantur, & fiat cataplasma. Vel formetur emplastrum  
ex semine lini, foenigreci, caricis, radicibus althee, &  
liliorum alborum, adiectis oleis chamæmelino & li-  
liaceo, adipib. porci, galline, & similibus. Suppuratio  
ne facta mamillæ ruptione & sectione uè tentabis,  
idq; medicamentis aut ferro. Medicamenta suppara-  
tas mammas rumpentia sunt, finus columbinus, fer-  
mentum cum puluere cantharidum, calx uiua cum fi-  
mo anserino. Si ferro potius uti placuerit, locus p-  
pe pupillam lunari sectione accuratissime inciden-  
dus erit, ut iucisione abscessus quidē profunditas de-  
nuderetur, sed pupilla cōseruetur. Curatio reliqua ta-  
lis erit, qualis reliquorum ulcerum. Si ob lac coactū  
inflammatio accidit, tunc utendum per initia est spō-  
gia molli egelida posca imbuta, expressaq; loco fa-  
sciis superaccommodetur. Itē palmulæ (dactylos no-  
minant) cum pane & posca trite imponendæ. Vel utē-  
dum est ouo toto, cum rosaceo. Medulla etiā pa-  
nis adiectis myrrha, croco, menta, & aliis quæ  
in Capite de Lactis redundantia dicta sunt,  
imponenda. Deinceps si illa non contule-  
rint, reliqua ordine (ut iam comme-  
moratum est) adhibenda erunt.

LIBRI SEC VNDI FINIS.



XII  
**LEONHARTI EVCHSII**

DE MED'ENDIS SINGVLA

rum corporis humani partium à  
summo capite ad imos usque  
pedes passionibus.

LIBER

TERTIVS.

De Imbecillitate Ventriculi.

Cap. I.



**VENTRICULI** Imbecilli- *Causæ*  
tas ex quacunq; intemperie ob-  
oritur, nullis humoribus vitia-  
tis. Fit etiam ex humore in ip-  
so sinu ventriculi contento quā  
aut calefaciendi, aut perfrige-  
randi, aut humectandi, aut sic-  
candi, aut etiam horum aliqua  
per coniugationem efficiendi na-

turam obtinet: interim vero & in ipsas ventricu-  
li tunicas imbibito & impacto. Nudam qualitatem  
calidam testantur, fitis uehemens, cibi fastidium, ni-  
dorosiq; ructus. Frigidam contraria indicant, mo-  
dica fitis, immodica appetentia, acidi ructus. In hu-  
mida nulla, uel exigua saltem fitis ægrum affligit,  
saluæ copia adest. In sicca, linguæ siccitas, corpo-  
ris extenuatio, fitis uehementissima, saluæq; pauci-  
tas. Copiam autem humorum nausea, uomitus, gra-  
uitas ventriculi, & ructus à cibo potissimum osten-  
dunt. Et si flaua bilis redundat, oris amaritudo, bilis  
uomitibus, fitis, ructus nidorosi, ventriculi morsus  
aderunt. Sin piritua, nulla ventriculi erosio erit,  
ructus acidi, fitis nulla, tensio uentriculi. Si ab atra bi-  
le,

*Stigna.*



Curatio

le, tristitia et metus, ructus et excreatio foetida, pisces  
 olens. Curatio intemperierum per contraria fit. in  
 temperiem enim calidam refrigerare oportet, frigi-  
 dam calfacere: siccam humectare, humidam siccare.  
 Similiter uero etiam compositas intemperaturas aut  
 calfacere et siccare, aut humectare et calfacere, aut re-  
 frigerare et humectare, aut siccare et refrigerare opor-  
 tet. Calida itaque intemperie affecti, refrigerante ui-

Calida in  
temperiei

ctu curantur, precipue qui ex aceto assumitur. Pa-  
 nis igitur posca imbutus fit. Pullis gallinarum, per-  
 dicibus, carnibus uitulinis cum aceto aut omphacio  
 decoctis utendum. Lactuca denique, portulaca, et si-  
 milibus herbis, pomis, et piris acidis. Bibenda aqua

Frigida in  
temperiei

frigida, aut uinum aquosum. Frigida intemperie la-  
 borantes, contrariis medicari oportet, anisi, rutæ, pe-  
 troselinii decocto. Cibi odorientis cinnamomo,  
 calamo odorato, pipere, et similib. condiantur. Dan-  
 da etiam confectio diatriæ trion pipereon nominata, et

Humida.

theriaca. Vino utendum ueteri, et subadstringenti. Hu-  
 mide remedia sunt, cibi qui citra ualentes calefactio-  
 nem refrigerationem uel siccant. Preterea consue-  
 re potius parcitas. Siccam curabis instar hecticæ, de

Sicca.

qua suo loco dicemus. Copiosissime autem Gal. eius  
 cutionem, ut etiam reliquarum intemperantiarum uen-  
 triculi, prosequitur lib. 7. The. meth. ex quo ea quæ

Si ab hu-

more uen-

triculi im-

becillitas

accidat.

Bilioso.

hic desiderantur petenda erunt. Cæterum si humor  
 aliquis calefaciendi uel refrigerandi uim obtinens  
 uentriculi imbecillitatem effecerit, diligenter consi-  
 derandum erit an humor is in sinu seu amplitudine  
 uentris innatet, an eiusdem tunicis impactus sit. Si  
 in sinu continetur, et biliosus fuerit, per uomitum sta-  
 tim expurgandus erit. Facilem uero uomitum reddi-  
 t aqua calida, uel mulsa dilutissima bibita. Satius fue-  
 rit, si ante hæc humectantia exhibeas, ueluti ptisanæ  
 cremoræ, aut lutea ouorum. Sin in uentriculi tunicis est  
 receptus humor biliosus, hiera picra alius purganda  
 erit.



ua sanè Galeno ubi suprà teste, nullum aliud medi-  
 umentuz ad uitiosos humores qui in uentriculi ha-  
 entur tunicis præstantius inueniri potest. Humore  
 acuat, uictu utantur eodem quo qui calida intem-  
 erie affliguntur uti debent. Exhibendę etiam cõser-  
 g, & confectiões refrigerantes. Extrinsecus uentri-  
 ulo adhibeantur refrigeratiã, & mediocriter adstrin-  
 gentia, ut est oleum rosaceum, cotoneorum, adiectis  
 antalis, balauistiis, corallis & caphura. Infrigidantiũ  
 amen mediocris semper usus sit, iuxta præsentis in-  
 temperiei contrarietatem. Nam immoderatus horuz  
 usus, non modò non iuuat, sed etiam sepe insanabi-  
 lem morbu efficit. Si uero pituitosi, aut crassi & gluti-  
 nosi humores amplitudini uentris innatent, oxyme-  
 lite utendum est, in quo ex incidentibus & extenuan-  
 tibus quædam sint decocta: uerbi gratia hyssopus,  
 ris, origanum, satureia, & marrubium. Sin tunicis  
 uentriculi impacti fuerint, tum prius exhibenda que-  
 cunq; lentam hanc pituitã diffecent, post deinde pur-  
 gandum. Qualia uero hæc sint medicamenta, Capi-  
 te. 8. Libri primi diximus. Est autem & ad illoruz hu-  
 morum purgationem non inutilis hiera picra. Vi-  
 ctus ratione extenuante utendum. Confectionibus  
 item calidis dia trion pipereon, diagalanga, diacina  
 momi, diambra, zingibere condito, diacori, & simili-  
 bus. Extrinsecus adhibenda sunt olea calefacientia,  
 quale est nardinum, de menta, de absinthio, masti-  
 chinum, & alia eadem faculte prædita. In hunc sanè  
 usum commendantur cærata, quæ uulgus medico-  
 rum hodie scuta stomachalia nominat. Hæc in eum  
 componantur modum. R. Cinamomi selecti, garyo-  
 phyllorum, piperis longi. añ. 3. i. galliæ moschatę, ma-  
 ceris. añ. 3. s. calami aromatici, thuris. añ. 3. i. s. ligni  
 aloës. 3. i. mentę. 3. ii. mastichis, ladani. añ. 3. i. s. oleo-  
 rum mastichini, nardini. añ. 3. s. Cum cera & refina  
 quod satis est, fiat scutum stomachale. Aut. R. Masti-

H chis

Pituitoso  
 Scutuz sto-  
 machi.



Corrobo  
rantia uē-  
triciū.

chis in puluerem redactę. ꝛ. i. s. spargatur per corium  
scuti formam habens, ꝛ affundatur oleum nardinib.  
Dein admoueantur igni quoad liquecant singulę  
ꝛ inspergatur cinamomi lelecti, nucis moschatę,  
garyophyllorum in puluerem redactoruz. añ. 3. i. ꝛ  
macho admoneantur. Quid multa ē medicus ha-  
ꝛ alia uentriculuz roborantia adhibeat, qualia sunt  
menta, absinthium, thus, mastichę, cinamomum, ac-  
rus (galangam hodie uocant) zingiber, garyophyl-  
li, macer, lignum aloës, calamus odoratus, ꝛ simi-  
lia, ex quibus uarię medicamentorum formę cono-  
poni possunt.

### De inflammatione uentriculi.

Cap. II.

Causa.

Signa.

Vitius.

Curatio

Adstrin-  
gentia.

Pris.

**V**entriculi inflammatio haud secus quàm ali-  
rum corporis partium fit, à cōfluxu sanguinis  
copiosi ꝛ calidi. Hanc testantur dolor immen-  
sus, assiduus, ꝛ qui nullis medicamentis admotis ne-  
tigari potest, tumor, ęstus qui tactu diiudicari possi-  
febris, grauitas ꝛ nausea. Viētus ratio perinde atque  
in aliis inflammationibus sit tenuis. Vitendum pti-  
ne cremore, abstinentum à carnibus, uino, ꝛ aliis  
bis calidis. Bibat decoctum cinamomi, aut succū m-  
lorum granatorum acidorum, aut aliorum fructu-  
frigidorum. Parum loquatur, ꝛ dormiat. Fugiat tri-  
stitiam, ꝛ uertetur in aëre mediocriter frigido. Cu-  
randi ratio à sanguinis missione auspicanda, mod-  
plenitudo corporis, ꝛ uirium robur adsint. Incide-  
da autem uena cubiti interna, ꝛ pro uirium robore  
sanguis detrahendus. Posthęc ea quę adstringunt a-  
reprimunt, foris ubi dolor ꝛ tumor maxime appa-  
rent, sunt imponenda. Conuenit in hunc usum ole-  
um, in quo malum cotoneum decoctum sit, admix-  
ta simul mastiche apponere. Item succum cotoneo-  
aut pirorum, adiecta farina hordei, rosas rubeis, san-  
talis, bolo armenia, ꝛ similibus, in hunc modū. ꝛ. F.

rini



ia hordei. 3. i. s. santalorum alborum & rubeorum,  
 farum rub. añ. 3. ii. boli armenie. 3. i. s. cuz succis la  
 ice, portulace, & rosaruz, redigantur in formā pul  
 veris, aut emplastri. Quod si maiori adstrictione opus  
 erit, addendum aliquid erit de succo omphacii (a  
 estam uocant) aut hipocisthidis, aut rhois (sumach  
 appellant.) Hec omnia si uehemens sit inflammatio  
 tu f. i. gida sunt admouenda. Quod si alius nihil  
 iiciat, clysterib. leuibus irritanda erit. Neq; temere  
 ciet, qui estus uehementia paululum remissa casia  
 stularis. 3. s. intybi domestici succo dissoluta exhi  
 beb. Hoc etiam tempore cum adstringentibus medi  
 camentis, que extrinsecus adhibentur, aliqua qbus  
 discutiendi inest facultas pmiscenda erunt: ut est fa  
 ina fœnogreci, flores chamemeli, semen althæe, lini,  
 eiusmodi. Imò cum etia; nihil amplius affluit, nec  
 epe lli quod in laborante particula continetur po  
 est, solis discutientibus medicamentis utendum, sed  
 emper adstringentia, que robur illius seruant, admi  
 cenda, id quod Gale. lib. 13. Cap. 10. Ther. meth. co  
 niosissime docet. In hunc sanè usum hoc conueniet  
 emplastrum, quod. R. Farine seminis lini, fœnigreci  
 añ. 3. s. seminis anethi. 3. ii. florum chamemeli, melilo  
 ti. añ. 3. iii. absinthii, balauftiarum, rosaruz rub. añ. 3.  
 i. hypocisthidis. 3. ii. oleorum chamemelini, liliorū  
 alborum, rosacei, mastichini. añ. 3. s. axungie galline  
 anseris. añ. 3. ii. melle, fiat emplastrum. Ante illius ap  
 positionem, uentriculi regio hoc unguento inunga  
 tur, qd. R. Oleoruz chamemelini, anethini, cotoneo  
 rum. añ. 3. iii. pulueris radicis althæe, absinthii, se. lini  
 añ. 3. i. cere quod satis est, fiat unguentum.

## De appetitu canino.

## Cap. III.

**C** Aninus appetitus contraria est ammissioni ap  
 petitus passio. plures enī cibos appetunt sic af  
 fecti; atq; quuz appetitū cohibere nequeant, in

H ii inge

Empla  
strum.Vnguen  
tum.Caninus  
appetitus



**Causa.****Signa.****Curatio  
Acidorum  
humorum****Vitius.**

ingerendis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorum grauati, et assumptos cibos citra necessarium mentem ferre non potentes, ad uomitus diuertunt. Postea rursus cibo se explentes, rursus ad uomitus reuertuntur, quemadmodum canes: unde etiam pellationem malum hoc accipit. Fit propter frigidiores uentriculi temperaturam, uel ab acidosis moribus os uentris mordentes et irritantes. Quippe frigidi humores uitiati, rosioneque suctioni proportionem respondeat inducunt, ciborumque appetentiam excitant: uel propter totius corporis quod equius et calidius est immodicam dissipationem, Galienus lib. 1. Cap. 7. de Symptomatum causis teste. Frigidi uentriculi intemperies ex deprauata concoctione inflatione, fluctuatione, murmure, ac egestionibus multis deprehenditur. Acidi humores ex ructu acido multaque egestionem et liquida admodum cognoscuntur. Immodica dissipatio ubi causa fuerit, tum uentris egestionem longe pauciores procedunt, quam eorum que ingeruntur modo ac proportionem. Egeruntur, sicciora existunt. Frigida intemperies ratur ad eum quem supra diximus modum. Quod si uero ab humoribus acidis ori uentris impactis leuiter fit passio, hiera picra Galeni exhibenda erit, quam ut supra Cap. 1. eiusdem Libri commemoratum est ad uitiosos humores uentriculo impactos educendos prestantissima sit. Aut si amaritudinem eius horruerit, eger in catapotia digesta exhibe. Et si pingues fuerint humores, prius quæ dissecant calefaciuntque deuoranda dabis. Neque etiam temere tuzilia, porrum, satureiam, origanum, pulegium, et quæ his similia existunt, cibis permiscebis. Vacuatis uitis humoribus, ea tandem uictus ratione utantur. Panis non sit recens, neque bene fermentatus. Cibi sit pingues, et oleosi. Sorbitiones itaque conueniunt, quibus mel et oleum plurimum, gallinaceus adeps adhibetur.



tyrum adiectum est. Ex olerib. malua. Cerebella  
 m, & pinguiore uolucrum partes, pisciumq; eo-  
 m modo, & omnino quę appetitum auertunt, ac sa-  
 eratez inducunt, & quę magno cumulo accepta mo-  
 ce alunt. Vinum bibant colore fuluum, substantia  
 nue, odorumq; & nulla adstringente sapore prædi-  
 m. Hoc etenim uenterculum excalfacit, & humoruz  
 estruit acorem, ut sepe solum suffecerit cum pingui-  
 us & oleosis cibis ad perfectam curationem. Exhi-  
 endum autem tam ieiunis quàm cibo sumpto, etiā  
 nondum sitierint. Ieiunis autem calidum sanē, aut  
 tepidius. Abstineri autem oportet ab omnibus  
 cidis ac adstringentibus cibis ac potibus, maxime  
 uero à fructibus. Bellaria tamen eorum sint, pistacia  
 mygdalę, nucesq; pineę. Lac etiam ipsis exhibendū,  
 tum per se, tum cum melle: ita tamen ut uitemus in  
 eis, quib. in stomacho acescere consueuit. in his eniz  
 maius nocumentum, quàm utilitas consequetur.  
 Probè uero concoctum, non solum appetitum ob-  
 tundit, sed & aluum obturatam emollit, fluxionesq;  
 eius sistit. Apparandę etiam ex ipso lacte potiones &  
 placentę, ut sunt dulciaria, & oryza cum lacte deco-  
 cta exhibenda. Lauare quoq; per interualla opz, cu-  
 ticularq; ipsorum large cum oleo pinguefacere. Ac  
 isto curationis modo, tantisper dum à morbo libere  
 tur eger, utendum. Si uero ex immodica dissipatio-  
 ne caninus appetitus oritur, tunc eoruz qui hoc mo-  
 do patiuntur cutem densare, & spissiore reddere cō-  
 uenit, cum oleo ex immaturis oliuis expresso, aut ro-  
 saceo, aut myrthino, aut alio in quo quippiam ad-  
 stringens ad lentum ignem decoctum sit. Quinetiaz  
 optima ratione eger in aëre frigido ac perspirabili  
 uersabitur. Abstineat autem ab aëre calido, consimi-  
 libusq; balneis, ac uini potu, & ab omnibus quę  
 tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt.  
 Potui autem detur aqua frigida, aut cinnamomi de-  
 H iiii coctum.

*Si ex im-  
 modica  
 dissolutio-  
 ne.*



coctum. Ducatur eger ad lauacrum frigidum, si quidem nihil id fieri prohibeat: utpote corporis grauitas, aut pars aliqua corporis refrigerata, thorax mirum, aut alia quedam. Cibi ei exhibendi stabili et egre corruptibiles, ut sunt carnes suille in uigiliis existentes, maxime uero uentres. Bubule quoque pinguiore, et omnia simpliciter pingua, et que uentri natant, tardeque concoquuntur ac distribuuntur. enim hi, quandoquidem ipsis natura inest acris mordax, et ut quispiam dixerit febriculosus calor eorum numero qui minori negotio bubulas carnes ac alia concoctu difficilia, quam saxatiles pisces finitimaque concoctu facilia conficiunt, et fusius in prefatis Lib. i. de Alimentis Galenus docet. Ex ouis, ea que coquendo sunt indurata, aut sartagine frixa conueniunt. Panis sit non fermentatus, iusculaque pingua. Oryza cum butyro decocta danda. Iuxta proportionem autem quantum malum imminuitur, tantum crassi humoris cibus est detrahendum, et ex adstringentibus forinsecus admotis imminuendum. Aliquando enim sedata uehementis appetitus accessione, quum corpus ex crudis et crassis humoribus repletum alius grauius malum transitio contingit. Inter adstringentia uero, preter ea que antea dicta sunt, et huic unguento locus sit, quod. R. Olei rosacei. 3. i. oleorum myrthini, cotoneorum. an. 3. s. succi plantaginis. 3. i. santalo. 2. rub. mastiches, bistorte, rosarum rub. an. 3. boli armenie. 3. ii. hypocisthidis, acatie, sanguinis draconis. an. 3. i. cere quod satis est, fiat unguentum.

## De Bulimo.

## Cap. III.

Bulimos.

Causa.

**B**ουλιμος ingens Græcis uehemensque fames dicitur. Eo enim particula aliis uocibus adiecta, significacionem earum auget. Fit ex uentriculi frigidityte, indigentiaque, ac uirum imbecillitate, et ferè in totum ab externo frigore initium capit. Peregrina

natio



ationes enim & itinera longa, maxime per niuem fa-  
la, affectum hunc inducunt. Deprehenditur facile.  
principio siquidem fames multa adest, quæ tamen  
non usquequaq; perdurat. Nam postea repente ani-  
mo languuntur, cum externarum partium refrigera-  
tione, & spiritus defectione. Curatio huic malo sta-  
m adhibenda, quod sint qui in locis desertis, aut in  
silneo, hoc ipso correpti ex instanti, auxilii faculta-  
destituti perierint. Hi itaq; qui in itinere, aut alias  
time magna citra febrem infestantur, aceto, aut pule-  
gio ad odorandum exhibito, aut terra quæcunq; tã-  
tem obtigerit aceto cõspersa, aut malis, aut piris, aut  
liis similibus fructibus qui ad manum fuerint refo-  
endi sunt. Auxiliatur & panis recens narib. admotus  
seus bono odoris, caro suilla assata aut cocta & in  
niuersum omne quod multum alit, maxime uero  
quod nidorosum ac probè conditum, sufficienteq;  
odorem habet. Per huiusmodi enim odores tales ut  
lurimum refocillantur: quãdo nihil sit, ut diximus  
Cap. 11. Libri secundi, quod odore citius uires refi-  
cere possit. Extremitates etiam eorum partes fasciis pstrin-  
gende sunt, manuumq; ac pedum summitates calide  
aque feruentiori imponende, ipsiq; tum maxillarum  
punctura, tum capillorum ac aurium uellicatione ex-  
citandi. Reuocatis uero iam ab exolutione, panem  
ex uino diluto, aut aliud quippiam eorum quæ acer-  
uatim uires reparare possunt, offeres: uelut sunt oua  
sorbilia, halica cum uino. Compendiosissimuz eniz  
auxilium ex cibo sperare possunt: quem etiam si ob-  
latum acceptare non queant, ori indere oportet ui-  
olenter, cogereq; ut ipsum transglutiant. Euestigio  
enim à fame, & ab animi deliquio liberantur, & cele-  
riter excitantur. In hunc etiam usum conueniunt cõ-  
fectiones ex odoramentis uariis compositæ, ut est aro-  
maticum rosaceum, diambrae, dianthos, diamo-  
schi, alipta moschata, & similes pastilli. Quod si in

H iiii febris

Signa

Curatio



febris (quod tamen raro accidit) bulimos intul-  
rit, atq; circa exacerbationum declinationez eius  
cessio irruerit, intrepidè cibi sunt offerendi. Si uero  
in principio accessionis, aut in uigore apparuerit  
per odora menta ab initio dicta reuocandi sunt et  
maxime per ea quæ sunt frumentacei generis, ut  
est panis calidus nidorem adhuc emittens, et fimi-  
Fricatio etiam partium extremarum adhibeatur  
cataplasmata ex palmulis (daetylos nominant)  
malis cotoneis, in uino decoctis. Atq; hæc usq;  
remissionem facere oportet, ut opportune cibuz  
fere liceat. Quod si ex his nihilo melius habeat  
audendum est per ciborum ingestionem auxiliu  
ferre. Cremo rem itaq; ptisanæ, aut buccellas un-  
atq; alteram uino albo et tenui madefactas exhibe-  
bis. His eniz refocillati ac respicientes ex impro-  
deinceps usq; ad remissionis tempus perueniunt.  
Quod autem liceat in accessione ipsa egrotantes  
trire, pereleganti historia ostendit Gal. lib. 10. Th-  
methodi Capite. 3. ubi multa ad institutum nostru  
facientia offendes.

## De inflatione uentriculi.

## Cap. V.

Causæ.

**I**Nflatur uenter ex flatibus in eo generatis.  
Generantur autem ex humoribus in ipso pitui-  
fis, aut ex cibis in uapores per mediocrem calidi-  
tem resolutis. Perfecta enim frigiditas hoc nomi-  
quod extenuare ac dissoluere non fit idonea, nullu  
flatus procreat. Vehemens caliditas cum non tantu  
extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem  
pedit. Mediocris uero caliditas dissoluit quidem  
transmutat cibos, non tamen perfecte conficit: unde  
sanè flatuum generatio contingit, ut. fusius Gale.  
3. de Sympt. causis Cap. 7. docet. Accedit sic patien-  
tibus uentriculi grauitas, et distentio: aliquando at-  
et tumor, ac eminentia quædam circa os uentriculi  
ipsu

Signa.



posum adeo uentrem efficitur, ructusq; inanes sunt  
 modice alletantes, inhibitiōq; flatuum, qui per aliu  
 xcerni consueuerunt. Vltra hęc uehemens difficul-  
 as spiritus ob septi transuersi compressionem adest  
 ut aliqui non dissimile quiddam suffocationi se p-  
 etati estimant. Leuantur autem cibo infernè subeun-  
 e, & flatib. siue per ructus siue per intestina exclusis.  
 Murmura deniq; intus audiuntur. Si itaq; ex cibis pi-  
 uito sis generatur uentriculi inflatio, uictus ratione  
 extenuante utendum erit, & medicamentis iis, quę in  
 Cap. I. huius Libri dicta sunt. Sin ex mediocri cali-  
 ditate orta inflatio fuerit, cibus utendum erit conco-  
 ctu facilibus, & boni succi. Parum etiam comedend-  
 um: inedia si quidem huic affectioni summè pfert.  
 Post omnem cibum uinum meracius exhibendum.  
 Vbi somnus etiam accesserit, non parum leuat egro-  
 tantes. Multum autem potum tanquam infestissimū  
 hostem deuitent. Fructuum quoq; atq; olerum hu-  
 midorum esum semper habent suspectum. Soliis etiā  
 calidiorib. utantur. hęc enim, Paulo lib. I. Cap. I. te-  
 ste, mitigant, emolliunt, flatuq; ubicunq; fuerint dis-  
 cutiunt. Quod ad medicamenta ipsa attinet, bibant  
 hoc decoctum, quod. ℞. Calaminthę, mentastri, cha-  
 memeli, origani, mentę, pulegii. añ. M. i. absinthii.  
 M. s. seminū anisi, apii, cumini, dauci, oreo selini, fœ-  
 niculi. añ. 3. iiii. seminū urtite, carei. añ. 3. ii. radicis, inu-  
 le campanę. 3. ii. Decoquantur in aqua quātītatis iu-  
 ste, quo ad tertia pars absumatur. Dein coletur, & sac-  
 charo sufficienti dulcescat, adicianturq; syrupi de  
 calamintha. 3. iiii. & fiat potio, de q̄ (ut moris est) una  
 uice dentur. 3. iiii. Vel utendū ista (ut uocant) tragea  
 quę. ℞. Specierum dianisi, diacumini, diacalamenti.  
 añ. 3. ii. seminū anisi, carui, dauci, fœniculi. añ. 3. i. cu-  
 bebarum, gariophyllorū. añ. 3. ii. zingiberis. 3. i. pipe-  
 ris. 3. i. sacchari lib. s. misce, fiat tragea. Glādes quoq;  
 pfidenter & citra dilationē supponendę sunt, ex reb<sup>9</sup>

flatu

Curatio

Decoctum

Tragea.

Glādes.



flatus prolestantibus, in hunc modum formatæ. ℞.  
Mellis cocti. ʒ. ii. seminum rute, cumini, foeniculi. añ.  
ʒ. i. seminis carei, anisi. añ. ʒ. s. salis. ʒ. ii. misce, fiat glās.

**Clyster.** Aluo autem adstricta, clyster infundendus, qui. ℞.  
Decocti superioris lib. i. bñdictę laxatiue. ʒ. vii. oleo  
rum absinthii, rute, anethini, añ. ʒ. i. pinguedinis an  
seris ⁊ gallinę, salis expertium. añ. ʒ. ii. s. salis. ʒ. i. mi  
sce, fiat clyster. Extrinsecus etiam uentriculus in hoc  
affecto cum oleis iam dictis inungendus. Aut lana  
in fasciculum conuoluta, ⁊ iis oleis leuiter calidis  
madefacta imponenda: lanę quoq; sic conuolutę  
cuminum tritum, aut apii semen, aut anethi insperga  
tur. Aut imponatur uentriculo hoc ceratum, quod

**Ceratum.** ℞. Oleorum rutacei, anethini, nardini, laurini. añ. ʒ.  
i. farine seminis lini, foenigreci. añ. ʒ. i. s. seminis apii,  
carei. añ. ʒ. i. baccarum lauri, centaurii minoris. añ. ʒ.  
i. s. gummi ammoniaci, opopanacis. añ. ʒ. ii. cere ⁊ resi  
nę quod satis est, fiat ceratum. Ceterum cucurbita  
bonę magnitudinis umbilicum undiq; cōprehendēs  
cum flamma copiosa sæpius admota, præsidium in  
hac passione est, quod incantamenti cuiusquaz simi  
le efficit, Galeno etiam lib. 12. Ther. meth. autore. Ca  
storeum etiam ex posca potum, tum extrinsecus cu  
z oleo anethino appositum prodest.

**De singultu.** **Cap. VI.**

**Singultus** **Λ**ΥΠΟΣ gręcę, latinę singultus, est motus uētri  
culi, qui ueluti eius conuulsio est, ab expultri  
ce facultate noxia uolentis extrudere factus.

**Cause.** Accidit uel ex plenitudine, uel euacuatione, aut ob  
humores acres ⁊ medicata qualitate præditos, aut ci  
bos acres ⁊ mordaces. Item propter frigiditatē, ⁊ ali  
menti corruptionē, quo sanē nomine maxime oīuz

**Signa.** pueris frequentes singultus eueniunt. Fit et in febrī  
bus singultus, stomacho præsertim, aut aliquo alio  
uiscere inflāmato. Cause extrinsecę facile ex egri aut  
assiden



fidentium sermonibus dignoscuntur. Plenitudo  
 ex grauitate, euacuatio autem ex iis quæ præcesse-  
 rint. cibus corruptus ex illius nidore. acrimia, ex mor-  
 bicatione. Singultu itaq; à frigiditate oborto, oleum  
 quo ruta, cuminum, & absinthium sint decocta,  
 una exceptum stomacho imponendum. Oleum etiã  
 mastichinum, & de castoreo inunctum prodest. Pue-  
 ros calidorum lintheorum admotio interdum iuuat  
 is qui ætatis integræ sunt, in potu uinum, aut apium  
 aqua mulla decoctum, aut cuminum tritum, aut  
 sarum, aut pulegium, quodlibet eorum per se, aut si  
 uel mixta exhibenda. Vtile est & acetum scylliticum  
 orbendo acceptum. Deniq; spiritus retentio, quæ ca-  
 lorem auget, Galen. lib. 2. de Sympt. caus. Cap. 6. te-  
 ste, præsens est remedium. Quando uero ex pleni-  
 tudine singultus oboritur, uomitus optimum reme-  
 dium fuerit. Crassis autem existentibus humoribus,  
 cum oxymelite scyllitico, calaminthæ, prasii, & simi-  
 lium iam sepius commemoratorum decocto exte-  
 nuandi & incidendi sunt. Deinceps ea quæ in diuer-  
 sum humorum copiam trahunt, sunt adhibenda. In-  
 quem usum conueniunt ea quæ per inferna purgât,  
 notissimũ uero clysteres, extremarum partium frictio  
 & constrictio, cucurbitule, cum plurima flamma tho-  
 raci, stomacho, & dorso affixæ. Sternutatio etiam cõ-  
 uenienter eis prouocatur. nam Hippocrate teste, à sin-  
 gultu habitum sternutatio superueniens liberat. Sic  
 etiam uociferatio concinna cum plurimo clamore  
 deambulatio longa & concitata, equitatio, & compul-  
 sio spiritus conferunt. Venter etiam roboran-  
 dus erit per ea quæ intro sumuntur, ut sunt confectio-  
 nes in hoc in officinis paratæ. Extrinsecus oleis, un-  
 guentis & emplastris in præcedentibus Capitib. pro-  
 ductis. Singultus autem ex euacuatione sanatur  
 per alimenti conuenientis assumptionem, & per ea  
 quæ defectum expleant, quæ partim supra sunt dicta, &  
 copio-

Curatio  
 Singultus  
 ex frigi-  
 ditate.

Singultus  
 ex pleni-  
 tudine.

Auersio.

6. aph. 13

Singultus  
 ex euacua-  
 tione.



copiosè in curatione heclicæ febris dicentur. Non  
mediocriter autem & hic conducit, uertebras ceruicis  
& dorsi oleo humectante, uiolaceo & amygdalarum  
*Singultus* dulcium nimirum, perungere. Porro mordacib. reb.  
*ex morda* singultum excitantibus, primum sufficiens remediū  
*citate.* uomitum ipsum reperiemus: deinde sensus etiam stu-  
pefactionem & morsum inferentium alterationē ac  
discussionem. Stupefiunt itaq; sensus per refrigeran-  
tia. in quem sanè usum philonium exhiberi potest  
*Pilula de* aut pilulæ de cinoglossa, quæ in hoc casu mirificè  
*cynogios* conferre solent. Debent ex una drachma confici se-  
*sa.* pilulæ, de quibus unam antequam cubitum eat egge-  
sumat. Alteratur autem mordacitas per attenuanti-  
& exiccātia. Eiusmodi mixtæ facultatis est subiectu  
*Pastillus.* pastillus, qui. R. Costi, croci, spicæ nardi, rosarū ui-  
ridium, mastiches. añ. ʒ. s. asari, aloës. añ. ʒ. ii. opii. ʒ.  
cum succo psilii fiant pastilli, de quibus detur. ʒ. s. ue-  
3. i. Commendatur hoc pharmacum à Galeno lib.  
8. de Compo. medica. secundum locos, Cap. 3. plur-  
bus uerbis. Obtundit etiam mordacitatem, & ex e-  
o ortum singultum sedat, intybi succus potatus, co-  
cumeris semen decorticatum tritumq; bibituz. lact-  
cæ semen eodem modo: item portulacæ succus po-  
tatus, ipsaq; portulaca in cibo sumpta. Myxarū qu-  
que decoctum (sebesten hodie uocant) in potu acco-  
ptum. Maximè tamen omnium præstat lac asininu  
aut si hoc non adsit, bubulum recens mulctum bil-  
tum. In eum usum exhiberi potest saccharum rosarū  
aut uiolarum, diarhodon abbatis, diatriasandali, i-  
leb uiolarum, & eiusmodi.

## De cholera.

## Cap. VII.

*Cholera.*

**X**OXE & Græcis, & cholera Latinis, est uomitus  
liofus, nidorosus & acidus, ad plures horas per-  
seuerans, & uenter infernè eadez simul excernit  
Barbari cholericam & choliricaz passionem noian

QO



Qui hoc malo afficiuntur, Græcis γολερίαντες, & Latinis cholericici appellantur. Est ob multam cruditatem, quæ nonnunquam ex magna alimentorum praetritate, interim ex uitiosorum humorum copia originem ducit. Signa quibus deprehenditur malum hoc, manifesta sunt: nam supra infraque excernunt. Sitis etiam sequitur, impeditus pulsus, musculorumque manuum et pedum, maxime uero surarum contractio et tensio. Quum itaque malum hoc acutissimum sit, et grauissimam syncopam, si paulo diutius duret, inducat, accurata opera danda erit, quo confestim et sine mora huic succurratur. Nemo igitur ubi copia uitiosorum humorum malum hoc conciliauerit, mox in principio, aut confestim ea quæ efferuntur cohibere aggrediatur. inutilia enim cum sint, euacuatione indigent. quare si nauseabundus eger est, et turbatur, cibis etiamnum crudis in uentriculo manentibus, aqua tepida propinari debet: deinde uomere oportet, digito uel pinna ori indita. Neque tamen cum aqua mulsa, neque aqua cum oleo mixta uomitus citandus quod hæc fluxiones augeat, illa uero mordacitatem operetur, et torsiones augeat. Adiuuare etiam oportet per sedem excretionem. alienum enim uelut uenum insidens, et uentrem ac intestina rodit, et humores ex uniuerso corpore attrahit. Propinanda autem leuissima purgantia medicamenta, ut est aloë, casia fistularis, myrobalanorum decoctum, et similia. Postquam aluus exinanita est, conquiescere oportet, et uentriculum ac hypochondria oleo mastichino, uel nardino, uel de absinthio fouere conueniet, somnuzque accersire. Prædictis oleis admiscenda interdum alia quæ uentrem roborare possunt, de quibus supra dictum est, et unguenta conficienda. Vbi iam exacta apparuerit concoctio, balneo aque dulcis, et cibis boni succi utendum est. In quorum numero est iusculum pulli gallinacei cum omphacio. Carnes item

Cause.

Signa.

Curatio.

auicu.



Scutum  
stomachi.

auicularum montanarum, perdicum, oua sorbilia, et  
eiusmodi. In potu utendum uino tenui, odorato, et  
adstringente, aut succo malorum granatorum, aut sy-  
rupo rosaceo, aut aqua in qua chalybs ignitus sit ter-  
aut quater extinctus. Quum uero perseverauerit ma-  
lum, et gracilitas per ambitum corporis fiat, et maxi-  
me si uenter confidat, pulsus minor densusque euadat  
tunc sanè extremas corporis partes uinculis adstrin-  
gere, ac oleo multo calido impinguare oportet. Ca-  
taplasmata etiam et emplastra ex adstringentibus et ro-  
borantibus composita, uentriculo imponenda. Sunt  
autem eiusmodi, quæ ex palmulis, hypocistide, acatia  
rhu obsoniorum, bolo armenia, thure, balauistiis, ro-  
sis, ac myrti fructibus componuntur. Efficax quoque  
remedium est, si linteam in succo malorum syluestrium  
madefactum uentriculo imponatur, aut hoc ceratum,  
quod. R. Oleorum rosacei, myrthini, cotoneorum.  
an. 3. i. mastiches, thuris, acatie. an. 3. ii. hypocistidis.  
3. i. santalorum alborum et rub. an. 3. i. balaustiorum,  
sanguinis draconis. 3. s. boli armenie. 3. i. ceræ et resi-  
næ quod satis est, fiat scutum stomachale. In potu ue-  
ro frigida aqua cyathi mensura, hoc est. 3. i. s. absor-  
benda præbeatur. Cauendum tamen ne nimium fri-  
gida existat. hæc enim aliquando innatum calorem  
stupore suo extremè offendit, aut inflammationem  
stomachi aut uisceris alicuius efficit. Instilletur autem  
huic interdum mali punici acidi succus modicus, aut  
rosarum, uel pampini uitis decoctum. Quod si acriora  
sint ea quæ excernuntur, uexetque ardor et sitis, cu-  
cumeris semen cum aquæ cyathis tribus præbeatur.  
Datur etiam utiliter cum amylo. Tum etiam intybi  
et lactuce in posca coctæ exhibeantur. Post uero son-  
nus procurandus, et quies omni modo. Verum si flu-  
xio sisti nequeat, uinum quoddam mediocriter ad-  
stringens, neque uiribus ualidum, et quod dulce qui-  
dem sit, non autem odorum, potui dandum est. In-  
teran



ant uero in ipsum micas panis, atq; ita paulatim  
 per interualla absorbeant. Vini tamen multitudo  
 tanta est, ac omni arte conandum ut ipsos sopia-  
 ris, ex rosis, pampinis, rubo, et similibus pauimen-  
 constrato. Odoramenta quoq; naribus admouea-  
 r, rose, mala cotonea, et eiusmodi. Illitiones etiam  
 porifere circa frontem adhibeantur. Aluo autem  
 huc egerente, amyllum cum decoctione capitulorum pa-  
 ueris per clysterem infundatur. simul enim cohi-  
 ret, refrigerat, et somnum inducit. Ad uomitiones  
 vero coercendas, succum malorum cotoneorum, pi-  
 norum puniceorum, et mespilorum deuorare conue-  
 nit. Si ne his quidem auxiliis cibum retinent, extrin-  
 secus contra uentriculum ipsum cucurbita leuis quas  
 maxima admouenda est. Ad contractiones autem  
 musculi factas, linimenta oleo calido imbuta mu-  
 culis circumponere oportet, et cerata humida seu  
 unguenta, quibus adiectum sit aliquid castorei, et olei  
 lini, quorum copiam in Cap. de Resolutione et co-  
 nstrictione offendes. Vbi morbus inclinauerit, ad bal-  
 neum deducendi sunt egri, cibisq; reficiendi erunt,  
 uillis gallinaceis, columbis, gallinis, perdicibus, pa-  
 umbis, turdis, et consimilibus.

## De diarrhoea.

## Cap. VIII.

**Δ**ιάρροια Græcis est, copiosum sine exulceratione  
 et inflammatione alui profluuium. Fit propter  
 imbecillitates instrumentorum uentris, alimen-  
 ta copiosa humidiora et uiscosiora, eorundemq; cor-  
 ruptelam, mordicationem item in uentre contentorum,  
 refluxum quorundam ex supernis ad uentris spacia, im-  
 becillitateq; retentricis facultatis. Note quibus cause  
 discernuntur, manifeste admodum sunt. Si enim ob  
 imbecillitate fit instrumentorum concoctioni serui-  
 tium, uentriculi nimirum, intestinorum, iocinoris et  
 ienis, ex propriis Capi. petenda signa erunt. Sin ob alimen-  
 torum

Somnus  
 ut concu-  
 liandus.

diarrhoea  
 causa.

signa



Curatio

Alui pro-  
fluuium  
non teme-  
re sisten-  
dum.

Bilioſæ  
diarrhoeæ  
Curatio.

torum, prauorum ingestionez accadat diarrhoea, par-  
tim de egri sermonibus, partim ex iis quæ excernun-  
tur disci potest. Si enim biliosa fuerint, flauo colore  
excrementa infecta erunt, neq; citra mordicationez  
& caloris sensum eiicientur. Aderit etiam oris amari-  
tudo, sitis, tenuis habitudo corporis, & alia quæ ha-  
bitum biliosum ostendunt. Sin pituitosa fuerint, co-  
traria prorsus quæ per aluum excernuntur erunt. Si  
à capite in uentrem confluunt humores, egestionez  
spumose erunt, cerebriq; temperies humida. Si à ple-  
nitudine totius corporis oriatur, aut iudicatorius  
sit alui fluor, signis quæ in Commentario de Pleni-  
tudine, & in libris de Crisib. à Galeno dicta sunt, de-  
prehendetur. Cæteruz si ab imbecillitate instrumē-  
torum alui profluuium excitabitur, intemperies quæ  
imbecillitatem parit, suo contrario, quemadmodum  
Cap. i. huius Libri diximus, corrigenda erit. Si autē  
propter alias causas fluore aluus laborauerit, & na-  
tura per hunc quæ noxia sunt & superuacua expelle-  
re tentauerit, quiq; eo correpti sunt facile tulerint,  
tuz usquequo natura omnē suam curam impenderit  
expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare conue-  
nit. Etenim obluetari & excretionis cohibitionem  
moliri, maiorem morbum facit. Si quidem quæ co-  
hibentur, sursum perlata dolores capitis, aut phreni-  
tidias, aut lethargos, aut parotidas inferunt, planē pe-  
riculosos. Quare in principio ea quæ in corporis  
commoditatem utiliter excernuntur, minime inhibe-  
re oportet. Postquam uero iam diutius perseueraue-  
rit fluor, non solum superuacua euacuans, ueruz ha-  
bitum corporis ueluti colliquans, uiresq; consumē-  
tunc sanē resistere eis oportet, tum per ea quæ per o-  
sumuntur, tum quæ per anum infunduntur, atq; e-  
quæ extrinsecus imponuntur. Si itaq; biliosa pura r-  
crementa prodierint, in magis salubria permutar-  
ipsa oportet, non tamen per cohibitionem statim eo  
curare



are. Biliosum enim tum in uentre, tum in ieiuno  
 stimo aggregatum, atq; post coaceruationem re-  
 tum, maximopere ledet. Nam & stomachum sub-  
 tit, & uiscerib. inflammationes infert, & sitim accē-  
 & febres instaurat, omnesq; prædictas in capite  
 siones efficit, atq; in totum grauius malum red-  
 . Quod si igitur humores biliosi in corpore copio-  
 uerint, natura per medicamenta leuia, ut est dilu-  
 es, rhabarbari, casia fistularis, cortices myrobalano  
 m luteorum, aut mel aërium (mannam Arabes uo-  
 nt) iuuanda erit. Lac tandem bubulum aut capri-  
 um tepidum, recens mulctum ac potatum exhiben-  
 um, aut ad ignem decoctum, assidueq; agitarum do-  
 ad tertias sit reductum, quod ipsum & per fluuia  
 silices, ferriq; laminas igni cādefactas, ac in lacte  
 tinctas fieri potest. In decoquendo autē superstan-  
 m concretionem siue spumam auferre opz. Hoc sa-  
 e nullum compendiosius remedium ad fluxiones  
 liofas reperire poteris. Quandoquidem autem fe-  
 icitantibus lac ipsum in nidorem aut etiā acorem  
 onuerti consuevit, maiusq; nocumentum quāz cō-  
 modum inferre, sanè in præsens ipsum exhibere uita-  
 imus. Aque uero quarta parte ad lac ipsum affusa,  
 decoctionem faciemus, donec dimidium eius consu-  
 natur, atq; hoc modo exhibebimus. Si autem in in-  
 estinis aggregata bilis fuerit, clysteres ex hordeo de-  
 octo, saccharo rubeo, oleo rosaceo, ouorum uitel-  
 is, & similibus confectos iniicere oportet. Biliosis  
 acuatis humoribus, intrinsecus ea quæ adstringūt  
 & roborare possunt exhibenda, ut sunt saccharuz ro-  
 laceum, diacitoniten sine speciebus, diatriasantalī,  
 pastilli de spodio, miua cotoneorum, & eiusmodi.  
 Extrinsecus etiam quæ idem possunt imponenda me-  
 dicamenta, de quibus paulo post dicemus. Porro in  
 diarrhoea ex humoribus crassis & uiscosis, ac eorum  
 dem corruptione facta, haud secus quā in prio-

Lac co-  
 ctum.

Diarrhoea  
 ex pituita  
 sis humo-  
 ribus cu-  
 ratio.

I reā



Diarrhoe  
ex imbecil  
itate retē  
trictis fa  
cilitatis et  
ratio.  
Simplicia  
adstringē  
tia aluum.

Ceratum.

re à purgatione auspicanda curatio erit. Exhibenda itaq; in hunc usum agarici dilutum cum myrobolanis empeliticis, aut aliud quod prædictos humores educere possit. Conueniunt etiam clysteres, potius si in intestinis viscosorum humorum copia quæ aceruata fuerit, ex centaurii minoris decocto, obrutaceo, et similibus. Intro corpus exhibenda dioscoridoniten cum speciebus, zingiber coctum, et alia quæ calefacere et exiccare possunt. Extrinsecus etiam quæ robur addunt admouenda. Si ob retentricis facul-  
tis imbecillitatem orta fuerit diarrhoea, ea sunt adhibenda medicamenta, quæ ad alias fluxiones alui multo modicas admouentur. Irrigationes itaq; ex oleo euphracino aut rosaceo, aut melino, cum uino aliquo austero. Efficacius autem his est myrthinum, si ueniam mentiori opus est adstrictione. Gallas etiam, maluarum, et balaustia in oleis prædictis incoquere licebit. Perseuerante autem adhuc fluxione, emplastra et rata ex adstringentibus et exiccantibus, apparatus, impo-  
da erunt, quorum aliqua in Cap. de Lienteria describemus. Est autem in primis hoc efficax et parabile, R. Mora præ immaturitate adhuc acerbiora et alba septem, quibus ubi probè contusa fuerint, additur olei rosacei. 3. ii. ceræ. 3. i. et fit ceratum. In potu quoque accepta, uentris fluxiones, post sufficientem intestinum euacuationem, sanant, cum inum, adianti decoctum, spinæ albæ radix, apii similiter semen drachmæ pondere datum. urinam enim irritat. Fluxiones ad intestina factas, eò diuertens. Mora etiam immatura adhuc acerba, ad solem pluribus diebus exiccata, inde reposita, usuq; expetente trita et bibita, miris aluum restringunt. Contunduntur quoq; et obsoniis admiscuntur, quemadmodum rhus (summa nominant) consuevit. Interdum enim eius. 3. i. cum pullo gallinaceo decoquitur. Magis tamen aluum cohibent rubi mora immatura, et acerba, eodem modo.



iccata, & in potu exhibita. Inter cōpositas medi  
 mirifice conferunt, pastilli de spodio, theriaca,  
 coniten, diatriasandali: & hæc, quæ. ℞. Specieruz  
 iasandali, specierum diarhodon abb. añ. 3. ii. co  
 rum rub. thuris electi, rosarum rub. añ. 3. s. spo  
 1. i. seminis acetosæ, rhois obsoniorum, id est su  
 1. añ. 3. i. balauft, acatię. añ. 3. s. mastiches. 3. s. bo  
 nenię. 3. i. sacchari candidissimi. 3. viii. dissoluti  
 qua plantaginis, fiat confectio in morsulis. Aut  
 ecligma, quod. ℞. Sacchari, osacei ueteris, diaci  
 ten sine speciebus, rob de ribes, rob de oxyacan  
 id est de berberis. añ. 3. s. miuę cotoneoruz simpli  
 1. iii. diamoron. 3. v. specierum diatriasandali. 3.  
 orallioz rub. 3. i. spodii. balauft. añ. 3. s. boli arme  
 3. i. cum syrupo myrthino, fiat ecligma. Ceteruz  
 in aquam nunquam non parataz habebis, quæ. ℞.  
 ois obsoniorum quartam unam, aque pluuialis  
 iii. in quibus die & nocte sumach maceretur, dein  
 iat, & rhu bene ac ualide exprimatur. In ea siquidē  
 ia oryza, milium, & alii cibi coquantur, aut saltem  
 qua illis portio affundatur. Si propter defluxum  
 aliis corporis partib. diarrhœa accidit, curatio ex  
 propriis capitibus petenda erit. uerbi gratia, si ex ca  
 de defluxio fit, ad ea quæ in Capite de Curatiõe de  
 lationis dicta sunt, recurrendum erit.

## De lienteria.

## Cap. IX.

**L**ienteria, quemadmodum ipsum nomen indi  
 cat, leuor quispian intestinorum est: passio ni  
 mirum, in qua intestina cibos non retinent, s;   
 antequam in uentriculo coquantur, celerrime ex  
 creta dilabuntur non cocta, sed qualia antè sumpta  
 erunt. Latinis itaq; leuitas, aut leuor intestinorū  
 dici potest. Oboritur autē frequēter, dysenteria ma  
 na precedente, & ex profunda ulceratione, cicatrice  
 enla & leui succedente, quæ deinde ob densitatem

I ii quidem

Composi  
 ta cobi  
 bentia al  
 uum.  
 Cōfectio  
 in morsu  
 lis.

Ecligma.

Aqua.

Diarrhoe  
 ex deflu  
 xu humo  
 rum e su  
 pernis o  
 ta curatio

Lienteria.

Causa.



quidem suam, ciborum per corpus digestionem  
 ri non permittit, quum sanè uenarum ora finit  
 ti obrurata: uenarum in quaz, quæ alimentuz  
 testinis ad se auellunt. Ob lenorem uero cibum  
 tim, et priusquàm permutationem et perfectam concoctionem  
 nem admittat, dilabi finit. Fit nonnunquàm ex imbecillitate  
 litate facultatis cibos in uentriculo concoquere  
 ac digerentis. Hac enim imbecilla, nec coquuntur  
 nec digeruntur alimèta: sed cruda, humentia, imperfecta,  
 nihilue immutata excernuntur, aluo coram  
 ter fluida. Interdum etiam post longum uentriculi  
 fluuium oboritur. Aliquando etiam aqua intesti  
 tem per uentrem euacuata, lienteria consequi solet.

**Signa.**

Ex quacunque igitur causa lienteria orta sit, egri  
 bum non sentiunt, et malum corporis habitum  
 runt. Succedit itaque egri assidua excretio cruda  
 lore subalbida, inequalis, et aquosissima, citra san  
 nis ac bilis complexum. Adest autem simul et  
 per tota hypochondria se dilatans, quem cibi ed  
 mitatur fastidium.

**Curatio**

Ceterum quum eiusmodi lienteria  
 fit, facile est intelligere quod facultatem retentivam  
 et concoctricem tum uentris tum intestinorum  
 ni modo refocillare oportet: id quod in primis  
 ciborum conuenientium exhibitionem fieri potest  
 uictus rationem restituendis ac refocillandis  
 aptam. Conueniunt itaque carnes auicularum  
 narum, pulli gallinacei assi, in quorum uentre  
 aut mastiche imponi etiam debet, et alia quæ in  
 sequenti de Dysenteria commemorabuntur. Vinum  
 bendum adstringens. Cibus autem qui exhibetur

**Curatio****lienteria****ex imbe-****cillitate fa-****cultatis cō-****coctricis.**

titate paucus sit, et concoctu facilis. Potus etiam  
 guus sit: multus enim, uentris fluxionibus omnino  
 infestissimus existit. Si itaque ex imbecillitate fac  
 tis concoctricis fit lienteria, eodem modo quo in  
 pite de Imbecillitate uentriculi dictum est curetur  
 tro enim et extra corpus adhibenda ea quæ ad



et tam uentriculum quam intestina roborare  
unt. Exhibendus itaq; syrupus de absinthio, aut  
ta, confectionesq; alię uentriculum corroborā  
extrinsecus uero admouenda sunt ea quę in Ca  
de Diarrhœa dicta sunt, et in sequenti de Dysen  
Cap. dicetur. Conueniet autē in primis hoc un  
ctum, quod. ℞. Oleorum mastichini, de absin-  
thio, de menta, myrthini. añ. 3. ii. pulueris cinnamo-  
ni, electi, gariophyllorum, galangę. añ. 3. i. balauft.  
arum rub. añ. 3. s. cere quod satis est, fiat unguen-  
tum. Vel hoc ceratum, quod. ℞. Oleorum mastichi-  
ni, de absinthio, cotoneorum. añ. 3. i. olei de menta,  
calami odorati, gariophyllorum, thuris. añ. 3. i. li-  
ni aloës. 3. s. rosarum rub. santalorum alborum et  
peoruz. añ. 3. s. mastiches, cumini. añ. 3. i. hypocisthi-  
ni, acatię, rhois, hoc est sumach. añ. 3. i. s. gallię mos-  
chate. 3. i. cum cera et resina quod satis est, fiat cera-  
tum. Porro quib. cicatricem factam esse coniectamus,  
etiā acrium rer. comestiones frequentiores apte  
sunt. Acrium enim rer. comestio uelut refrica-  
tionem quandam cicatricuz operatur, quin et insitū  
dolorem reuiuificat, et concoquendi facultatez quo-  
dammodo refocillat. Conuenient itaq; in hoc casu  
Gal. Cap. 9. artis medicinalis autore, quę sufficien-  
ter abstergunt, et parū adstringunt. Admiscēda itaq;  
semper adstringentib. medicamentis abstergentia. In  
his causis lienterię omnib. eodē curationis mō utē-  
rī est, quo in diarrhœa et dysenteria affectis utimur.

## De dysenteria.

## Cap. X.

**Δ**υσεντερία proprie Gręcis exulceratio est intesti-  
norum. Latinis tormina, quod intestina dolo-  
re torqueatur, nominatur. Fit interdū a cau-  
sis extrinsecis, ueluti frigidityte, ardore, et humidita-  
te. Item malignorum medicamentorum potu, scam-  
monię scilicet, et similium. A fructuum comestione,  
I iii crudi-

Vnguen-  
tum.

Ceratum.

Stacica  
tricefala  
lienteria  
oriatur.Dysente-  
ria.  
Causa.



**Stigna.****Quando****Quando  
exulceratio  
in  
intestinis  
consistit.  
Si in cras-  
sioribus.****Vitam.**

cruditatibus, acrium ciborum acceptione, ab humoribus, mordacibus et acris ex uniuerso corpore ad uentrem confluentibus, aut in ipso natis. Hec quidem nunc ex tenesimo, nunc per se incipit. Excernuntur primus biliosa, uaria, subpinguia: pingui nimirum quod intrinsecus intestinis adheret, paulatim circumliquefacto. Quum uero superficies intestinorum perfecte fuerit denudata, exulceratioque supernè consistit, seculenta ac cruenta excernuntur. Vbi autem altius penetrauerit ulceratio, etiam sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur. Et si non celeriter cohibeatur, uicinos locos depascitur: saniosa uero quedam excernuntur, qualia à mortuorum cadaueribus defluere consueuerunt. Si quidem igitur ab exulceratione cruenta stercorei commixta, cum labore et torminibus, mordacitate ac exolutione, ut non procul ab animi deliquio egri absint, deiciantur, à siti que infestentur, et febricitent, ulceratio tenuia intestina obsidet. Sin autem sincera ac multa egeruntur stercora, et coaceruata, et cum flatibus prodeunt, pinguia quoque iis commixta fuerint, et cruor supernatauerit, in crassius intestinis ulcus consistere credendum est. Id quod nosse, non mediocriter ad curationem conducit. Nam si in superioribus intestinis ulcus est, ab epotis medicamentis presidium petendum est: si uero in crassioribus, clysterem subiicere magis conuenit. Principium curationis dysentericorum à quiete et modico cibo fiat, undecumque tandem fluor procedat. Permittentibus itaque febribus, lacte recens multo adhuc calido utendum est: aut pro eo lac coctum, quod in Cap. de Diarrhoea descripsimus, exhibendum. Primus enim lac depurgat, simul ea que in corpore sunt contemperando: postremum uero aluum sistit. Opus autem insuper et panem madefactum, à lactis acceptione offerre. Pulses etiam ex lacte apparet, tum medicamentum, tum nutrimentum optimum præbere: uelut



uelut est oryza cum lacte, amyllum, & oua lacti com-  
 mista. Sorbitiões quoq; aut pulles ex alica, milioq;  
 adiecto rhoë, conueniunt. Apparanda item puls ex  
 ficcis panibus affusa posca, aut palmarum, aut malo-  
 rum cotoneorum, aut pitorum, aut rhois succo. Len-  
 ticula quoq; probè affata cum plantagine, aut malis  
 cotoneis contusis decocta exhibenda. Olerum usus  
 non est necessarius, attamen degustandas exhibebis,  
 terin seu endiuia coctam, plantaginem, brassicāq;  
 bis coctam, Damas & ouorum assatorum lutea. Car-  
 nes dysentericis non ualde commodè existunt, dan-  
 dæ tamen eis qui diuturno malo uexantur. Ex iis  
 autem præ cæteris uolucrum eligendæ, perdicis ni-  
 mirum, palumbium, & montanarum auicularum. Ex  
 pedestribus carnes capræ & leporis conueniunt. In  
 potu à principio quidem aqua pluuiæ, quæ non sit  
 ex ædibus plumbo intectis delapsa, utendum est. talis  
 enim aqua sanis etiam potata dysenteriaz conciliat.  
 Quod si pluuiæ optima non adfit, fontana in qua  
 chalybs ignitus extinctus sit, utemur. Si uero labo-  
 rauerit stomachus, aut ubi uires fuerint deiectæ, etiā  
 uinum præbendum. Sit autem adstringens, & nō ual-  
 de uetustum. Somnus optimum dysentericis reme-  
 dium. Quod ad curandi rationem attinet, scien-  
 dum quidem utenduz esse remediis adstringentibus  
 obtundentibus, resiccantibus, & urinam mouentibus,  
 atq; adeò fluxionem transferentibus. Quæ adstrin-  
 gunt, hæc sunt: lapathi semen, rhus (sumach uocant)  
 galla, malicorium aridum, rubi radix, ladanum, aca-  
 tia, hypocisthidis, balauustum, folia salicis, symphyti  
 (consolidam maiorem nominant hodie) radix, fo-  
 lia & semen: rhëon ponticum, si haberi potest: althææ  
 radix, equisetum. coralli, mastiche, coagulum leporis,  
 sanguis draconis, cortex thuris, lemnia terra, uerba-  
 sci radix, mora acerba, acini uue, plantaginis semen,  
 similiter folia & radix, maceris cortex. Obtundunt

Potus.

Curatio

Adstrin-  
gentia.Obtundē-  
tia.

I iiii autem



**Reficcantia.**

**Si crassa intestina exulceratione laborauerint.**

**Clyster abstergens. Infusum conglutians.**

**Dolor lentens infusum.**

**Si in tenuibus sit exulceratio.**

autem et contemperant humorum morsum et acrimoniam, amyllum, tragacantha, gummi arabicum, adeps caprinus, hircinus, et suillus, anserinus ac gallinaeceus. Reficcat coagulum leporis, cornu ceruinum ustum, teste cancerorum fluuiialium, et saluia. Vrinam mouentia pete ex suo Capite. Quod si itaque crassiora intestina exulceratione laborant, clysteres adhibeantur, primum quidem abstergendi ui præditus, quod est qui. R. Aquæ decoctionis hordei integri lib. i. mellis rosacei colati. 3. i. sacchari rubei. 3. s. uitellos oui num. ii. olei rosacei. 3. iii. misce, fiat clyster. Facta absterfione, ea quæ glutinare possunt infundantur, quale est quod. R. Rosarum rub. plantaginis, foliorum symphyti, polygoni (corrigiolam uocant) uerbasci. añ. M. i. gallarum, rhois obsoniorum. añ. 3. ii. bursæ pastorie. M. s. balaustrorum. 3. i. oryze toste. 3. i. radices symphyti. 3. s. Decoquantur singula in aqua chalybeata, donec tertia pars absumatur. Dein. R. Colaturæ lib. i. succi plantaginis. 3. ii. acatiæ, hypocisthidis. añ. 3. ii. boli armenie, sanguinis draconis. añ. 3. i. adipis caprini. 3. i. oleo rosacei, myrthini. añ. 3. i. s. misce, fiat infusum. Interdum dolor tam uehemens est, ut non solum obtundentia, uerumetiam stupefactione medicamenta sint iniicienda. In quem sanè usum conuenit hoc uti clysteri, quod. R. Lactis caprini aut uaccini lib. i. butyri salis experti. 3. i. adipis caprini. 3. i. s. tragacanthæ gummi arabici. añ. 3. i. uitellos ouorum numero. iii. M. pilularum de cynoglossa. 3. i. olei rosacei. 3. iii. misce, fiat clyster. Si uehementiori stupefactione opus fuerit, opii grana aliquot pro pilulis de cynoglossa adice, nempe tria aut quatuor. Ceterum si in tenuibus intestinis exulceratio consistit, tunc remedia quæ per os sumuntur, magis desiderat. Conuenit itaque decoctum ex rebus adstringentibus supra commemoratis, adiectis syrupis rosaceo et myrthino, cum aliis quæ in Cap. de Diarrhoea dicta sunt, exhibere.

Potest



Potest etiam hoc medicamentum assumi, quod. ℞. De cocti radices symphyti, aut alterius medicamenti adstringentis. ℥. iii. syrupi rosacei. ℥. i. syrupi myrthini. ℥. s. pulueris trochiscorum de spodio, seminis plantaginis, boli armenie. añ. 3. ii. misce, fiat potio. Extrinsicus præter ea quæ commemorata sunt in Capitib. de Diarrhoea & Lienteria, ad mouendum erit hoc ceratum, quod. ℞. Oleorum masticiæ, rosacei, myrthini, cotoneorum. añ. 3. i. farinæ hordei, fænogreci, añ. 3. i. s. rosarum rub. plantaginis. añ. 3. i. balaustrorum, sanguinis draconis. añ. 3. s. boli armenie. 3. i. hypocythidis, acatie, mastiches. añ. 3. ii. cum cera & resina quod satis est, fiat ceratum. Possunt & multa alia ad exemplum illius componi, quæ commemorare singula & superuacaneum & inutile iudico.

Extrinsicus  
que  
adhibenda  
Ceratum  
optimum.

## Detenensmo.

## Cap. XI.

**T**ενεσμός est assidua & quæ differri ad deuitari non potest, desidendi seu egerendi cupiditas, quæ tamen nihil præter modica cruenta, uel mucofa, egeritur. Latinis tenesmus, barbaris medicis nostri temporis tenasmus. Fit interdum propter frigiditatem extrinsecus occurrentem, humores acres, biliosos, aut pituitas, salsam, ulcus, aut inflammationem in intestino recto obortam. Interdum etiam stercoris in intestino cæco coacti obstructio tenesmus efficit. Causas extrinsecas de sermonibus egri intelliges, quia nimirum podice attigit res frigidas, aut hyberno tempore frigus nimium pertulit, aut in aqua frigida diutius commoratus est. Humores ex iis quæ excernuntur dignoscas, quæ uel biliosa aut pituitosa erunt. In ulcere purulenta ac saniosa excernuntur, & in ano doloris pungentis sensus inest. Inflammatio tumores recti intestini, & dolorem grauatiuum unam cum febre efficit, Stercoris multitudinem grauis distentionis sensus circa anum uentrem sequitur. Curandi ratio

Tenesmus.

Causa.

Signa.

Curatio

iuxta



*Si a frigore.*

iuxta causarum diuersitatez uariatur. Si itaq; tenes-  
mum frigus precesserit, uinum meracum calidum bi-  
bendum dato, ac pectinem, inguinaq; ac inter anum  
et scrotum intercapedinem, <sup>ἡ ἑστὶν αἰὼν</sup> Græci uocant,  
oleis ac fomentis calidis irrigato ac foueto: qualia  
sunt rutaceum, et liliorum alborum. Furfures autem  
in uino decocti, ac sacculo excepti, commode sedi  
adhibentur. Clysteres quoq; ex decocto mentastri,  
origani, calaminthe, chamæmelo, abrotono, semine  
anisi, fœniculi, et similibus cōfecti, adiectis oleis ane-  
thino, chamemelino, liliaceoq; iniicere oportet. Por-  
rò mirifice confert, si statim ab excreatione admo-  
ueatur later perquam uetustus, et à fumo denigratus,  
una cum complexis in eo paleis tusus, deinde feruen-  
ti aceto subactus, lintheoq; illigatus sedi subdi-  
tus.

*Si a bilio-  
sis humo-  
ribus.*

Cæterum si à biliosis humoribus in ano ac in-  
testinis detentis fiat tenesmus, clysteres quibus abster-  
gendi atq; abluendi inest facultas iniiciendi sunt, q̄-  
lis est qui. ℞. Decocti hordei lib. i. sacchari rub. ʒ. i. s.  
mellis rosacei. ʒ. i. uitellos oui numero. ii. olei rosa-  
cei. ʒ. iii. misce, fiat enema. Vitet omnia acria eger, ac  
uratur mediocriter frigidis et humidis, q̄ bilis feruo-

*Si a pitui-  
tosis.*

rem obtundere possint. Si a pituitosis humoribus  
procreetur, tum curabitur ut is qui à frigore factus  
est, adiectis tantum clysteribus iis quæ pituitam ua-  
cuare possunt medicamentis, benedicta nimirum la-  
xatiua, aut eclegmate Indi, uel diaphœnicô. Si uero  
ab inflammatione oriatur tenesmus, ptisanæ succus,  
paucis rosis rubeis simul cum eo decoctis infundat.  
Aut uehementiori infestante inflammatione. ℞. de-  
cocti plantaginis. ʒ. v. olei rosacei. ʒ. ii. oui albumen  
unum. misceantur omnia, et iniciantur per clysterē.

*Si ab in-  
flammatio-  
ne.*

Extrinsècus peringon, hoc est, locus inter scrotum et  
anum, oleis rosaceo et myrthino irrigandus. Aut ad-  
hibeatur tale fomentum, quod. ℞. Rosarum rub. plā-  
taginis. añ. M. i. balaustiorum. ʒ. iii. fidiorum. ʒ. i. bac-

*Fomentum*

carum



carum myrthi. 3. ii. foliorum rubi. 3. i. Decoquantur singula in aqua sufficienti, donec tertia pars absumat. In eo decocto imbuta spongia sedi adhibeatur. Vbi opus est suppuratione aut digestionem, fomēta ex decocto radicis altheę, fœno gręco, chamomillę, mefiloti, & furfurum composita adhibenda erunt. Si uero ab ulcere fiat tenesmus, primū abstergentia infusa, deīn glutinantia, haud secus quam in dysenteria, admouenda. Vnguentum etiam hoc sedi inditū fert, quod. ℞. Olei rosacei. 3. i. s. mucositatis tragacanthę, gummi arabici. añ. 3. iii. cerusę, plumbi usti. añ. 3. s. aloę, thuris. añ. 3. i. cere quod latis est, fiat unguentum, quo linamenta imbuta sedi indantur. Si dolor immensus fuerit, prædictis opii. 3. i. addi potest. Si à sterco- ris multitudine oriatur tenesmus, tum clysteribus lenientibus paulatim sterco- ra educi debent, hoc nimirum uel simili, quod. ℞. Maluę, altheę, mercurialis, betę, foliorū uiolę. añ. M. i. se. fœnogręci, lini. añ. 3. s. Buliant omnia in aqua sufficienti, donec tertia pars absumpta fuerit. ℞. Colaturę lib. i. & dissolue in ea casię fistularis. 3. i. s. olei cōmunis. 3. iii. salis triti. 3. i. fiat enema. Porro hoc etiam unice cauendū erit, ne purgantia tum medicamenta bibenda dentur, qđ inde summū egrotanti exitium immineat, attractis aliunde exq; toto corpore ad priorem copiam sterco- rum excrementis, ut diffusē in Paradoxis docuimus.

## De coli doloribus. Cap. XII.

**D**olor qui in laxiore intestino, quod colon ap- pellatur, suboritur, ob multas causas fieri solet potissimū uero quatuor. Primū, propter cras- sos & pituitosos humores intra coli membranulas subsidentes. Secundo, propter flatulentos spiritus, quibus non sit exitus. Tertio, ob inflātionem, intesti- num hoc distendens ac male habens. Quarto, pro- pter acres & erodentes humores, qui colon dictum

Si ab ulce-  
re.Vnguen-  
tum.Si a ster-  
coris co-  
pla.  
Clyster

Cause.

intesti-



Signa.

Intestinum infestant. Quibus crassus pituitosusq; humor dolorem excitat, hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsertim uero ubi coli situs est, ibi quasi tundi ac perforari intestinuz sentiunt. Tormina quoq; affligunt, ructus, nausea, uomitio uaria, potissimū pituitæ. Aluus grauer impedita nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Stercus autem quandoq; excretuz, bouino simile uidetur, leue et flatus plenum. Præcedens horum causa est, continuus ciborum quàm maximè frigidorum crassiq; succi usus, satietas, cruditas, otium, et iis finitima. Qui autem ex spiritu flatulento dolent, tensionem magis experiuntur. Quibus uero propter internum inflammationis feruorem dolor accidit, hos febris haud ignaua uexat, urinæ quoq; simul et stercoreis retentio accidit, pulsus hos etiam iuxta uentrem exercet, sitis, ardor, nausea, et uomitiones potissimum bilis, quæ nihil leuant malum. Hæc q; omnium grauissima est, q̄ in ileum transitionem minatur. Quibus acres rodentesq; succi dolorem mouent, sicut etiam qui inflammationem experiuntur, hos ardor, sitis et uigilia torquet, imò et febricula, sed minus quàm illos. Urina redditur acris, et biliosa deiciuntur. Sæpius autem alui deiectio maiorem excitat cruciatum, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq; assumpti. Quo uero pacto coli et renum affectus discernendi sint, docet

**Curatio** Galenus lib. 6. de Affe. loc. Cap. 2. Viſus et curandi ratio iuxta causarum diuersitatem uariatur. Quia itaq; crassi ac lenti humores doloris causa existunt, uictus ratio in uniuersum extenuans sit. Panis itaq; quo uescitur eger, recens ac in clibano aut furno p̄bè sit coctus, Ex carnibus conueniunt in primis uolucrum, gallinæ nimirum, perdicum, palumborum, turturum, et columbaruz. Fugienda omnia uolucrum genera, quæ in aquis degunt. Ex quadrupeduz animalium genere conueniunt carnes uitulinæ et hœdinæ.

**doloris co**  
**li a crass**  
**et pituito**  
**sis humo**  
**ribus.**  
**Viſus ra**  
**tio exte**  
**nuans.**



dinæ. Legumina omnia uitanda, quòd huic passio-  
 ni incommoda sint. Inter olera conueniunt apium,  
 asparagus, & similia. Allia quoque cruda, & cepas de-  
 uorare, haud nocebit. Et ut summam dicam, alimē-  
 ta sint boni succi, & concoctu facilia, satietasq; ac-  
 cruitas uitetur. Bibendum uinum subadstringens,  
 album, tenue, pellucidum, mediocri ætate, temperatu-  
 ra dilutiore bibaturq; modicè. Quod uero ad cu-  
 randi rationem attinet, si crassi & glutinosi humo-  
 res dolores contraxerint, medendum quidem sic ut  
 non uehementer calefaciamus, quippe ab huiusmo-  
 di præfidiis diffunduntur & inflantur omnes frigidi  
 ac crassi humores, qui intestina distendendo augēt  
 dolores. Conuenit itaq; ipsos diffecare & cōcoque-  
 re citra uehementem calorem, & per eorum quæ mi-  
 nime inflant, usum. In exacerbationibus igitur irri-  
 gationes fiant ex oleo rutaceo, chamæmelino, & ane-  
 thino. Item fomenta, & sacculi ex floribus chamæme-  
 li, anethi, meliloti, seminibus lini, fœnogræci, althææ,  
 & milio. Mirificè autem conferunt clysteres ex oleis  
 iam commemoratis, & decocto prædictarum herba-  
 rum, aut cucumis syluestris radicum, adiectis cumi-  
 no, uel ruta cum adipe anserino, uel gallinæ, confe-  
 cti ad eum modum. ℞. Maluæ, althææ, chamæmeli,  
 mercurialis, anethi, añ. M. i. origani, calaminthæ, pu-  
 legii, añ. p. i. seminum lini, fœnigræci, cumini, smyr-  
 nii, añ. 3. iii. Coquantur singula in aqua fontana, do-  
 nec tertia pars absumatur. ℞. Colaturæ lib. i. hieræ-  
 picræ. 3. s. benedictæ laxatiuæ. 3. v. ecligmatis Indi. 3.  
 i. s. mellis rosacei colati. 3. s. oleorum chamæmelini,  
 anethini, rutacei, añ. 3. i. uitellos oui nume. ii. salis cō-  
 munis. 3. i. s. misce, fiat enema. Glandiū etiam admo-  
 tiones, illitionesq; sedis, ex succo cyclamini cū mel-  
 le & nitro, uel centaurio minore cum melle & nitro.  
 Glandes autē sic cōponi debent. ℞. mellis cōcti. 3. i. s.  
 spērūz hieræ picræ. 3. i. colocynthidos. 3. i. salis gēme-  
 3. s. misce

Curatio

Anodyna

Clyster.

Glands.



**Vomit.** 3.s. misce, fiant glandes oblonge. Vomitus etiam ante conam, si quis facile uomat, præ omnibus auxiliatur. Porro ubi facta iam euacuatione dolores producuntur in multas horas, in solū olei calidi, aut si hoc fieri non potest, in hydrelæum descendere alienum non est. In seffus etiam utilis ex decocto altheę, pulegii, foliorum lauri, fœnigręci, chamæmeli, artemisę anethi, & similibus. Conuenientissimum uero ad colicos medicamentum, uinuz absinthites existit, si plibatione à balneo opus habent. Estq; etiam non sitiētibus ualde commodum. Decoctum quoq; herbę ipsius, ubi semel tantum ebullierit, pari modo ad uinū quod aliās pro consuetudine bibunt, admixtum, uti liter à balneo præbetur. Castoreuz etiam assidue potatum, totius affectionis malum demolitur, omnibusq; medicamentis præstat. Datur eis drachma una in tribus cyathis aquę mulsę. Quod si dolor non conquieuerit, propinandum erit medicamentuz diatrionpipereon, uel theriaca. Quod si uero dolor est uehemens, mediocriter lenientibus ac mitigantibus uti conuenit medicamentis ab inferioribus partibus inditis, aut potis. Nam quę ualenter stupefaciunt uitare oportet, quod paulisper quidem leniant, sed diuturniorem affectum efficiant, dum materiam incrasant, meatusq; intestini condensant. Anodynis itaq; propriè uocatis medicamentis, quorum aliqua initio Capitis dicta sunt, iterum utendum. Quę autē à tota substantia colicis auxiliantur, multa sunt. Lupi autem stercus maximè album, ex aqua aut uino albo tenui summè conuenit. Melius autem stercus censetur, quod non in terram delapsus reperitur, uerum in fruticem aut herbam excretum. Mirum etiaz in modum colicos iuuat, amuleti instar illis ægroti alligatum idem lupi stercus. Reliqua apud Aëtium lib. 9. Cap. 31. descripta habes. Porro si flatulentus spiritus doloris causa fuerit, clysteres qui flatus discutiunt

**Vinum ab  
sintbites.**

**Castoreū**

**Stupefa-  
cientia.**

**Quę a to-  
ta substā-  
tia confe-  
runt coli-  
cis.**

**Coli doio-  
ris a flatu-  
lentis spi-  
ritib.**



scutiunt infundendi, qualis est qui. ℞. Abrotoni, origani, pulegii, calaminthæ, chamæmeli. añ. M. i. rutæ, mentæ, parietariæ. añ. M. s. seminum anisi, fœniculi, carei, cumini, anethi, smyrnii, dauci. añ. 3. ii. Decoquantur, donec tertia pars absumpta fuerit. ℞. Colaturæ lib. i. hieræ picræ, benedictæ laxatiuæ. añ. 3. s. castorei. 3. i. specierum diacumini. 3. ii. oleorum rutacei, anethi. añ. 3. i. s. salis cōmunis. 3. i. misce, fiat enema. Potest etiam prædictis addi ecligma de baccis lauri, quo ad discutiendos flatuosos spiritus nihil est efficacius. Proderit etiam eius ecligmatis quantitatem nucis auelang, in decocto aliquorum incidentium medicamentorum indies propinare. Extrinsecus autem abdomēnis quæ flatus dissipant fouendum, ac irrigandū erit. Sunt autem præter ea quæ dicta sunt, nigella, ammi, oreoselinum, amygdalæ amaræ, piper nigrum, mentastrum, bacce lauri, absinthium, semen urticæ, acorus, maiorana, et cinnamomum. Ex iis itaq; cataplasmata, fomenta, aut iacculos conficies, Quod uero reliqua omnia uincit, et incantamenti cuiusdam simile quid efficit, Galeno lib. 12. Ther. meth. Cap. ultimo teste, est cucurbita maxima leuis cum copiosa flamma toti abdomini affixa. Aeger etiam à diluti uini, et frigidæ aquæ potu, lactis et aliorum refrigerantiis, ac flatuosos spiritus gignentium alimentorum usu, sibi caueat. At uini potius meracioris potu, uictusq; ratione aliqua calefaciente ac incidente utatur. Præterea inflammatione intestinū exercente, uena in cubito aperienda est. Si uero urinæ difficultas superet ac dominetur, ex maleolo sanguis detrahendus erit. Prædictis etiam utendum remediis, exceptis acerbis, et uehementer purgantibus. Enematis uero potius lenientibus, item cataplasmatibus, et irrigationibus, et in oleum descensu utendum. Cucurbitulas etiam iis affigimus. Victus autem ratio tenuis sit, et fere febricitantium, donec inflammatio soluetur.

Curatio.  
Clyster.

Flatus dissipationis.

Cucurbitula magna

Victus.

Coli doloris ab inflammatione curatio

Victus.



Coli doio  
ris ab acri  
bus & ro  
dentibus  
humorib.  
curatio.  
Enemæ.

Balneæ.

Vicius.

Stupefa  
cientia.

tur. Atqui si propter acres rodentes quæ humores dolitant egri, per sedem infundere conuenit ea quæ humores eluere, atq; citra mordacitatez purgare possunt: cuiusmodi est ptisanæ succas, aut decoctum fœ nigreçi, seminis lini, chamæmeli, & althææ, cum adipe recenti anseris uel gallinæ, & rosaceo oleo. Conuenit autem hoc potissimum enema, quod. R. Foliorū uiolę, intybi domestici utriusq; foliorum althææ, chamæmeli. añ. M. i. s. seminum fœnigreçi, lini. añ. ʒ. s. Buliant in aqua sufficiēti, donec tertia pars absumpta fuerit. R. Colature. ʒ. xiii. casie fistularis. ʒ. i. hie. re picre. ʒ. vi. olei rosacei. ʒ. ii. olei anethini. ʒ. i. pinguedinum anseris, gallinæ. añ. ʒ. iii. uitellos oui nume. ii. misce, fiat enema. Non autem solum uacuare, uerumetiam temperare infestantem humorem oportet. Quapropter balneis ex dulci aqua utendum: ea enim mitigare, & somnum conciliare possunt. Exhibendus etiam syrupus uiolaceus & rosaceus, & alia eiusmodi, quæ contemperare, ac uim mordacium humorum obtundere ualent. Utendum etiam cibo sordibili, ptisana nimirum, ac piscibus saxatilibus. Abstinentum acerbis omnibus tum cibis, tum medicamentis, fomentis, irrigationibus, cataplasmatibus calentibus, necnon uini potione, potissimum ueteris. Et ut rem paucis perstringam, tota uictus ratio humidior & frigidior sit. Quum autem dolor nihil remiserit, s; uehementius subinde sequerit, ad stupefacientium usuz confugere oportet. In hac enim passione, non soluz quod sensuz stupefaciūt, sed & quia humores tenues incrassant, caloremq; refrigerant, opitulantur. Inter ea uero potissimuz philoniuz conuenit, de quo usq; ad integram drachmam exhibere licebit. Et catapostia de cynoglossio inscripta, ex una drachma, ut antea quoq; dictum est, sex conficiendo pilulas, unāq; ante cubitum exhibendo, mirificè conferunt.

De ileo.



**I**leos, passio est intestinorum tenuium, grauissi- Ileos.  
 mos et letales dolores inferens. Sic dicta à circū  
 actione doloris. ἐλεος siquidem Grecis est cir-  
 cumuolui, et circumagi. Hinc est quod Latinis con- Conuolu-  
 uolulus et uoluulus dicatur. Barbaram sectantes ulus et uo-  
 medicinam, Iliacam nominant. Contrahitur id ui- lulus.  
 tii continua ciborum corruptione, et cruditate, ma- Causa.  
 xime autem à pinguibus carnibus. Oboritur etiā ex  
 plagis ac ictibus quibusdam, iis locis ubi tenuia inte-  
 stina sita sunt factis. ex frigore uehementi constrin-  
 gente, ac recrementa retinente. Contingit et iis, qui-  
 bus intestinum in scrotum una cum stercore delap-  
 sum est, indeq; uolenter retrusum, ex eoq; inflamma-  
 tum existit. Fit etiam ob ueneni potionez, et ob indu-  
 ratum stercus, circa tenuia intestina impactuz. Famī-  
 liaris est hæc passio pueris, euadunt tamen beneficio  
 naturalis humiditatis. Senibus uero nō ualde fami-  
 liaris est: si tamen ipsi hanc passionem incidant, ferē  
 nunq; conualescunt. Accedit egris dolor uehemen- Signa.  
 tissimus, et tumor aliquis in tenuium intestinorum  
 parte eminet, ut uideatur intestinum ad chordę simi-  
 litudinem conuolutum: unde etiam cordapson nō Cardapa-  
 nulli hanc passionē appellauerunt. Adest etiā stoma- sos.  
 chi nimia humectacio, exolutio, ructus inanes nihil  
 alleuantes, murmura intestinorum, cohibitio perfe-  
 cta stercoris et flatuum. Si uero intendatur adfectus,  
 omnia sursum feruntur, ob idq; uomitus pituitæ ac  
 bilis accedūt, frigiditas totius corporis, dolorq; plu-  
 rimis etiam spirandi difficultas. Morituris autez am-  
 plius sudor frigidus, urine difficultas, podex ita ad-  
 strictus ut neq; specilli extremuz suscipere possit. Ali-  
 quando et stercus uomitu reiicitur. Siquidē igitur à Curatio  
 cruditatibus, ac multis uariisq; cibis ingestis fit ma- ilei a cru-  
 luz potissimū ubi crudus cibus adhuc insidere uētri ditatibus.

K uidea



uideatur, uomitus concitandus erit. si uero nihil cru-  
dorum ciborum in uentre contineatur, omni cona-  
tu enitendum est, quo tum flatus, tum stercorea infra  
trahantur: idq; per clysteres, glandes, et illitiones, ma-  
gna diligentia in singulis adhibita perficiendum.

**Enema.**

Fiat itaq; tale enema, quod. ℞. Mercurialis, rutæ, fo-  
liorum altheæ, centaurii minoris. an. M. i. hyssopi,  
calaminthæ; absinthii. añ. M. i. s. radicis altheæ. ʒ. i. ra-  
dicis cucumeris syluestris. ʒ. i. s. seminum lini: fœni-  
græci. añ. ʒ. iiii. seminis cumini. ʒ. 2. Bulliāt in aqua suf-  
ficiēti, donec tertia eius pars absumpta fuerit. ℞. Co-  
laturæ. ʒ. xiii. benedictæ laxatiuæ. ʒ. i. butyri recen-  
tis: mellis rosacei colati. añ. ʒ. s. oleorum rutacei, ane-  
thini. añ. ʒ. i. s. salis. ʒ. i. misce, fiat clyster. Infundendus  
est ante cibum; urgente uero malo etiam à cibo. Pre-  
cipiendumq; ut quamdiu quidem queant egrotantes  
retineant. Glandes quemadmodum in coli dolori-  
bus paratæ; adiectis semine rutæ; cumino; et brassicæ  
caulib. Longiusculas etiam facere oportet: ut pfun-  
dius penetrare possint. Cyclamini succo; aut melle  
cum nitro podex illinendus. Hoc deniq; malum ca-  
taplasmatis; et fomentis; sicut in Cap. de Colicis cō-  
prehensum est; curare oportet. Conueniunt autē po-  
tissimuz fomenta ex lanis oleo, in quo cuminū; ane-  
thum; ruta; et nasturtium decocta sint; madefactis.

**Glands.**

**Fomenta.**

Cataplasmata autem ex semine lini; fenogreco fari-  
na hordeacea, loliacea; ruta; cumino; anethi semine  
et apii. In solium etiam aqua et oleo confertum descē-  
dere conuenit. In aqua uero althea; ruta; anethuz; et  
alia quæ dicta sunt decoquantur. Post hæc cucurbi-  
tæ affigantur: primum quidem ad remotos locos; le-  
ues; deinde ad ipsos etiam dolore affectos; scarifica-  
tionesq; profundiores fiant. Purgationes etiam assu-  
mere conuenit; potissimum ubi primum per ea quæ  
dicta sunt; stercorea p̄m̄ ad inferiora tracta fuerint.  
Mirifice ipsis conducit; si uomuerint: anethum co-  
ctum

**Cucurbite**

**Purgatio-  
nes.**



Etum potumq; . A potu autem panem in aquam feruentem conice, eiusq; frustra calida confestim edenda præbe. Si uero à uenenoſo medicamento quis in ileon incidat, aquam tepidam multam bibendam dabimus, uomereq; cogemus. Deinde oleum calidum in potu dandum, aut pinguia iura, ut rursus uomat. Postea ita parumper quiescant, & deinde statim theriacen cum uino dissolutam accipiant. Cibi eis exhibeantur boni succi. Quod si obstructio perseuerauerit, alius lacte scisso, cum modica aloë, aut alio medicamento purgante uacuanda erit. Si ab inflammatione ileos orta fuerit, à uenæ sectione auspicandū erit, deinde cucurbita inflammatis partibus per ambitum sacrificatis affigenda, & enemata ex decocto maluæ, fœnigræci, seminis lini, cum oleo & butyro immittenda. Extrinsecus etiam ea quæ inflammationibus conducunt, & dolorem leniunt, ut in Capite etiam de Coli dolore dictum est, apponenda. Et in inedia ad tertium usque diem seruandi. Si ex intestini in scrotum delapsu ileos accidat, confestim tentandum est, ut decubitu sursum uersus uergente adornato, delapsum intestinum ad inguinū pariter retrudatur, atque leniter citra uiolentiam ac compressionem, ligatur a fasciæ adhibita cōtineatur.

## De lumbricis. Cap. XIII.

**L**umbricorum, ἑλμινθας Græci uocant, tres sunt uniuersæ differentiæ. prima teretum seu rotundorum, altera latorum, tertia eorum quos ascarridas nuncupant. ἑλμινθες στρογγύλοι, hoc est, teretes lumbrici speciem habent omnibus perspicuam: nempe secundum crassitudinem rotundi sunt, longitudine uero palmares, & aliquando longiores, & aliis frequentiores sunt. In gracilibus plerunq; intestinis cōsistunt, & superiorem uentriculum subeunt, ideoq; frequenter per os reiciuntur, quibusdā & è narib. redduntur.

K ii tur.

Ilei à uenenoſo medica-  
mentocu-  
ratio.Iici abla-  
stammatio-  
ne cura-  
tio.Ilet ex de-  
lapsu in-  
testini in  
scrotum  
curatio.

Lūbrici.

Teretes e



Lati.  
Ceiria.  
Tania.

Ascarides

Cause.

Signa ro-  
tundorum

tur. Atq; hoc genus infantibus & pueris, atq; his qui ad pubertatem accedunt peculiare est. Lumbrici lati à Grecis medicis *κεῖρια*, hoc est instite, à similitudine quam ad institas habent: qua ratione etiā *ταῖναι* ab iisdem uocantur quod instar, fasciarum sint lati & longi. Incredibilis enī longitudinis sunt tenuē, ut Plinio autore lib. 11. Cap. 33, tricenum pedum alii quando uisē sint, aliquando etiam plurius. Nihil autem est latus lumbricus, nisi permutatio intrinsecus tenuia ambientis intestina membranæ, in corpus quoddā uiuum, & animalis modo mobile. *Ασκαρίδες* tenues ac breues, uermibusq; similes lumbrici sunt. In extremo longanone, & anī fibula (sphinctere; nominant) initio reperiuntur. Origo omniū generū est ex cruda, crassa: pituitosaq; materia: & putredinē accommoda: qualis in pueris aliisq; uoracibus colligitur. Sequitur eos qui rotundos lumbricos continent, incredibilis morsus intestinorum & uentriculū sufficulaq; tenues ac exigue, & frequenter irritantes, quoz tamen nihil reiiciatur. Nonnullos comitatur singultus, & somnus cum tremore: & qui his occupatur, sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamore exurgunt & profiliunt, & iterum sopiuntur. Quidam uero & linguam foras protrudunt ac exeunt, oculosq; claudunt, taciturniq; sunt, excitantibus indignantur, ob imbecillitatem uigilare nequunt. Quidam autem oculos sanguine suffusos habent, & pulsum inē qualem, obscurum, deficientem, & recurrentem. Quibusdam etiam appetitus perditio accedit. Pueris insuper dum dormiunt manducatio lingue, cui accedit conformatio oris in modum latentium, aut accipientium cibū. Plerisq; uero alius delicit, corruptos egerens cibos, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neq; esurie precedente, neq; euacuatio ne immodica facta. Atqui non in omnibus omnia quę iam cōmemora-



morauimus signa sunt singulatim inquirenda, sed quæ reliquis præpollent, et principatum tenent: aliquando uero et plurima. Latus lumbricus continuos stomachi morsus infert, et ad cibos impotentes ac incorrigibilem appetitum. Nam quod animatum euasit in intestinis obiectum rapit alimentum, ut alio statim opus sit: et nisi assumpserit, intestina rodantur. Consequitur sic patientes, corporis gracilitas et imbecillitas, assiduusque famis sensus. Infallibile autem ac certissimum indicium, si cum recrementis quædam cucurbitæ semini similia excernantur. Ascari des uehementem pruritum in ano excitât, assidueque ad egerendum irritant: et qui hoc malo afficiuntur, ut plurimum ab excretionem melius habent. Victus ratio calida et sicca sit, potissimum si febre ægrotantes uacauerint, cibisque utantur probi succi, et qui facile in membra digerantur, nec lumbricorum effectricem causam adaugeant. ideoque omnia quæ pituitosos humores procreare possunt, fugienda. liberalius nutriantur, famemque minime ferant: quod lumbrici nisi cibum habeant quæz consumant, postea ipsa solida corpora arrodant. Dabitur autem cibus tunc præcipue, quum non prosus inaniti fuerint. Vinum bibant aquosum. Ceterum curandi ratio non differenda: quod multi nulla lumbricorum ratione habita, corrosi ab iisdem, et conuulsi intererint. Curatio uero tam rotundorum quam latorum in hoc consistit, ut hos prius occisos, expellamus. Occiduntur autem amaris potissimum medicamentis, inter quæ simpliciora hæc sunt: Absinthium, abrotonum, calamintha, marubium, dictamus, hyssopus, ruta, folia persicorum, coriandri semen, cornu ceruinum, lupini, menta, pulegium, origanum, centaurium minus, filix, gentiana, aristolochia rotunda, esus alliorum, brassicæ semen, et helenii radix. Inter omnia autem laudatissimum remedium est aloë. Quia uero infantes aloe nigræ

Signa latorum.

Signa ascari-  
dum.

Victus.

Curatio.

Simplicia  
medicamenta  
lumbricos occi-  
dencia.

K iii uiter



niter propter suam amaritudinem admittunt, supinis fasciola ipsis detentis ore adaperto ac diducto per fistulam quandam ualido munitam canali, inuitis illam iniiciemus. Ex dictis itaque medicamentis simplicibus, uaria componi medicamenta possunt, nimirum decocta, pulueres, cataplasmata, emplastra, et unguenta. Conuenit autem is puluis: præter alia qui. ℞. Seminis lumbricorum. 3. 2. centaurii minoris, absinthii, cornu ceruini usti. añ. 3. 1. calaminthæ, pulegii, origani. añ. 3. s. abrotoni, mentæ, lupinorum, foliorum aristolochiæ rot. añ. 3. 1. aloës. 3. 2. miice, fiat puluis, de quo detur drachma una, aut semis, pro ætatis et habitus corporis ratione in lacte, aut melle, aut syrupo de dulci radice. Nam debent ea quæ lombricos enecant, cum dulcibus liquoribus propinari, quo citius medicamenta dulcedine illa affecti lumbrici amplectantur. Extrinsecus umbilicus felle taurino, aut hoc unguento illinendus, quod. ℞. Olei amygdalarum amararum, olei de absinthio. añ. 3. 1. fellis taurini. 3. s. centaurii minoris, absinthii, lupinorum. añ. 3. 2. foliorum persicorum: cornu ceruini usti, aloës, abrotoni. añ. 3. 1. cere quod satis est, fiat unguentum. Vel imponatur toti uentriculo hoc ceratum, quod. ℞. aloës, absinthii, farinæ lupinorum. añ. 3. 2. nigellæ, mentæ, origani, pulegii, marubii. añ. 3. 1. centaurii minoris, calaminthæ. añ. 3. s. oleorum de absinthio, amygdalarum amararum. añ. 3. 2. olei costini. 3. 1. fellis taurini. 3. s. cum cera et resina. q. s. fiat ceratum. Ad imagines illorum possunt componi emplastra et cataplasmata, ita ut peculiaribus horum paradigmata ascribere minime sit necessarium. Ab inferioribus et partibus nullam iniicere copiosiore expedit, quo lumbrici mellis dulcedine illecti, deorsum descendant. Ceterum enecatos iam per pharmaca prædicta lumbricos, citra dilationem expellere oportet. Vitiosa enim ex ipsis exhalatio procedit, quæ et appetitum et concoctionem lædit.

Extra

Compositi  
2a.

Puluis.

Unguentum.

Ceratum.

Lumbrici  
enecati ut  
expellendi  
sunt.



Extrahuntur autem per glādulas suppositas, aut me-  
dicamenta purgantia assumpta; potissimum uero p-  
hieram picram, & pilulas communes (quæ alio nomi-  
ne pestilentiales uocantur) quæ sanè mirifice in edu-  
cendis lumbricis conferunt. Porro qui lumbricis Si lū-  
cum alui profluuiō infestantur, eos fluore inspissan- uulū a  
do, & concoctionem tum per cibos, tum per cataplas- cedat.  
mata in melius permutando, curare oportet. In quā-  
tum enim profluuium inualefcit, tantum etiam lum-  
brici interquiescunt. Quare diligenter conandū ut  
aluus adstringatur, firmitasq; ei adiciatur. His itaq;  
plantaginis succus propinandus, uel ipsa etiam ari-  
da plantago assumenda. ex æquo enim utriq; & fluo-  
ri alui & lumbricis efficax est. Cataplasmata etiam,  
cerata & unguenta ex cruda hordeacea farina, mali-  
corio, acatia, hypocisthide, & similibus adstringenti-  
bus concinnanda, adiectis iis quæ ad lumbricos in-  
terficiendos sunt prædicta. Cōferunt autem adstrin-  
gentia & hoc etiam nomine extrinsecus admota, qđ  
uentriculum ex amarorum medicamentorum as-  
sumptione læsum iterum corroborent. Licebit & in  
hoc casu uermes terrenos exiccatos, & in puluerem  
reductos, cum hydromelite exhibere. Ascarides in  
infantibus uacuandi sunt cum glandibus ex melle &  
sale confectis. In prouectioribus, clysteribus ex de-  
cocto absinthii, centaurii minoris, calaminthe, lupi-  
norum, & aliorum supra commemoratorum, oleis  
adiectis, compositis. Post clysteres longanon sim-  
plicibus quidem acatia, hypocisthide, rhois succo,  
aut alio adstringente sublinendus est. Coacta. n. ab  
adstringentibus caro corroboratur, aptitudinemq;  
ad animaliorum generationem amittit, atque asca-  
ridas ipsas excludit. Hoc uero & pueris, & qui perfe-  
ctæ sunt ætatis conducit, efficacissimumq; existit.  
carnem ueterem salitam, pinguedine derasa, sublon-  
gam & rotundam formabimus, atque ita adapta-

Ascarida  
Curatio

K iiii tam



tam podici atq; sphincteri intrudemus, lig amētoq; adhibito, quandiu sustineri possint, inditaz sinemus deide soluemus, simulq; ascarides illi adherētes educemus. Posthēc p̄dicta infūdēmus, atque illinemus.

De hemorrhoidibus sedis. Cap. XV.

**Hemorrhoides.** **Cæcæ.** **Apertæ.** **Causa.** **Signa.** **Curatio.** **cacurum.** **Dolores.** **Sedantia.** **Hemorrhoides.** **aperiētia.**

**A** i poggoides uenarum in sede sunt explicatōnes dilatationes uē, à sanguinis defluxu sic appellatæ. Harum aliæ cæcæ, quæ scilicet intumescunt, & nih il aut parum admodum sanguinis excernunt. Aliæ apertæ, quæ uidelicet certis quibusdam temporibus panduntur, & sanguinem emittunt. Fiunt autem hæmorrhoides, propter copiam sanguinis faculenti & melancholici, quem iecur ad ipsas reponit. Signa uero p̄ quæ affectus deprehenditur, satis manifesta sunt. oculis enim conspiciuntur cæcæ, & dolorem uehementem, potissimum in excernendo stercore, excitant. Apertæ sanguinem fundunt, qui latere sic laborantes haud potest. Quum itaq; cæcæ apparuerint hæmorrhoides, & magnos in ano cruciatus excitauerint, corpusq; plethoricum fuerit uena poplitis aut malleoli incidenda erit. Alius etiam affatim leniter subducentibus medicamentis molliēda, ne arida stercora dum excernuntur, dolorem faciant. Apponenda quoque ea sunt, quæ dolorem, ubi uehementis fuerit, mitigare possunt. Ex quorum numero est mica panis in lacte macerata, & cum oui uitello decocta, & instar emplastri admota. Prodest etiam balneū ex decocto maluæ, foliis uiolæ, meliloti, fœnigræci, chamemeli, foliis althææ, semine lini, floribus uerbasci, & similibus apparatus. Vel si eo uti non poterit, lanæ, aut spongiæ in decocto illo madefactæ dolenti loco adhibeantur. Quod si prædicta nihil contulerint, sanguinem ab iis elicere oportet. Quapropter cyclamini succum, aut cepæ, aut fel bubulum lana illitum intra anū imponere oportet. Idem etiam potest



potest centaurii minoris succus, stercus columbinū  
 staphysagria, folium ficus, si cum eo fricentur, & me-  
 dulla colocynthidis in oleo amygdalarum amara-  
 rum macerata. Potissimum uero hoc emplastrum  
 confert, quod. ℞. Stercoris columbini. ʒ. s. seminis  
 staphysagrie, lupinorum añ. 3. i. s. amygdalarum ama-  
 rarum. 3. i. medullę colocynthidos. 3. s. succi cycla-  
 mini, cępe añ. 3. i. misceantur singula, & ad formam  
 emplastri reducantur, adiecto si opus erit oleo amyg-  
 dalarum amararum. Glandes etiam oblongę ex radi-  
 ce cyclamini paratę. in anum inq̃i possunt. Hirudi-  
 nes etiam in harundine incluse, ita ut caput exerant,  
 hemorrhoidibus ut adaperiantur, imponi solent.  
 Has ubi amouere non poteris, cinere illarum capiti  
 insperso decidere sua sponte facies. Ceterū si aper-  
 te fuerint, & sanguinem modicę per certa interualla  
 fuderint, minime supprimendę sunt: quod huiusce  
 modi sanguinis eruptio hac passione decentos ho-  
 mines a multis malis immunēs reddat. Id quod in pri-  
 mis testatur Hippocrates, qui sic scriptum reliquit:  
 Habentes hemorrhoides neq; laterum dolore, neque  
 pulmonis inflammatione, neq; depascenti ulcere, ne-  
 que furunculis, neq; terminthis, pariter neq; lepre,  
 neq; uiriliginibus corripuntur. Quod si uero im-  
 modicę ac iusto largius sanguinē fundant, sic quod  
 egri hoc malo cōtabescant, ac illorum robur deiicia-  
 tur, supprimendę erunt, quodd aliās periculum sit. ne  
 aqua intercus, iocinore ob immodicam euacuatio-  
 nem refrigerato, sequatur. Cibi itaq; erūt iis qui su-  
 prā modum inaniuntur pauci sanguinis, efficaces, &  
 minime recrementicii, quiq; siccant & adstringūt: cu-  
 iusmodi est alica, & oryza. Exoleribus intybus, cicho-  
 rium, portulaca, & similia. Cibi rhu obsoniorum,  
 aut succus immaturarum uuarum admisceatur. Si  
 ulres plurimum prosterantur, carniū expresso,  
 cui succus cotoneorū admixtus sit alēdus eger erit.

Empla-  
strum.

Glandes

Apertariū  
curatio.6. Epid.  
par. 3.  
aph. 29.  
“

Vicus

Vine



**Curatio.** Vina bibat adstringentia. Ceterum si plenitudo corporis affuerit, uenæ interioris in cubito dextræ manus sectio proderit. Si minus, auersioni per cucurbitulas hypochondriis & iecori affixas studendum. In quæ ulum manibus & brachiis etiam uincula iniicere, & frictiones asperas adhibere conuenit. Præterea intra corpus assumenda sunt ea quæ adstringunt, ut sunt syrupi rosaceus, myrthinus, cotoneorum, coralli rubei, bolus armenia, pastilli de succino, de ebore (quos de spodio hodie nominant) de terra lemnia, & alia quæ in Capite de Cruento sputo commemorata sunt. Extrinsecus ea etiam apponenda, quæ sanguinem promanantem sistere possunt. Ex quorum sanè numero, Aëtio lib. 14. Cap. 5. teste, aloë, est eum posca applicata. Idem etiam potest squama ferri, aut plumbum ustum. Vnicè autem confert medicamentum quod describit lib. 5. Ter. meth. Galenus. Id accipit thuris partē unā, aloës partis unius semissim. Hæc cum oui cādido donec ad mellis crassitudinem redeant subiguntur, & mollissimo leporis pilo excepta uasis imponuntur, fascia ex tenui lintheo forinsecus alligata. Proderunt etiam unguenta, balnea, infusiones, fomenta, & alia eiusmodi ex medicamentis adstringentibus: quorum multa in Cap. de Diarrhœa, Lienteria, Dysenteria, & Tenesmo dicta sunt composita. Sacculos tamen in uino rubeo & adstringente priusquam adhibeantur bullire, aut saltem eo irrigare cōuenit. Quapropter si quæ hic desiderabis medicamenta, ea ex Capitib. superioribus, in quib. de sanguinis suppressione agitur, petes. Superuacaneū enim sepius iisdē de reb. uerba facere.

De procidentia ani. Cap. XVI.

**Causa.** Accidit ut interdum propter resolutionem aut imbecillitatem musculorum obliquorum sedē sursum reuellentium, anus procidat, atq; adeo aduobus



à duobus quidem relatis musculis nō queat retrahi, sed manib. aut medicamentis auxiliatricibus egeat.

Quod cum factum fuerit, considerandum in primis, num anus ab inflammatione liber sit. tum enim statim impulsus, in pristinum locum protrudi ac reponi debet. Vt autem intrusus ne iterum egrediatur, retineri queat, adstringentia extrinsecus apponenda sunt. Primum itaq; oleo rosaceo calente circumlinendus, aut uino adstringente detergendus anus, ac deinde in suum locum repositus, deligandus erit. Idq; faciendum statim ubi eger excreuit, ne cōfestim ad egerendum necessitas ipsum urgeat, atq; adeò iterum anus procidat. Linimentum ex acatia & hypocisthida cum uino adhibendum. Incoquuntur etiam in aqua donec rubescat, galla, balauſtia, glandularum calyces, malicorium, bellis minor (primulam ueris nominant) rhu obſoniorum, cortices cotoneorum, & similia, & deinde ex huiuscemodi decocto inſessus & lotiones parentur. Possunt etiam postquā uino aut decocto adstringenti sedes abluta fuerit, arida admo- ueri ac inspergi medicamenta. In quem usum confer bolus armenia, thus, sanguis draconis, galla, acatia, myrrha, hypocisthis, cornu ceruinum uſtum, & similia, quæ ex superioribus sunt petenda. Porro si anus ob inflammationem tumidus imponi nequeat, ubi plenitudo fuerit, uena primum secāda erit uomitusq; ciendus. Sedi apponenda etiam quæ adstringunt, & reprimunt, idq; statim inter initia faciendum. Quod si uero plenitudo nulla adſit, eger in sessione utatur ex decocto chamæmeli, malue, altheæ, seminibus lini, scœnigræci, & similibus parata. Aut in aquā calidam conſcendat, & ei ad tempus immoretur. Spōgia etiam aut lana in decocto prædicto madesacta admoueatur. Anus deniq; oleo e chamæmelino, aut anethino, quousq; reponi possit, i<sup>l</sup>linendus. Postq; uero reconditus iam est, tum suprā commemoratis medicamentis adstringentibus, utendum erit.

De rimis

Curatio.



ῥaya'as

Causa

Condylo  
mata.

Cura.

Vnguen  
tum.

**R**ime sedis quas Græci ῥaya'as uocant, sunt scilicet suræ, quæ in musculo anum claudente, quem sphincterem nominant, aut in circulo, & extrema ani corona fiunt: similes iis quæ in labiis ob Boreæ flatum asperiores accidunt. Ob acrium humorum defluxum: aut inflammationem: aut condylomaturn (quæ nihil aliud sunt nisi eminentiæ seu rugæ quædam reduplicatis ani corpusculis præter naturam insurgentes) extensionem eueniunt. Si ab acribus humoribus fiunt, illi primum omnium purgandi erunt. Si ob condylomata: in eadem purgatione inter initia utendum. Alius denique toto curationis tempore mollicida, cibis humectantibus ac pinguibus, ne aridum sterco coagulationem remoretur. Ex eorum sanè numero sunt malug, spinachie, lac amygdalarum dulcium, ora sorbilla, iura pingua, & iis similia. Ragadibus uero hoc unguentum adhibendum, quod. ℞. Olei rosacei, myrthini. añ. 3. i. thuris, mastiches, lithargyri, sanguinis draconis. añ. 3. i. aloës, plumbi usti, cerussæ, balauftiorum, boli armeniacæ. añ. 3. s. cere albe quod satis est, fiat unguentum. Aut tale, quod accipit Olei rosacei. 3. i. s. gallæ, myrrhæ, terræ lemnicæ. añ. 3. i. radice symphyti, aluminis scissilis, plumbi usti. añ. 3. s. oui affati vitellum, cere quod satis est, fiat unguentum. Prædictis unguentis ter die rimas circumungito, lotas prius decocto rosarum, gallarum & sidiorum (sic uocant putamina malorum puniceorum.) Si patientem partem ardor & inflammatio affligit, unguento candido caphurato, illinenda erit.

## De imbecillitate iocinoris. Cap. XVIII.

Causa.

**I**mbecillitas iocinoris ab intemperie ipsa produci-  
tur calida, frigida, humida, uel sicca. Calida in-  
temperies, tum eos qui prius adsunt humores, tum etiam  
tiam



tiam hos qui per uenas mesenterii ad ipsum iecur deferuntur, adassat & comburit. Frigida uero intemperies, pituitosum & crudum humorem, qui iam in ipso continetur, crassum & lentum egregiè; mobilem reddit, eum uero qui ad ipsum deferitur, semicoctum. Ceterum sicca intemperies, sicciores & densiores humores facit. Humida autem, tenuiores & magis aquosos.

Calida igitur intemperie circa iecur existente, colliquationes fiunt, primum quidem humorum, deinde carnis etiam ipsius iocinoris, & euacuatur per uentrem bilis foetens ac crassa, abundèq; colorata. Sitis denique infestat, appetentia deiicitur, urina rufa, pulsus celer est. Vbi uero frigida intemperies affuerit, neque assidue excretiones, neque multæ fiunt. Durat uero passio diutius, & per certos aliquot dies profluit & ipsis uenter maiori copia. cæterum egesta non similem foetorem habent iis quæ per calorem sunt colliquata, neq; colorem etiam neq; consistentiam: sed speciem præ se ferunt sanguinis putrefacti, & in grumos congelati: & si quis diligenter consideret, neq; sanguis niger est, neq; grumus, sed ueluti limus & fex quædam sanguinis crassi, proxime ad atram bilem accedens. Quin plures & discretu iudicatu ue difficiles colores circa huiusmodi passionem in excrementis apparent. Reliqua etiam omnia priorib. contraria erunt. In sicciore autem intemperie, excrementa adhuc sicciora & pauciora uidentur, egriq; magis siccant. In humida uero, humidiora & plura erunt excrementa, sitisq; minus infestabit. In huiusmodi igitur passionib. primus curationis scopus sit, ut intemperiem ad contrarium reducamus. Calidam enim intemperiem semper refrigerare oportet, frigidam uero calefacere, similiterq; humidam resiccare, & siccam humectare. Cæterum omnibus iecorariis medicamentis, tum quæ per os sumuntur, tum quæ forinsecus imponuntur, aliquid ex adstringentib. ammiscere

Sigill.

Curatio.



*Calida in  
temperiei*

scere oportet, quo firmitas ac robur uisceris conseruetur. In calida igitur intemperie quod ad uictus rationem attinet, utendum erit ptisanæ cremore, et aliis cibis mediocriter refrigerantibus, lactucis, intybis, cichorio: sonchis, pane ex aqua. Pullis item gallinæ, perdicibus, auibus montanis, carnib. uitulinis, cum omphacio aut limonibus decoctis. Ex fructibus uescantur passulis, limonibus, et amygdalis dulcibus. Vinum omnino circūciditur, nisi alterā ob causā, nempe uentriculi imbecillitatem, hoc requirant: tunc enim tenue et dilutum aliquod exhibendum. Bibant. autem pro uino succum malorum puniceorum, et syrupū acidum, simplicem, oxy saccharamq; cum decocto hordei, aut intybi domestici. Arcendi autem in summa ab omni cibo et potu melle condito, et admodum calido ac incidente. Per os deniq; quod ad

*Cōfectio*

medicamentorum rationem attinet, sumant saccharum rosaceum, diarhodon abbatis, et diatriasantalī confectiones. Aut confectionem hanc, quæ. R. Specierum diarhodon abbatis, diatriasantalī. añ. 3. i. s. seminum intybi domestici utriusq; rosarum rubearū añ. 3. 2. santalorum alborum, cassuthę, floris iunci odorati. añ. 3. i. passularum. 3. i. sacchari. 3. vi. dissoluti in aquis cassuthę et endiuie, fiat confectio rotunda. Quin et Philonis antidotus semel tantum exhibita, omnem aliquando calidam iecoris intemperiem mirabiliter sanauit. Extrinsecus adhibeantur fomenta ex rosaceo, chamemelino, cotoneoq; oleis parata. Aut absinthium, aut palmule prædictis oleis incoquantur, et in iis lana aut spōgia madefacta, ei loco ubi iecur situm est imponatur. Potest etia; huius unguenti esse usus, quod accipit. Oleorum rosacei, cotoneorum, nymphę. añ. 3. i. santalorum alborum et rubeorum, rosarum rubiarum. añ. 3. i. ramentorum eboris. 3. i. s. seminis intybi domestici utriusq; añ. 3. i. aceti. 3. i. s. caphure gr. 2. cere qd. satis est, fiat unguētū. Epithemata

*Unguentum*

*Epithema*

themata



hemata etiam in hoc affectu non parum conducunt, que in hunc aut similem modum parantur. ℞. Succus intybi domestici latifolii, lactuce, oxalidis, rosarum, nymphæ. añ. 3. iii. succi sempuiui. 3. i. s. acet. 3. i. rosarum rub. santalorum rub. rametorum eboris. añ. 3. i. specierum diarhodō abbatis, diatriasantali. añ. 3. i. s. scaphuræ. 3. s. misce, fiat epithema. Adhibeantur autem, epithemata estate frigida actu, hyeme uero calida. Vbi autem frigida in iecore inteinperies fuerit, calefacientibus, ac robur addentibus. utendum est. Utatur itaque cibus concoctu facilibus et calefacientibus. Exoleribus satureia, hyssopo, fœniculo, oreoseli, abrotono, saluia et similibus. Cibi condiantur aromatis calefacientibus, cinnamomo, gariophyllis, et iis similibus. Vinum bibant tenue, fuluum, et odoriferum. Fugiant esum piscium, fructuum frigidorum, ocium, et quicquid refrigerare iecur potest. Per os sumant hoc decoctum, quod accipit Radicum apii, fœniculi, oreoselini. añ. 3. i. eupatorii (quod agrimoniam hodie uocant) hyssopi, mentæ, absinthii, cichorii, casuthe, origani, calaminthe, asari. añ. M. i. seminum anisi, fœniculi, dauci, cumini, carei. añ. 3. ii. iunci odorati. 3. i. s. mastiches. 3. i. florum chamemeli, rosarum rub. añ. M. i. cinnamomi electi. 3. i. s. Buliant omnia in li. i. s. uini, et aque fontane lib. i. donec tertia pars absumpta fuerit, dein colentur, et colaturæ adiciantur syrupi de eupatorio. 3. iii. syrupi de absinthio. 3. i. misce, fiat potio. In hunc usum conferunt etiam confectioes calefacientes, diacinnamomi nimirum, dianisi, cōserua saluiæ acorum conditum, pimpinellæ radices cōditæ, et huiusmodi. Extrinsecus illinenda olea calida, nempe nardinum, chamemelinum, absinthinum, et similia. Cōfert hoc uti unguento, quod. ℞. Oleorum absinthini, nardini. añ. 3. i. s. succi eupatorii. 3. ii. cinamomi gariophyllorum, ligni, aloës. añ. 3. ii. spice, iunci odorati, mastiches. añ. 3. i. cere quod satis est, fiat unguentum.

Frigida in  
teperie.

Decoctum

Vnguentum.

Potest



**Ceratum.** Potest etiam usus esse eius cerati, quod. ℞. Farinę fœ-  
nigreci, lupinorum. añ. 3. ii. radicis iridis, asari. añ. 3.  
i. eupatorii, absinthij, meliloti, iunci odorati. añ. 3. s.  
gallię moschata. 3. 1. seminum anisi, feniculi. añ. 3. s.  
mastiches. 3. 2. mirrhę, thuris. añ. 3. 1. oleorum masti-  
chini, nardini, rosacei, anethini. 3. 1. cerę & resinę qđ  
satis est, fiat ceratum. Et istius epithematis, quod. ℞.  
**Epithema** se. anisi, fœniculi, ammeos. añ. 3. 1. s. cinnamomi, ga-  
riophyllorum, iunci odorati. añ. 3. 1. Decoquatur in  
lib. 1. s. aquę usq; ad medietatis assumptionē, coles,  
& colaturę adiciatur succorum absinthii, eupatorii  
añ. 3. 2. specierum diacynamomi, diagalange. añ. 3. 1.  
cassutę. 3. 2. aceti. 3. 2. misce, fiat epithema. In humida  
**Humida** autem intemperie uictus ratione desiccate utendum  
**intemperiei.** carnibus nimirum uolucrum assis, uino tenui, & su-  
dore mouētibus, laconico, balneis naturalibus. Pa-  
rum uero bibendum ac comedendum: pisces: quoq;  
in uniuersum omnes, ac fructus quibus humectandi  
uis inest: deuitandi. Per os sumendus syrupus de ab-  
sinthio: dialacę & diacurcumę confectiões. Ex-  
trinsecus etiam quę exiccant citra insignem calorē  
adhibenda: de quibus omnibus infra in Capite de  
Anasarca copiose dicemus. Sicca iecoris intempe-  
**Sicca in** ries haud secus atq; hectica febris curatur: hoc solo  
**temperiei** quod supra monuimus non neglecto: ut semper hu-  
mequantibus medicamentis misceantur: quę robur  
uisceri addere possunt. Et ut rem paucis perstringa-  
mus: in sicca intemperie balnea sufficiunt dulcium  
aquarum: & humectans uictus ratio: de quibus in  
Curatione febris hecticę copiosissime dicemus.  
Ex hoc itaq; loco petenda erunt: quę hic desideran-  
tur. Cæterum inter ea quę à proprietate totius sub-  
stantię: efficacia existunt: optimum est lupinum ie-  
cur: quod sanē diligenter trituz: drachmę unius pō-  
dere cum uino dulci aqua calida diluto præbetur.  
Hoc enim multiplici experimento cognitum: oibus  
iecoris



iecoris intemperiebus comodum existit: utpote proprietate totius substantię hanc efficaciaz habens, nō calefaciendo, aut refrigerando.

## De obstructione iocinoris.

## Cap. XIX.

**I**ocinoris obstructio à flatibus uaporosis et crass- Cause  
 sis, concoctūq; difficilibus fit. Interdum autem et  
 à crassis uiscosisq; humoribus, in finibus uenarū  
 ex sima iocinoris parte enatarum, per quas ex uētre  
 et intestinis alimenti digestio ad iecur contingit.  
 Porro quūq; uaporosi et crassi flatūs multitudo coa- Signa  
 ceruatur, quę exitum non habet, atq; adeo obstru-  
 ctionem efficit, non grauitatis circa dextrum hypo-  
 chondrium solum, sed et distentionis sensus obori-  
 tur. Obstructionem uero à crassis uiscidisq; humo-  
 ribus consequitur grauitatis cum dolore sensus, ali-  
 quando quidem obtuse, aliquando uero uehemen-  
 tis: et quandoq; quidem absq; febre, quandoq; cū fe-  
 bre. Crassa enim et uiscosa ac multa, oīno amplius  
 reliquis obstruunt, et maximē quādo egri à cibo ue-  
 hementiori motu utuntur. Si uero acria sint et mul-  
 ta quę in cibo sumuntur, dolor ex obstructione ue-  
 hementior fit, quum obturata corpora simul et ten- Vitus  
 sionem perferant, simulq; pungantur. Cibi his dan-  
 di sunt calidiores, et qui aperiendi obstructiones fa-  
 cultatem habent: nempe pōrrum ex oxymelite, aspa-  
 ragum, fœniculum, oreoselinum, cappares, reliquaq;  
 obsonia ex condimento aliquo calefaciente, qđq;  
 obstructiones auferat, incocta. Vitanda sunt alimē-  
 ta crassi succi, balnea, et exercitia à cibo. Vinouatur  
 tenui, ac ueteri. Curatio  
 Ultra uictus rationem attenuan-  
 tium quoq; et obstructionem tollentium medicamē-  
 torum quā celerrimus requiritur usus: obstructio  
 enim inueterata non tantum in iocinore, sed in om-  
 ni corporis parte putrefactionem operat, febremq;  
 accendit. Pręclare aut et citra molestiā ab obstructio-  
 ne le-



**Simplicia** ne leuant inter simplicia medicamenta, lupi iecur,  
**obstructio** fumaria, eupatorium, chamæmelum, acori radix, dra-  
**gem tole-** cunculi radix, asarum, anisum, apium, absinthii, ca-  
**gentia.** sia, iris, glycyrrhiza, rha ponticū uerum, lupini, cap-  
pares, ammi cassutha, oreoselinum, pistacia, amygda-  
læ amaræ, spica nardi, stœchas, gentiana, plantaginis  
radix, semen, et folia sicca, anagallidis foeminæ suc-  
cus, cichorium, halicacabum, intyba utraqz, aspara-  
gus, et ruscus. Ex iis uaria componi medicamēta pos-  
sunt: potissimum uero decocta: adiectis oxymelite  
simplici: scyllitico: syrupo acido composito: de ab-  
sinthio: hyssopo, calamitha: marrubio: et similibus.  
In hunc usum exhibendū etiam pastilli de eupatorio:  
de absinthio: de rhabarbaro: et similes. Conferunt  
etiam confectiones dialacæ et diacurcumæ. Inter cæ-  
tera autem non solum iucundum: uerum etiam utile  
est: ut pistacia decem aut duodecim per noctem in ui-  
no Aruifio (quod corrupta uoce malmasinum ho-  
die uocant) macerata, in aurora coctione iam facta  
sumantur. Extrinsecus etiam admouenda epithema-  
ta, unguenta: emplastra et cerata: quæ in Ca. superio-  
re de Curatione frigida intemperiei iecoris dicta sunt.  
Hæc medicamenta sufficient, si malum non inuetera-  
tum fuerit. Si enim in uetustatem incidat, uenæ etiā  
sectio: et purgatio: si nihil prohibet: adhibenda erūt.  
In hunc usum exhibenda catapotia de rhabarbaro,  
de agarico, et similia medicamenta, quæ crassos et len-  
tos humores per aluum purgare possunt. Vacuato  
iam corpore, ea quæ supra comprehensa sunt propi-  
nanda medicamenta erunt. hoc autem potissimum  
**Ecligma.** ecligma, quod accipit R radice iridis, radice chamæ-  
pityos, seminū fœniculi, anisi apii, añ. 3. ii. asari. 3. ii. s.  
cinnamomi, zingiberis, catei, chamæmeli añ. 3. j. stœ-  
chadis, gentianæ, marrubii añ. 3. ii. cū oxymelite scy-  
llitico quod satis est, fiat ecligma. Hoc mirificè ob-  
structiones, non solum eas quæ in cauo, uerū etiam  
quæ



quæ in gibbo iocinoris herent, quandoquidem per urinas uehementer expurget, tollit.

## De inflammatione iocinoris. Cap. XX.

**I**N iocinore perinde atq3 in aliis uisceribus, ob easdemq; causas, fit inflammatio. Inflammato autē iocinore omnib. quidem ex quo in dextro hypocondrio dolor & grauitas est, qui suprā ad iugulū usq3, infrā autem ad spurias costas peruenit. Tumor quoque dextri hypocondrii consequitur. Huic dolori accedit febris acuta, tussis exigua & sicca, fitis in exhausta, cibi fastidium difficultas spiritus. Lingua primò rubicunda apparet, postea nigra: bilem uomunt puram, atq3 etiam uitellinam, post autem & cruginosam. aluus adstringitur, color corporis subuertitur in arquati morbi speciem permutatus, singultus quoq3 consequitur. Accessionis etiam tempore quidam delirio apprehenduntur, & acré urinam excernunt. Quando uero priuatim caua iocinoris inflammationem patiuntur, nausea, uomitus, cibi fastidium, & ardor ac fitis intenduntur. Si uero gibba ipsius inflammatio exercet præter alia superius commemorata, tumor manifestus quoque in superficie oculis & tactui conspicuus est. Hæc quidem uehementem grandemq; inflammationem testantur. Si obscura quædam fuerit, iubebimus ægro magnam edat respirationem. Et si dextrum hypocondrium dolere asserat, moderata iecoris inflammatio censetur. Quod si iuxta situm incumbētium iecori musculorum oblōgus inflammationi tumor appareat, prædictorum nullo presente, illos ipsos inflammatione laborare agnoscemus. Porro iecore inflammato, sanguinis detractionem experiri oportet, si nihil id fieri impediat. Incidenda autem in dextro cubito uena interna, ita ut substratam arteriam obseruemus: quæ si non appareat, media; si uero neq3 ipsa ap-

Causa.

Signa

Curatio.

L ii pareat,



pareat: superior. Copiosus autem, & quantum satis est si uires ferre queant, educendus. Sanguinis missione facta, post modicum interuallum simplici ac leui clysteri aluus eluenda, maxime si non sponte egerat. Extrinsecus cucurbitę cum scarificatione affigende. Fomentis etiam utendum ex lanis oleo imbutis, cataplasmatibus, ceratis, & epithematis. In quibus adhibendis in summa hoc precipiendum est, ut adstringentia emollientibus semper admisceantur. Fomentum itaq; fiat ex oleo cotoneorum, aut mastichino, aut rosaceo, aut myrthino, adiecto uino odorifero. Aut adhibeatur spongia madefacta in decocto absinthii, meliloti, rosarum rubearum, chamemeli, plantaginis intybi domestici (quam endiuia uocant) & similia. Cataplasmata uero, & emplastra ex semine lini & fœni gręci, farina hordeacea, malis cotoneis, meliloti flore, absinthio, & similibus, in hunc modum componenda sunt. R. Farinę hordeaceę. ʒ. s. carnis cotoneorum contusę. ʒ. iii. absinthii, florum meliloti, iunci odorati. añ. ʒ. ii. seminis lini. ʒ. i. oleorum rosacei, cotoneorum, chamemelini, absinthii añ. ʒ. s. acetii. ʒ. i. misce, fiat emplastrum. Cerata sic confici possunt. R. Carnis palmularum. ʒ. iii. myrrhę in uino ueteri adstringente maceratę, styracis, mastiches. añ. ʒ. ii. florum meliloti, comę absinthii, chamemeli añ. ʒ. i. s. croci. ʒ. s. oleorum cotoneorũ, mastichini, rosacei. añ. ʒ. i. cere & resinę quod satis est, fiat ceratum. In hunc usum etiam epithemata ex decocto herbarum suprā nominatarum, aut succis rosarum, plantaginis, absinthii, chamemeli, & similibus componi possunt. In quibus omnibus componendis unicę studendum, ut adstringentia ubi uehemens adhuc est inflammatio, relaxantibus & emollientibus pręualeant. contra uero remittente uehementi calore, emollientia adstringentibus. Cauendum pręterea, ne prędicta actu frigida admoveantur, sed prius modicę calefacta. Porro in

Fomentum

Emplastrum

Ceratum

Nihil actu  
frigidum



rd in inflammatione iecoris ubi magni circumstant  
dolores etiam medicamenta dolorem leuantia in po  
tu sunt exhibenda: ita tamen, ut assiduus eorū usus  
deuitetur. Simplicibus autem potionibus frequen  
tius utendum. Senecionis itaq; decoctum tanquam  
maximè commodum, aut succus glycyrrhizę cum a  
qua calida exhibendus. His non minus confert in  
tyborum succus, adiecto modico melle. Ad hoc enī  
quod refrigerat, ac firmitatem uisceri addit, etiā ora  
uenarum iecoris expurgat. Ceterum aluus etiam ir  
ritanda est, urticę uel mercurialis coctorum esu. In  
declinatione etiam morbi aluus per clysteres inaniri  
postulat. In quem usum polypodium & epithymium  
ex mulla porriguntur. Idq; potissimum, si in cauo ui  
sceris fuerit inflammatio. Caua enim iecoris per al  
uum, gibba uero per urinas expurganda sunt. Por  
rd in iecoris inflammatione, exquisitissimo uictu,  
Galeno. lib. 13. Ther. meth. monitore, est opus. Poscit  
autem iecur ipsum cibos, qui obstructa recludant.  
Talia uero omnia sunt tenui consistentia, & quę ci  
tra ro sionem detergunt: cuiusmodi est ptisana, mul  
sa Alimentum igitur optimum est, sic patientibus,  
cremor ptisanę, in quo apium decoctum sit. Ius etiā  
pulli gallinacei, in quo oreoselinum decoctum sit,  
dari potest. Bibat mulsam, aut decoctum hordei, uel  
intyborum domesticorum. Cæterum si inflamma  
tio, principium permutationis ad suppurationem iā  
suscepit, tum omnia prædicta augebuntur, dolores  
nimirum, febres, delirium, anxietas, cibiq; fastidium.  
Adiuuare igitur permutationē ac puris eruptionem  
oportet, ut quā celerime fiat, ne maiora inde cor  
pora corrumpantur, per usum uidelicet istius cataplas  
matis qđ R. Radicis altheę. 3. i. s. seminis fœnigræci,  
lini. añ. 3. i. i. foliorū altheę malug. añ. M. ii. caricarum  
numero. vi. Buliāt in aqua donec mollescant, dein  
cōtūdantur, & fiat cataplasma. Neq; uero inconueni

iecore in  
flammati  
ne laborā  
te adhibe  
dum.

Viſus.

Si inflama  
tio ad  
suppurati  
onem  
tendat.  
Maturatio  
lis.  
Cataplas  
ma.  
Empar  
strum

L Iii enter



enter etiam emplastra, quæ puris permutacionem iu-  
uare possunt, adhibentur: quale est quod. R. Farinæ  
hordeaceæ, farinæ fœnigræci. añ. 3. iiii. radicis althææ. 3.  
iii. s. radicis liliorum alborum. 3. i. s. seminis lini. 3. i.  
floruz chamemeli, meliloti. añ. p. i. Buliant oia in aq̃  
donec ad mellis crassitudinē perueniant. deinde ad-  
de olei chamemelini. 3. i. olei liliacei. 3. i. s. ⁊ buliant  
iterum, fiatq̃; emplastrum. Ex prædictis possunt fieri  
cerata adiectis butyro, iadano, resina, ⁊ cera. Quum  
autem perfecta suppuratio fuerit, dolores remittent,  
omnesq̃; accessiones mitiores apparebunt. Ceterum  
rupturæ tempore dolor rursus magis augetur: qua-  
re etiam tunc rupturam adiuuare oportet, per sterco-  
ris caprini ⁊ colubini, seminis urticæ, sinapi, aliorūq̃;  
ad superficiem attrahentium usum: ⁊ per potiones  
calorificas, ut est decoctū polii, fumarizæ, radicis cha-  
medryos, ⁊ thlaspeos. Facta ruptioe, aqua mellis, aut  
ciceris decoctum, aliaq̃; quibus abstergerendi facultas  
inest, quæ infra in Capite de Renum exulceratione  
commemorabuntur, propinanda. Et si puris trans-  
missio per uenas fit, urinam mouentia admiscenda  
sunt. Sin per aluum, ea quæ leniter subducunt, serum  
nimirum caprinum, tamarindi, casiaq̃; fistularis exhi-  
benda. Dein facta absterfione, quæ conglutinare pos-  
sunt propinanda.

Abstergen-  
tia.

#### De ictero.

#### Cap. XXI.

Icterus.

Causæ.

**I**cterus est bilis, modo flaue, modo atre, per uniuersum corpus effusio. Latine regium, ⁊ arquata passio-  
nem uocant. Celsus etiam auriginem appellat. Harum omnium appellationum causas alibi expli-  
cauimus. Fit iuterdu iecore nihil patiente bilis ef-  
fusio ad cutem in morborum iudicationib. Nonnu-  
quam ubi citra febrem sanguis ab extranea aliqua oc-  
casionē corrumpitur, ac biliosus efficitur, sicut à ue-  
nenaturū bestiarum morsibus contingere cōsuevit.

Quin



Quin & fieri potest propter inflammationem, aut naturalis tēperiei iocinoris aut lienis permutationem. Fit etiam aliquando ob imbecillitatem uesicę bilis susceptricis, quę biliosum humorē, ueluti consuevit in seie ex iocinore non attrahit, & ob id impurū sanguinem relinquit. Aliquando autem propter obstructionem, aut debilitatem uasorum, quorū ora ex ea ad iecur deferuntur, biliosum humorem non attrahit, atq; adeo icteron efficit. Interdum etia; fit ppter meatus, qui ad intestina uadit, obstructionem. Quare ad icteri causas probē discernendas, excrementorum figura & color necessario considerantur, quum in aliquibus multum colorata per flauam bilem appareant, quemadmodum etiam in aliis urinq. In quibus enim ratione iudicationis bonę in febribus biliosus humor ad cutem prorumpit, iis & excrementa, & urinq. naturali modo se habere uidebuntur. Si autem cum febris & biliosis deiectionibus inuadat, & in dextro hypochondrio grauitas adsit, feruens iecoris inflammatio significatur, cuius ui sanguis in bilē mutatus, per uniuersum corpus deferitur. Sin feruor citra grauitatem in ipso substat, ex sola calida iecoris intemperie uitius gignitur. Quibus uero citra febre una cum grauitatis alicuius sensu circa dextrū hypochondrion alba excrementa deiciuntur, in his uesicę bilis susceptricis meatuum obstructionez esse factam putandum est. Si uero citra grauitatem talia deiciantur, uires esse infirmas, aut attractricem quę ex iecore attrahit, aut eam quę ad intestina propellit existimandum est. Statim iis etia; urinq. biliosissime affatim excernuntur. Porro in quibus atq; bilis humor una cum sanguine ad cutem est delatus, hi omnino grauius patiuntur. Consequitur eniz ipsos tristitia preter rationem, & mordacitas eorum quę circa uentrem sunt, difficultasq; spirandi, & cibos auersantur, & nigras urinas excernūt. Stercora uero chaf

signa

L iiii cantū



canti colorem referunt, & alius iis magis resiccatur. Ceterum eos qui ex pallida bile regium morbum contrahunt, nulla mordacitas eorum quæ circa uentrem sunt consequitur, neque etiam in tantum auersantur cibos. stercora alba egeruntur, urinae autem crocei coloris, turbatae tamen permanent. Communiter autem omnibus ictericis pigricies ad motum accidit, & ad dulces cibos animum habent alienatum. Pruritus etiam uniuersi corporis comitatur. Alba oculorum, & partes faciei temporibus propinque, itemque male pallorum ostendunt. Venæ etiam sub lingua replete reperiuntur, & abundantem humorem significant. Icterici igitur, qui ratione bonæ iudicationis febribus perfecte solutis sunt facillime curantur, si lauacris aquarum dulcium utantur, ac olei discussorii perfrictioe, omnibusque quæ cutem rarefacere possunt; qualia sunt, oleum chamemelinum, anethinum, irinum, & similia. Victus quoque rationem uniuersam in iis humectiorem constituere oportet, & ut humorum crassitudinem attenuare possit. Qui ex uirulentorum animalium moribus ictero corripuntur, curandi ferè, sunt sicut ii, qui à rabido cane morfi sunt, de quibus suo loco diximus. His qui ob calidam iecoris intemperiem, aut inflammationem arquati sunt, curatio superius comprehensam, ubi de iecore agebatur, ad mouenda erit, eamque integram in hoc Capite transferre oportet, ne eadem nobis sint sepius repetenda. At si propter obstructionem uesicæ fellis susceptricis fiat icteros, tum duo maxima remedia principatim obtinent, sectio uenæ, & purgatio. In quibus igitur multitudo sanguinis una cum bile in toto corpore abundat, & quos circa iecur aut lienem grauitas aut distensio infestat, in iis nihil uenæ sectione commodius fieri potest, si nulla alia re id facere prepediaris. Secunda uero est uena in dextro cubito interna iecore patiente, liene autem in sinistro, sanguisque particu-

latini

Curatio.  
Si ratione  
iudicationis  
bonæ  
accidat.

Si ex mor-  
su uirulen-  
torum.  
Si ob intem-  
periem aut  
inflammationem  
iecoris.  
Si ab ob-  
structione.

Vena sec-  
tio.



latim et per uices est detrahendus, ne per coaceruatā euacuationem uires egri prosternantur. Neque uero ineptē clyster adhibetur, si à uenę sectione excludimur. A uenę autem incisione etiam non incommode clyster iniicitur, qui propter stercoreum euacuationem spirandi facilitatem inducit, intestinaq; irritando ac mordendo, humores ad cutis superficiem delatos, ad ipsa retrahit et reuellit. Sit uero talis, aut huic similis. ℞. Intybi utriusq; marrubii, eupatorii, adianthi, origani, absinthii. añ. M. i. seminū anisi, fœniculi, oreoselini, asparagi. añ. ʒ. ii. s. radicū glycyrrhizę, apii, fœniculi. añ. ʒ. i. Buliāt in aqua sufficiēti. dein colature. ℞. ʒ. xiii. Casię fistularis. ʒ. i. hierę picrę. ʒ. s. ecligmatis de succo rosarū. ʒ. ii. oleorū anethini, irini. añ. ʒ. i. s. salis. ʒ. i. fiat clyster. Ceterum purgationes huic morbo magis proprię et familiares sunt, sic tamen ut eduliis et potionib. iteq; medicamentis humores prius attenuentur. Cibus itaq; utendum cōcoctu facilibus et extenuantib. uolucris montanis, piscibus saxatilibus, oleribus quę urinā cient præsertim intybis, asparagis, smyrnio, fœniculo, et similibus. Carnes ferinę mansuetis magis sunt aptę. Pro liquamine seu embammate ualet acetum, in quo aristolochia macerata sit. A fructibus abstinendum. Bellaria sint amygdalę sed modicę sumantur: et cicer, modicę torrefactum. Eius etiam decoctum assidue potatū, non parum confert. Vinū cōuenit albū et tenue, non ualde uetustum. Quod ad medicamenta ipsa attinet, sumenda sunt quę in Cap. de Obstructione iecoris, et in Lib. primo de Extenuandis pituitosis humoribus Cap. 8. dicta sunt. Potissimum uero apii, adianthi, calaminthes, uerbenacę rectę, rubię radicis, aristolochię, serpilli, hypericiq; decoctum. Extenuatis iam et preparatis humoribus, pharmacum quod flauā bilem purgat exhibendum. Sunt autem purgationes icterici, dādę fortiores; ob uentris enim siccitatem

Clyster.

Viſas

Purgatio.



tatem imbecilliores, inefficacesq; in ipsis cognoscuntur. Quæ autem præ aliis conferunt, est dilutū Rhubarbari lib. i. Cap. 7. descriptū, ac hiera picra, ecligma de succo rosaceo, de psilio, & diaphœnicon. Quod si primo purgante medicamento nihil proficias, rursus ad ea quibus obstructions tollēdi facultas inest reuertendum, & post triduum rursus uiolentius purgandum. Si liene patiente malum oriatur, ad Caput de Melancholia, & Obstructione lienis recurrendū.

*Viscera  
utraq; re  
purgāta*

Postea quæ uiscera repurgant exhibenda sunt medicamenta. In quem usum radix cyclamini trita potatata confert. hæc enim non solum repurgat uiscera, uerumetiam ad bilem in uniuersa cute excludendā per sudorem aptissima. Quare post eius potionē sudoris exclusionem per uelamenta ac concalescentiam in lecto iuuare oportet. Dantur ex ea drachmæ dug, aut tres, ex aqua mulsa. Preclarè quoque facit corticis raphani succus, uino meraco dulci pmixtus aut uino mulso, ita ut succi. 3. 2. uini. 3. i. contemperentur. Vermes etiam terreni exiccati ex uino mulso per triduum dati ieterum per lotium eicient. Itē casturhe succus mirifice etiam prodest. Ceterum medicamenta quæ in potu accipiuntur omnia, si fieri potest, in balneo exhibeantur, ubi nimirum egri in solium calidum conscenderint. Plurimum quoq; digeste uirium refocillatrici hoc tempore intentū esse oꝝ, per quam facultas excretrix reparetur, & si qua pars læsa sit corroboretur, ac presens coloris corruptio repurgetur. Quapropter conueniunt exercitia, gestationes, inunctiones ac exudationes. In hunc usum pyriateria conferunt, in quib. oleum, in quo serpillum aut rosmarinus herba decocta sit, corpori illinendū. Quod si uero quippiam ex ietero circa faciez & oculos relinquatur, urinq; auresq; appareant purg, aliusq; consueti more egerat, narium infusis utendum. In quem

*Vitiatus  
color ocu  
lorum &  
faciei ut  
amouēdus*



quem usum cyclamini succus, item nigella cum acetum, anagallidis & betæ succus infunditur. Acetum est acerrimum naribus attrahat eger in folio desidens, contineat que pressis naribus paulisper, & mirifice uacuabitur.

## De aqua inter cutem.

## Cap. XXII.

**H**Ydropis seu aque inter cutē tres sunt species. Alia enim ασκίτης, alia τυμπανίτης, & tertia αναστάσις. Ascites est, quum inter membranam peritonæum appellatam, & intestina plurimus aquosus humor coaceruatur. sic dicta, quod ασκίς, id est utri modo membrana ipsa repleta esse uideatur. Tympanites est, ubi flatus ac spiritus superfluous plurimus in iisdem uentris locis congregatur. Anasitis est, ubi per uniuersam corporis molem humor diffeminatur, ut instar spongiarum aut papyri uniuersa caro permeada facta appareat. Fit hydrops, ob insignem iecoris frigiditytatem, aut ob alias partes uehementer refrigeratas, quæ iecur in eundem affectum deducere ualent. Coafficitur autem iecur lieni refrigerato, aluoque & intestinis, maximè iis quæ iuxta ieiunum intestinum sunt, pulmonique & renibus, ac septo transuerso. Contingit etiam ex immodica hemorrhoidum euacuatione, aut ex fluxu menstruorum, aut eorundem retentione, aut ab alia quadam magna uteri affectione, duritiæ nimirum, aut simili. Multi autem & a podagra & coxendicum dolore uexati, aquam inter cutem incidunt. Frequentissime autem eos qui malo corporis habitu præditi sunt, item ab ictero infestatos, hydrops consequitur, celiacam item affectionem & dysenteriam. Communiter omnis hydrops spirandi difficultatem, & tumorem, & grauitatem, & uitiatum colorem inducit, ex uirore nimium

Aque inter  
cutē tres  
species.  
ασκίτης

Τυμπανίτης.  
αναστάσις  
κκ.

Causæ.

Signa.

Signa.

rum



Curatio.

tuo simile euadit. Curatio à sanguinis detractiōe  
auspicāda, maximè si passionis origo ex hemorrhoi-  
dibus aut menstribus suppressis est, et uirtus atq; ætas  
permiserint. Hac enim ratione plenitudo quæ infe-  
stat exhauritur, et languentis natura exonerata ala-  
crior fit, et mali causa minuitur, et deinde necessario  
minore negotio redit sanitas. Prauis humorib. per-  
uenæ sectionem detractis, ad purgantium medicamē-  
tū præsidia deueniendum. Quod si tamen extenua-  
tione ac humorum ad expulsionem præparatione o-  
pus sit, decocta et alia quæ suprà in Capitib. de Ieco-  
ris imbecillitate et obstructione dicta sunt, exhibean-  
tur. In quem etiam usum syrupi de absinthio, de in-  
tybo (quam endiuia nominant) de eupatorio, et by-

Purgatio.

zanthiis barbaris dictus, exhibendi. Purgantia ue-  
ro medicamenta simplicia sint R habarbarum, et aga-  
ricus. Composita uero, catapotia de rhabarbaro, de  
hiera simplici, de agarico, et similia. Conuenit etiam  
inter initia hiera picra, quod hæc obstructiones la-  
xet, et uisceribus robur addat. Quapropter cauendū,  
ne ualida, quæq; nullum iecori robur adiiciunt me-  
dicamenta exhibeamus. Infestans humor sensim et  
paulatim per purgantia medicamenta uacuandus.  
Semel enim et confertim euacuantes, mirificè ui-  
res deicimus, iecurq; refrigeramus. Singulis itaq; se-  
ptimanis aluus subducenda, semperq; à mitiorib. ad  
aliquantulum ualentiora transeundum. In hunc igi-  
tur usum conueniunt ecligmata diaphanicon, et In-  
di. Pulcherrima etiam purgatio conficitur ex radice  
sambuci in uino decocta. Prodest itidē et ebuli radix:  
eadē namq; sambuco et ebulo uis est. Porro reliquo  
curationis tempore, quo purgantib. medicamentis  
abstinet, exhibenda quæ iecori robur addunt, quorū  
multa suprà de Imbecillitatis eiusdem et Obstructio-  
nis curatione dicta sunt: et quæ urinam mouere pos-  
sunt. In quem usum exhibebimus confectiones dia-  
rhodon

Robur ad-  
dentia iec-  
cori, et uri-  
nam mouen-  
tia.



rhodó.abbatis,aromatici rosacei,dilaccæ,diacurcu  
mæ pastillos de eupatorio,rhaharbaro, & absinthio:  
theriacam item, & similia. Proderit autem unicè hoc  
medicamento uti, quod ꝑ. Specierum diacurcumæ.  
dialaccæ. añ. 3. i. specierū diatriasantalī, diarhodó ab  
batis. añ. 3. s. specierum aromatici rosacei. 3. i. rhabar  
bari selecti. 3. s. seminum intybi domestici latioris,  
melonum, fœniculi. añ. 3. ii. absinthii, chamemeli, cal  
suthæ. añ. 3. i. nucis myristicæ, iunci odorati, spice nar  
di. añ. 3. s. sacchari. 3. i. misce, fiat tragea. Mirificè etiā  
hoc conferet, quod ꝑ. Seminum carei fœniculi, ani  
si. añ. 3. ii. cumini, seminis hyperici. añ. 3. i. seminum  
ammi, petroselini, dauci, smyrnii (leuisticum uocāt)  
añ. 3. s. radicū iridis, asari. añ. 3. i. absinthii. 3. i. gly  
cyrrhizæ. 3. i. sacchari æquale omnibus pondus: mi  
sce, fiat tragia. Animaduertēdū autem, ficciora medi  
camenta magis quā liquida anasarcis competere.  
Ceterum non prætermittēdum, quin extrinsecus ea  
etiam adhibeantur medicamēta, quæ humores defic  
care possunt: qualia sunt cataplasmata, emplastra, &  
unguenta, aliaq; medicamenta resiccandi facultate  
prædita. In quem usum cataplasma ex farina hordea  
cea, fabaceaq; fœnigræco, radice ebuli, baccis lauri, ab  
sinthio & origano in uino decoctis confectum, & to  
ti uentris capacitati impositū conuenit. Itē stercus  
bubulū conuenienter resiccātū, non ineptè cum po  
sca, aut oxymelitē iponitur, infarcta ac superinsper  
sa sulphuris quarta parte. Caseus quoq; recens mul  
tū coaguli habens optimè ad omnes tumentes par  
tes impositus facit. Deniq; stercoris columbini, ster  
coris caprini, bupthalami, & chamemeli, quales par  
tes tuse, in acerrimo aceto & melle coctæ adhibeātur.  
Emplastris etiam utēdum ex fermento, caricis, nitro,  
iride, meliloto, saluia, pulegio, cardamomo. sulphure  
uiuo, baccis lauri, staphysagria, sale, ammoniaco, ma  
stice, thure, abrotono, aristolochia rotūda, fimo colū  
barum

Tragea.

Extrinsecus  
que admo  
uenda  
medicamē  
ta.  
Cataplas  
mata.

Empla  
stra.



Vnguentum.

barum cum oxymelite confectis. Ceterum omnia im-  
pinguantia et resinosa cerata uitanda sunt, ueluti quæ  
inflant, et tumores, eo quod diffilationem impediunt,  
distendant. Tamen debent assidue et crura et manus,  
aliæque tumefactæ partes in sole, aut iuxta ignem hoc  
medicamento inungi, quod. ℞. Vnguenti agrippæ.  
℥.i. pinguedinis suillæ. ℥.i.s. farinarum seminis lini,  
fæniculi, fabaceæ, hordeaceæ. añ. 3. i. s. seminum al-  
theæ, nigellæ, dauci. añ. 3. i. sulphuris uini. 3. iiii. boli ar-  
menicæ. 3. 2. radicis iridis. 3. 2. s. aluminis scissi, thuris.  
añ. 3. i. s. euphorbii. 3. i. oleorum irini, liliorum albo-  
rum, chamæmelini. añ. 3. i. s. cum cera quod satis est, fiat  
unguentum: quo liquefacto, ex eo sepe tumores illi  
nendi. Itaque dictis addantur ea quæ supra in Viætu ra-  
tione sunt exposita.

De ascite. Cap. XXIII.

Signa.

**I**N hac uenter totumque abdo men intumescit, eoque  
concussio talis auditur sonus, qualem uter aqua  
non omnino plenus reddere solet. Reliquæ uero

Viætu.

partes corporis, superiores precipue, minime inflan-  
tur. Viætu ratio in hac aqua inter cutem specie fit  
ex montanis auiculis, et aliis cõcoctu facilibus, et bo-  
num procreantibus succum, haud secus quàm in prio-  
re.

Curatio

Curandi ratio a purgantium medicamentorum  
usu auspicabitur. Quapropter ea medicamenta quæ  
in Cap. præcedente commemorata sunt, egrotanti-  
bus exhibenda. Superat autem omnia reliqua, bras-  
sica marina (quam soldanani et soldanellam hodie  
uocant) in potu assumpta. Hæc enim in euacuanda  
hydropicorum aqua mirificum ostendit effectum,  
adeo ut multi solius eius usu sanitati sint restituti.  
Datur ex ea drachmæ duæ, plus aut minus, iuxta cor-  
porum diuersitatem, in uino, aut sero lactis. Confe-  
runt etiam catapotia de sagapeno, et drachmæ duæ  
aut tres succi radicis iridis, adiecta sacchari uncia

Clysteres

una. Clysteres et adhibendi acres, nisi uenter sua spõ-  
te hu-



te humescat: tunc enim exiccare ipsum magis conue-  
nit. Commendatur autem eiusmodi, qui ꝛ. Florum  
daphnoidis (laureolam uocant.) 3. 2. polypodii, aga-  
rici añ. 3. i. s. cassuthę. 3. iij. decoquantur in uino aut  
aqua ꝛ. Colature. 3. xii. benedictę laxatiuę. 3. s. ec-  
ligmatis Indi 3. 2. s. mellis. 3. i. olei rutacei, chamę-  
melini, irinĩ añ. 3. i. salis gemmę. 3. i. s. misce, fiat enę-  
ma. In eũ etiam usum colocynthis, cartamus seu cñ-  
cus, bacce lauri, semẽ anisi, ammi, ꝛ. carei, ruta, radi-  
cucumeris syluestris, adiectis aliis decoqui possunt.  
Post auxilia prædicta, uentri uniuerso ex præscriptis  
cataplasmatibus ꝛ. emplastris q̄daz imponantur. Adhi-  
beantur et inunctiones, exercitia, urinã ꝛ. sudores mo-  
uentia auxilia, de quib. oib. suprã copiosẽ diximus.

## De tympanite. Cap. XXV.

**I**N hoc uitio uenter inflatur, distenditurq̄, ꝛ. con-  
cussus tympani sonitũ edit: reliquę uero corpis  
partes emaciantur. Victus ratione prioribus si-  
milem obtinet. tñ cuz magna ex parte ẽ flatibus oria-  
tur, unice uitanda sunt omnia flatuosa. Aegrotanti  
autẽ multa exercitia, ꝛ. sitis ingens, strenuõ auxilia-  
tur. Curatio aut ipsa à purgantibus medicamentis  
inchoanda. Clysteres et, quib. flatus discutiendi fa-  
cultas inest, infundere opz, qualis est qui ꝛ. Radicũ  
apii, fœniculi añ. 3. i. seminum anisi, fœniculi, dauci,  
smyrniĩ, oreoselini, cumini añ. 3. 2. carei. 3. iij. rute, a-  
sari, foliorum ebuli, meliloti añ. M. i. Buliant in aq̄  
sufficienti, quoad tertia pars absumpta fuerit, Cola-  
ture ꝛ. lib. i. hierę picre, benedictę laxatiuę añ. 3. s. ec-  
ligmatis de baccis lauri. 3. iij. oleorum rutacei, ane-  
thini añ. 3. i. s. salis. 3. i. s. misce, fiat clyster. Danda et  
sic affectis ea quę urinã mouent, ꝛ. iis q̄ flatus discu-  
tere ꝛ. digerere possunt. tum intrinsecus tuz extrinse-  
cus utendũ. Qualia certe multa in Cap. de Coli do-  
lorib. ad qđ recurrendũ erit, dicta sunt. Venter itaq̄

Signa.

Victus.

Curatio.

Clyster.

M indies



**Saccui.** indies panico, milio, sale, furfurib. foliis rutæ, chame-  
meli florib. cinere calido, sacculis infutis, fouendus.

**Ceratum.** Potest etiã hoc adhiberi ceratum, quod ʒ. Floz cha-  
memeli: meliloti añ. 3. i. s. mētaſtri: ſatureiꝑ, aſari añ.  
3. i. ſeminũ anifi, fœniculi: rutę, cumini, dauci. añ. 3.  
i. cardamomi. 3. s. myrrhę, caſtorei. añ. 3. i. oleoz ru-  
tacei. ʒ. iii. anethini. ʒ. i. s. refinę ⁊ cere quod ſatis eſt  
fiat ceratũ. Cucurbitulę præterea leues, cũ multa flā-  
ma, crebro toti uentri ſuffixę, mirifice proſunt. Ven-

**Cōfectio** ter etiam aſpero linteo tantisper dũ robur excitetur  
perfricandus. Intriſecus utendũ cōfectionibus dia-  
niſi, diacumini, ⁊ ex baccis lauri: uel iſta, q̃ ʒ. Spērũ  
dianifi, diacumini añ. 3. i. Speciez eclignatis de bac-  
cis lauri. 3. i. Specierũ diagalange. 3. s. ſeminuz aniſi  
carei, dauci, fœniculi añ. 3. s. foliorum rutę, ſe. apii,  
ſmyrni añ. 3. i. ſacchari. ʒ. vi. diſſoluti in ſuccis fœ-  
niculi ⁊ apii, fiat cōfectio in morſulis. Quę hic deſi-  
derantur alia, pete ex Cap. de Coli doloribus.

## De intemperie lienis.

## Cap. XXVI.

**Cauſa.**

**Q**uemadmodũ reliquę corporis partes octo  
intemperierum generibus affliguntur, ita ⁊  
lien. Veruz frequentiffime frigida ⁊ humi-  
dam iuſtinet intemperiem. Singularum autem cau-  
ſas non eſt cur referamus. eędem enim ſunt, quę alia-  
rum partium corporis. Petendę itaqz ex Lib. Galeni  
de Morborum cauſ. Cap. primo, ſecundo ⁊ tertio.

**Signa in-**

**temperiei**

**huĩdę qua**

**litatis.**

**Frigidę.**

**Calidę.**

Signum autem certum ⁊ compendioſuz intemperiei  
in liene, ea quę eduntur ac bibuntur exhibeant, ⁊ q̃  
forinſecus cuticulę iuxta ſiniſtrum hypochondriuz  
accedunt. Si enim frigida intemperies iuxta ipſum  
fuerit oborta, omnis cibus ⁊ potus qui efficaciter re-  
frigerare poteſt, facile ⁊ manifeſte lienem lædit. Om-  
nia etiam frigida extrinſecus admota offendunt,  
atqz adeo frigidam lienis arguunt intemperiem. Eaꝝ  
uero ipſam omnia calida conſolantur. Quod ſi ca-  
lida



lida fuerit lienis intemperies à nullis quæ in cibo aut potu exhibentur, aut etiam extrinsecus accedunt, dolorem perfert. Et si quidem caliditas augeat, non solum nihil tumori apponitur, sed et contractiones amplius sustinet, præsertim si febris adsit. Cæterum et cibi et potus calefacientes, et quæ extrinsecus corpori calorem addunt, calidas etiam intemperies augent et exacerbant. Solatio aut sunt eis omnia refrigerantia. Similiter etiam sicce intemperiei in liene signa colligere oportet, maximè quum pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ extrinsecus corpori adueniunt, atque intra ipsum deuorantur, si exiccandi facultate prædita sunt, lienem exiccant. Porro ubi humida intemperie lien laborauerit, atque ea amplius inualuerit, in tantum eius excrementum facit, ut etiam uentrem ac iecur pertingat. Spēs quoque doloris una cum prædictis signis infestantem intemperiem demonstrabit. In calida enim et frigida intemperie minus dolent, aut nihil omnino, neque quicquid etiam in humida: minimum uero in sicca. Ex prædictis etiam coniecturam facere licet compositarum in liene intemperierum. ferè enim in totum ubi calida intemperies fuerit intensa, sicca eam consequitur, et ad frigidam inueteratam humida concomitatur. Quandoquidem uero et humores in lienem confluentes tumores producant, eorum quoque diligentem considerationem facere oportet, quales nam sint tandem, ex his quæ iam dicuntur. Bilioso enim fluore existente, uniuersum corpus calidius apparebit, etiam si non adsit febris, oculique et urinæ per bilem coloratæ. Siccitatem semper accusabit eger, et de siti conqueretur, ac bili os infestante. Cibum fastidit, et uigiliis infestatur, frigidamque desiderat, una cum hoc quod linguam subflauam habet. Si uero atre bilis sit fluor, color tum in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit, et appetentia aderit ciborum, moesti que ac subtri-

Sicce.

Humide.

Signa in  
temperiei  
cum fluore  
re substantiæ  
Biliose.

Atre bilis.

M ii ftes



**Pituitosus** et **stes ægri** sunt. Aut uero ubi pituitosus humor in lienem deferatur, consimilis pituitosis aderit color, ægriq; minime sitient, et cibū appetent, nisi salsa fuerit pituita; tunc enim cibum fastidiunt ægri, potusq; magis sunt appetentes. Quin urine quoq; pituitosæ sunt, ipsiq; ægri secundum mores pigri sunt et segnes.

**Sanguinea** **neq;** **Quidam** uero ex eis qui frigidam affectionē habēt, magnum et durum lienem acquirunt. Quod si sanguineus existat in lienem confluens humor, possibile est ipsum colorem tum iuxta linguā, tum circa cutem permutari. Inter appetentiam aut ciborum et fastidiū, medio quodam modo habent ægri, reliquisq; magis languent, etiā si non parem uisceris tumorem habeant. Venæ uero uniuersi corporis, sanguine plene apparent, et urine subfulxæ. Hæc signa fusius ex Aëtio narrauimus, quod nimirū communia sint, et omnibus reliquarum partium corporis intemperiebus adaptari queant. In uniuersum quidem lienis intemperies nude qualitatis ferè citra tumorem sunt. Eas itaq; tum per cibos ac potus, tum per simplicissima medicamenta, ac fomentum irrigationes, quæ intemperiei contraria sunt, corrigere oportet. Calidam igitur curabis, sicut iecoris, per cibos ac potus frigidos, inunctiones ex rosaceo et melino, atq; per alia quæ Cap. 18. huius Libri sunt dicta. Frigidam lienis intemperiem haud secus atq; iecoris, per ea quæ moderata calefaciendi uis prædita existunt. In humida lienis intemperie, præter ea quæ Cap. paulo antè citato commemorata sunt, proderit quinquefolii radix, plantago sicca, spuma et flos salis, ammoniacum, succus salicis, et similia, si ex iis affuso sufficenti aceto unguentum aut ceratum conficiatur, qualia paulo post describemus. Cōuenientissime etiam huic sunt frictiones, quæ discutiendi facultatē obtinet. Siccam lienis intemperiem balneum dulcium et calidarum aquarum, curat; inunctio item ex oleo dulci. cibi citra

tra.



tra refrigerationem humectantes, uelut est ptisanæ succus. Porro si intemperie cū substantiæ fluore liē afficitur, tum ubi sanguinea fuerit, ex uena cubiti interna sinistri brachii (quam lienarem uocant) sanguis mittendus erit. Aut si ea inueniri haud possit, ex ea quæ inter annularem & auricularem uocatos digito sita est. Dein adhibenda intrinsecus & extrinsecus quæ lienī robur adiciere possunt medicamenta, qualia sunt cortex radicis capparis, scolopēdriū, hæmionitis, ammoniacum, scylla, tamarix, absinthium, adianthos, iris, calamintha, & similia, quæ iecoris quoq; firmitatem & robur conseruare ualēt. De quibus omnibus copiosius in Cap. de Lienis inflammatione dicemus. Si reliquorū humorum substantiæ cōfluxerint, primum redundans humor purganti medicamento uacuandus erit: dein reliquo tēpore quæ intemperiem relictam corrigere, & lienem etiam corroborare possunt, adhibenda.

Curatio  
intemperie  
cum fluo  
re substā  
tiæ.

Lienē cor  
roboran  
tia.

## De lienis inflammatione. Cap. XXVII.

**L**ien ut reliquæ corporis partes inflammatione corripitur, quoties sanguis præter naturam ad eum confluit. Cognoscitur grauitate & tumore sinistri hypochondrii, qui ad tactum non cedit, dolore & distensione loci, febre, & estu. Irruentis uero humoris copia, ex magnitudine & uelocitate generationis ipsius inflammationis. Viētus ratio eorum qui inflammatione lienis laborant simplex sit, eaq; quæ facile concoquantur, in cibo exhibeantur, uelut est alica lota, ptisanæ succus, panis madefactus, & eiusmodi. Si uero inflammatio diutius remoretur, etiam auicularum carnes eis concedendæ, & pisces petrosi aquis degentes. Bibat eger decoctum cinna momi, aut uinum aquosum. Curatio ipsa à uenæ lienaris, aut eius quæ inter minorem & annularem digitum est, incisione auspicietur, si nihil sit quod eam

Causa.

Signa.

Viētus.

Curatio  
Venæ  
liē.

M iiii fieri



*Quæ im-  
ponenda  
lien?*

*Fomenta.*

*Cataplas-  
ma.*

*Curatio  
lien: in-  
durati.*

fieri uetet. Venter etiam per clysterem assidue elua-  
tur, potissimum si uene incidendę medela relinqua-  
tur. Deinde imponentur lienī medicamenta adstringen-  
gentia, quę id quod influit reprimere, et lienis firmi-  
tatem conseruare possunt. Non sunt uero sola ad-  
stringentia adhibenda, sed admiscenda erunt ea quę  
citra euidentem calorem extenuant, secant, atque re-  
laxant, ne scilicet crassus in eo succus obturatus ue-  
hementius incrassescat, quemadmodũ Galenus lib.  
13. Ther. meth. diligenter monuit. Itaq; si moderata  
fuerit inflammatio lienis, uinum uetus ac austerum  
tenuiumq; partiũ oleo dulci permixtum, et lana suc-  
cida exceptum imponemus. Si uero maior sit calidi-  
tas, rosaceum sit oleum, aut melinum, et chamæmeli-  
num cū aceto. Verbi gratia ℞. Olei rosacei, cotone-  
orũ an. ʒ. ii. olei chamæmelini. ʒ. i. aceti optimi. ʒ. ʒ. s.  
misce. Quod si olea prædicta non adsint, folia rubi,  
aut mala cotonea in oleo decoquantur, et quædam  
etiam tenuium partium addantur, uelut est absin-  
thium et pulegium. Cauendum etiam, ne actu frigida  
lienī imponamus, ea quę extrinsecus admouentur  
medicamenta. Post irrigationes ac fomenta ad cata-  
plasmata, in quorum compositionem hordeacea fa-  
rina, et loliacea, caricas, et lini semen assumantur. Cæ-  
terum cauendum ne post irrigationes et ea cataplas-  
mata locus denudetur: sed ubi hæc fuerint sublata,  
mox emplastrum aut ceratum, qualia in Cap. de le-  
coris inflammatione descripsimus, imponatur. Si  
quidem similia genere medicamenta, ambo uiscera  
postulāt: tanto autem ualentiora lienis sint, quanto  
crassiore utitur alimento. Quare ex iis quę de ioci-  
nore diximus, ad lienis curationem exempla trans-  
sumes: quibus semper ferè acetum, et quippiam quod  
lienī gratū sit eiusq; robur peculiariter tueri possit,  
adiicias. Verum ubi inflammatio in scirrhum degene-  
rat, non solū extrinsecus, sed etiam intrinsecus ualē-  
riorib.



tiorib. medicamentis uti conuenit. Intrinsicus itaq; ualidissime potiones (nam eas sine molestia tolerat) exhibendę. Ex quarum numero, primas partes sibi uendicant cortices radicū capparis, hemionitis, myricę radix atq; germina in aceto uel oxymelite cocta. item centaureę minoris succus epotus, & lupinorum amarorum decoctum, cum ruta & pipere assumptum. Anagallidis fœmine scrupulus cum posca, aut oxymelite potus mirifice confert. Extrinsecus fomentum tale adhibeatur, quod ℞. Centaurii minoris, hemionitidis, rutę añ. M. i. radicis corticis capparis. 3. i. Decoquantur in aceto: & postquam decocta fuerint, spongia in decocto irrigata lieni calida imponatur. Vel potest esse huius unguenti usus: quod ℞. Oleorum de capparibus, liliorum alborum, irini añ. 3. i. medullę ossium cruris bubulini. 3. i. s. mucositatis radicis althęę, fœnigręci, se. lini añ. 3. i. pinguedinis tauri, gallinę, anserinę, añ. 3. ii. corticum radicum capparis, tamaricis, costi, centaurii minoris añ. 3. i. ammoniaci, bdellii, chalbanii añ. 3. s. gummi prius in aceto dissolutis, cum cera quod satis est, fiat unguentum. Emplastra denique & cerata multum conferre solēt. Componatur itaq; tale, uel simile, quod ℞. Oleorū liliacei, irini, de capparib. añ. 3. i. farinę hordei, fœnigręci, seminis lini, añ. 3. i. corticū radicis capparis, hemionitidis añ. 3. i. s. radicis althęę. 3. s. bdellii, ammoniaci, galbani añ. 3. i. s. opopanacis, myrrhę, thuris añ. 3. s. cum resina terebinthina & cera quod satis est, fiat ceratū. Ceterum oportet medicū diligenter ad affectū respicere, & pro eius ratione tū addere, tum adimere aut emollientia, aut attenuantia & discutientia, aut quę robur addunt. Victus etiam ratio ubi durities perfecta fuerit, attenuatoria sit. Acrum etiam rerum comestio per interualla, & potus exiguus conuenit. Vinum sit non ualde uetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum sæpe ignitum extinctum sit.

M iiii Con.

Fomentum.

Unguentum.

Ceratum.

Victus.



Conuenientissimum enim lieni indurato remediū  
existit, candens ferrum in aqua, aut uino, aut posca  
subinde extinctum. Plurimum etiam fiducię in exer-  
citationibus ponendum, quibus ante cibum uti con-  
uenit, corpore superuacuis non abundante. Manife-  
stum autem est, quod uociferationes quoq; oportu-  
ne, et in tempore assumptę, eis summę opitulantur.  
Cucurbitulę etiam cum scarificatione affigendę.

De lienis obstructione. Cap. XXVIII.

**A**Ccidit, ut interdū non solum propter attracti-  
cis facultatis imbecillitatem, uerum etiā mea-  
tus, per quem atrę bilis feculētus humor ex ie-  
core ad lienem deriuatur, obstructionem, ut impu-  
rus ac uiciosus humor in totū corpus distribuatur.  
Quod ubi contigerit, color corporis uitiatus ad nī-  
gredinem uergit, et nonnunquam immedicabilia ul-  
cera hoc modo patientes habent. Cause obstructio-  
nis lienis ex iis quę in Cap. de Iecoris obstructione  
dicta sunt innotescunt. Cognoscitur ex grauitate,  
quę est circa dextrum hypocondrium, uitiato cor-  
poris totius, pręsertim uero faciei, colore: spiritus  
difficultate, et aliis quę ex prędictis suprā innotescunt.  
Curatio. Curatur is affectus uictus ratione extenuatoria, et  
medicamentis obstructionem tollentibus, de quibus  
abunde dictum est in Cap. de Iecoris obstructione.  
Vtraq; enim uiscera similibus genere medicamentis  
indigent: lien tamen tanto fortiorib. indiget, quan-  
to crassiore utitur alimento. Quapropter quatenus  
ad humorum crassorum ut uacuationi promptius  
obediant preparationem attinet, iisdem certe medi-  
camentis opus erit: hoc duntaxat obseruato, ut sint  
ualidiora, et commixta habeant quę robur uisceri ad-  
dere queant. Post preparationem uacuandi sunt hu-  
mores per ea medicamenta, quę crassos et feculen-  
tos humores purgare possunt, de quibus iam sæpe  
dictum

Cause.

Signa.

Curatio.

Prepara-  
tio humo-  
rum.



dictum est. Posthæc intrinsecus adhibenda sunt, quæ  
suprà de Iecoris affectibus, potissimum eius obstru-  
ctione cõmemorata sunt. Forinsecus autem unguen-  
ta & cerata, quæ in Capite præcedenti produximus,  
admouenda erunt.

*De renib, cruentam vrinam excernentibus. Cap. XXIX.*

**R**enum fit nonnunq; passio, in qua tenue san-  
guinis serum mingitur. Accidit autem ppter  
renum imbecillitatem, urina nam subinde iecera-  
nere à sanguine nequeuntium. Aut propter amplitu-  
dinem osculorum, ex uena caua urinam ad renes ex-  
colantium. Quum enim ampliores ac patentiores  
meatus fuerint, quiddam etiam ex sanguine uenæ e-  
mittunt, aliq; item crassa. Sæpe renes etiã iuxta cir-  
cuitus quosdam sanguinẽ excernunt, simili modo  
ut ex hæmorrhoidibus in sede fieri consuevit. Quidã  
etiam sanguinem ex renibus excernunt, propter ue-  
næ rupturam in renibus, factam. Veluti cõtigit is  
qui graue onus leuarunt, aut ualde saltarunt, aut ex  
alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale uiolentum,  
ut est exercitium, aut coitus nimius, pertulerunt. Ali-  
quando autem ob acres ex supernis defluentes hu-  
mores, erosio uenarũ contingit. Cæterum si passio  
propter renum imbecillitatem contingat, sanguis  
qui excernitur, seorsus admodũ est. Sin ob osculo-  
rum amplitudinem, tunc nihil dolitant. Si certis cir-  
cuitib, excretio fiat, tum uel plenitudo est totius cor-  
poris, aut consuetorum exercitiorum neglectus, aut  
membrũ cuiusdam, abscissio præcessit. Si propter uenæ  
rupturam, tunc copiosissimẽ sanguis excernitur. Si  
uero ab erosione, tum sensim & paulatim excernitur  
dolorq; renes excruciat. Curabis itaque eam cruen-  
tẽ urinẽ excretionem, quẽ propter renum debilita-  
tem, aut amplitudinem osculorũ urinas ad renes ex-  
colatiũ accidit quietẽ, cibis adstringẽtibus, potione

*Cause*

*Signa*

*Curatio*  
urine crue-  
ntæ ab im-  
becillitate  
renum.

*uini*



et uas o-  
mne etus  
amplitudi-  
ne.

Curatio si  
percutit-  
ur, aut  
propter  
uenæ ru-  
pturā, aut  
erosionem  
accidat.

uini nigri, et aliis quę in Cap. de Cruento sputo cō-  
prehensa sunt. Ab iis autem potissimum quę urinā  
cient, et à coitu omnino abstinendum. In potu autē,  
præter ea quę in Cap. iam citato dicta sunt, exhibē-  
da symphyti radicis decoctum, et tragacantha in ui-  
no nigro macerata. Sistit etiam sanguinis ex renibus  
eruptiones cornu ceruini usti drachma una ex uino.  
Folia item salicis cū uino; lapidis hematitidis drach-  
ma una. Mirificè quoq; confert polygoni decoctū.  
Bolus deniq; Armenia drachmę pondere sumpta, Sy-  
rupus rosaceus, myrthinus, pastilli de succino, de ter-  
ra Lemnia, et de spodio nominati. Cuillum præte-  
rea lac unicè commendatur, si ieiuno .℥.iiii. quibus  
drachma una boli armenię commixta sit, exhibean-  
tur. Forinsecus renibus et lumbis imponatur ea quę  
ad sanguinis per sputum reiectionem, et in Capite de  
Dysenteria, aliisq; sanguinis eruptionibus descripta  
sunt, et quęcunque unā cum eo quod adstringunt et  
resiccant, etiam robur addere possunt, qualia sunt ru-  
bi folia, et quercus. glandes, itemq; myrti baccę,  
malicorium et balauſtia, et similia. Post hæc habi-  
tus corporis cibis, lacte, ac auicularum carnibus,  
suillis etiam mactis reficiendus est, quo uniuersum  
corpus ad pristinas uires reducatur, et renes corro-  
borati proprium munus, obeant et serosum humo-  
rem à sanguine secernant et excolent. Porro si renes  
secundum circuitum sanguinem excernunt, aut pro-  
pter rupturam uenę, aut acres ex supernis defluen-  
tes homores: tunc statim uena quę in cubito est secā-  
da erit. His quidem qui per circuitus sanguinem ex-  
cernunt, paulò antè circuitum, reliquis uero statim  
à principio. Ceterū sanguinis detractionem partiri  
melius erit, ut paulatim eis reuulsio et auersio fiat. Lo-  
ci autem circa renes spongiis posca imbutis coope-  
riantur, aut lanis succidis cum rosaceo et aceto. Post  
hæc emplastra, unguenta, et cerata locis paulò antè  
citatis



citatis descripta, imponenda. Cōmodè etiam cucurbita adhibetur, præsertim si suspicio sit inflammatio nem ad esse in his, qui ob uenę rupturam sanguinem mingunt. Conueniunt etiam potiones suprà, et in Cap. de Sputo cruento commemoratę. Aeger interea etiam à salis et acribus omnibus arcendus. Vbi uero iam sanguinis excretio cessauerit, uictus ratione utendum est, unde non multus sanguis gignatur, maximè in iis qui per circuitū excreuerunt, et superne corporis partes assiduè exercende. In iis autem qui ob uenam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionem curabimus, per ea quę in Capite de Renum exulceratione dicentur.

## De inflammatione renum. Cap. XXX.

**R**enes ob plurimas causas inflammatione corripiuntur. Nam et humores corrupti, et plage, et attritiones, et medicamentorū potiones inflammationem procreant, et præsertim equitationes cōtinuę et uehemētes. Accedit egris dolor pulsatis retro iuxta primam dorsi uertebam, paululum suprà spurias costas. Distendit aut dolor sursum usq; ad iecur, præsertim dextro rene affecto. Deorsum uero usq; ad uesicam et pudendū, lumbosq; et coxendices, per ætinem item et fœmora. Consequitur etiam stupor propinqui cruris, et neq; rectā erigi possunt, neq; pedibus ingredi. Et siue sternutatio, siue aliqua alia cōcussio irruat, uehementi dolore lancinatur. Frigent eorum extrema, et magis iurę ac pedes. Adest urinę emittendę difficultas, minguntq; assiduè ac laboriose, in principio quidem tenuia et aquosa, in quib. nihil subsidet: inflammatione uero in peius proficiente, rubicundiora: deinde etiam crassa et mucosa, adsuntq; febres uehementes. Quod si adhuc amplius inflammatio augescat, hæc omnia sunt uehementiora. His

Causa.

Signa.



ra. His accedit nausea, et stomachi morsus, et uomitus bilis. Quidam autem ipsorum usque ad animi deliquium anguntur et exudant. Siftitur ipsis uenter adeo ut inflentur, et assidue ructus emittant. Sequitur fastidium uehemens: et quibusdam continuè sunt exacerbationes: quibusdam uero per interualla. In uniuersum autem uentris egestio, et urinae multa excretio dolores ipsos precedunt. Aegrum in mollesimo lecto decumbere oportet, ac primo die cibo abstinerere, non tamen in multos dies inediam extendere. Urinae enim acriores per inediam redditae, uehementissimos morsus infligunt. Itaque in principio sortitionibus tenuibus morsus lenientibus nutrire oportet, ut est ptisanæ succus, aut hordei alica. Malua etiam inter holera summè confert. Potus sit decoctum cynamomi. Et in summa uictus ratio sit talis, qualis in aliis inflammationibus. Inter initia, quod ad curandi rationem attinet, sanguis statim detrahendus est. Secunda autem erit quæ in poplite est, secundum rectitudinem renis patientis. Post uenæ sectiones ad ea quæ extrinsecus admouentur procedendum, cataplasmata nimirum, fomenta, linimenta, emplastra, et similia quæ mediocrem refrigerandi ac leniendi uis obinent, ex oleis rosaceo, cotoneorū, chamemelino, farinis hordeacea, fabacea, fœnigræci, et similib. quæ in Capitulo de Inflammationibus iecoris et lienis dicta sunt, composita. Cauendum hoc tempore, ne ea medicamenta quæ urinam cient bibenda dentur, Galeno sic monente lib. 13. Ther. meth. obledunt enim, mordaces humores inflammatis partibus inducendo. Clysteribus autem mollibus, potissimum si uenter nihil deiecerit, utendum: ex maluæ decocto, aut seminis lini et fœnigræci, aut succo ptisanæ confectis, cum oleo uiolaceo, aut chamemelino. Ceterum copia non multa infundatur, ne repleta intestina comprimant renes. Quod si dolor per ea quæ extrinsecus imponuntur non

Vultus.

Curatio

Urinam  
prouocā  
tia non ex  
bibenda.  
Clysteres



non leuabitur, cucurbita lumbis ac iliis est adhibenda, & fissuris impactis plurimus sanguis est attrahendus. deinde iterum spongiarū fotu utendū, & aliis q̄ dolorem leuare possunt. Vbi perfectè iam sedata ac cōsumpta fuerit inflammatio, id quod cognoscitur doloris omnimoda remissione, tunc etiam p̄ urinā prouocantia purgandum erit. à concoctis enim inflammationibus urinę prodeunt multę & crassę, & in iis bonum est quod subsidet, atq; adeo morbum prorsus iudicant. Porro si per prædicta medicamenta affectus nō propellatur, & neq; dolor, neq; febris, neq; grauitas horum usu conquieuerint, urinęq; difficultas ac frequens stillicidium egrum molestauerit, pus hac in parte colligi indicium est. Tunc itaq; quā celerrimè suppurationē, ac puris eruptionem adiuuare oportet. Qua in re spongię aqua & oleo assidue imbutę proderunt, fotus gratia admotę. Eūdem etiam usuz cataplasmata præbent, quę ex farina hordeacea, fursu ribus, ficubus, althea, & similib. supra in Cap. de Iecoris inflammatione dicta sunt, cōstant. In solium quoq; ex emollientibus herbis, malua, althea, chamemelo: lini semine: scænogreco, paratum descendere summè confert. Quod si uero perfecta iam suppuratione (id quod cognoscitur: si febres & dolores minores fuerint: grauitatis autē sensus circa renem affectum remanserit) ruptura moretur: in potu exhibenda quę urinaz ducunt: ut est fœniculi: pulegii: origani, & similib. decoctū. Hęc enī rumpunt interdum suppurationem, & pus per urinā expurgant. Quod si autem usus illorum nihil contulerit, acrioribus clysteribus aluus subluenda erit: uelut est alliorum: raphani syluestris, ac radicis cucumeris syluestris decoctum. Oportet uero admiscere oleuz: quo infusa lubrica reddantur. Hęc itaq; per clysterem infundenda, iubendiq; ægr i quo plurimo tempore apud se detineant. consueuerunt enim

Suppura  
tionis nō  
gna.



Ruptura  
facta in  
dicia.

enim sepe ipsam suppurationem rumpere: una cum hoc quod uentrē emollire solent. Ruptura uero facta: caruncule parue: oblonge, cum urina excernuntur. Et si quidem ulcera fuerint maligna: humores foetidi: liuidi: et mucosi: si uero benigna, pus ipsum albus: et equale, et leue: absque odore graui: excernitur. Quae uero deinceps sint adhibenda medicamenta, in Capite de Renum ulceribus dicemus.

## De calculo renum.

## Cap. XXXI.

Causa.

**R**enum calculis prouecti etatis homines frequentius, quam pueri apprehenduntur. Causae autem generationis horum calculorum existunt, assidue cruditates, unde humoris crassi et terrei multitudo congregatur, et ardor igneus circa renes caliditas, qui humores ad assans: eos cogit: et in lapides indurat: ad modum toforum qui in aquis reperiunt, quae in greis praesertim balneorum uasis coquuntur.

Signa.

Accedit egris grauis in renibus dolor, aculei infixi sensum praebens: tumore tamen nusquam foris apparente. Spina egre flecti potest: crus quod est directo est renis affecti, stupet: ad est fastidium, et uomitus. Urina circa obdurationis principium pauca, aquosa, mingitur. Postea uero perfecta eius suppressio contingit. aliusque nihil excernit: uerum: cupiditates multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando sanguis: propter uiolentiam calculorum. Urina etiam arenosam subsidentiam habet, potissimum ubi lapis ex renibus fuerit emotus. Quas singulas ferè notas Hippocrates etiam iis uerbis complexus est: In renum dolor grauis quando cibo replentur inuadit, pituitamque uomunt. Quum uero dolores intentiores fuerint, eruginosa, atque tum leuiore quidem fiunt. Dolor autem leuantur, quando cibo uacui fuerint. Arenae rufae subsident, cruentaque mingunt. Stupor cruris quod est directo est. Hec ille. Porro leues, et rotundi facile

6. Epid.

Par. 1.

Aph. 5.



cile excernuntur: non item, qui alia quacunq; forma præditi sunt: maxime tamen ob longi & asperi difficulter excernuntur. Ceterum quum lapis in renibus obturatus uehementissimos dolores intulerit, ne scilicet sanguinis multitudo adtensione & dolore affectam particulam procumbat: in corpore plenitudine laborante: & robusto: cōfestim poplitis uena, iuxta Hippocratis loco iam citato consiliū: incidenda erit, eius nimirum cruris quod stupet, & e dire cto renis patientis est. Qui uero uitioso humore seu cacochymia laborant, iis purgatio redundantis humoris conuenit. neq; omittēda hæc est, nisi aliud quippiam id fieri prohibeat. Id quod etiam Hippocrates iussit: dum iuuenes elleboro esse purgaudos ait. Verū si uenę sectionem, aut purgationem adhibere minime licebit, aluum per clysteris infusionem eluere oportet. Quod tum potissimum faciendum erit, ubi multa in intestinis excrementorum copia fuerit. Cauidendum tñ unice erit, ne sint ualidiores, atq; adeo ne aliunde humorū copiam ad intestina trahant, ne meatus urinarii angantur & comprimantur: sed sint tales, quę duntaxat excrementa in intestinis detenta uacuare possint. Vt est huiusmodi, qui ꝑ. Maluę, altheę; mercurialis: trichomanis (polytriciū nomināt) helxines: hoc est parietarię añ. M. i. si symbrii, cardamines, id est nasturtii aquatici. M. i. s. seminum oreo selini, apii, foeniculi, lini añ. 3. iii. radicis acori ueri. 3. i. s. furfuris. 3. i. Buliant in aqua iuste quantitatis, & colentur. Colature. 3. xi. casię fistularis. 3. i. hierę picre. 3. s. mellis rosacei colati. 3. i. s. oleoꝝ anethini: rutacei, chamemelini añ. 3. i. salis. 3. 2. misce, fiat enema. Naq; clysteri. assidue: aliis fere omnib. neglectis remediis (ut facere pleriq; hodie solent) utendū, sed bis aut ter, sic tamen ne ultra ꝑsuetuz tps retineant. Retenti enim cōpressionez atq; angustiam renum, & meatum urinarioꝝ efficiunt, ut copiose Lib. 2. Paradox.

Curatio.

Vena sectio.

Purgatio

Clyster.



Laxantia

Vnguentum.

Vrinam

mouentia

Deducen-  
tia ad re-  
nes.

dox. Cap. 15. diximus. Excrementis alui expurgatis, quæ laxare meatus possunt medicamenta adhibenda erunt. In quem usum hoc unguento renes et lumbi inungendi, quod ʒ. Oleorum anethini, amygdalarum dulcium añ. 3. 2. olei chamæmelini. 3. i. s. adipis gallinacei, anserini añ. 3. 2. butyri salis experti. 3. i. cere quod satis est, fiat unguentum molle. In sessionibus item utendum ex decocto calaminthes, origani, parietarię, sisymbrii, cardamines, brassicę, foliorum altheę, malue, et similium. Aut eger in solium tepidum frequenter demittendus. Fomenta etiam locis admodum commoventur ex furfuribus, cum foliis altheę decoctis. Item cataplasmata ex farina tritici, seminibus lini et fœnigręci, lupinorum, peucedani radice quam tenuissimè trita, et chamæmelo. Oportet autem coaceruatim alia super alia cataplasmata adferre, priusquam primū frigescat. Aut si non libeat, calefactorio alio extra cōtegere ne refrigerentur. Id quod commode fieri potest per saccellos, aut alia uaporiaria cataplasmati imposita. Hęc interdum ad lapidis purine eiectionem sufficiunt. Quod si uero non contulerint, ea etiam quę urinam cient bibenda dabis. Vrinam autem multam hęc ducunt, acorum, hypericum, o reoselinum, semen lithospermi, hoc est, milii solis, ammii, dauci, et fœniculi, asarum, radix bryonię, rubię tinctorum, cortex capparis, asparagus, et similia. Deducunt autem ad renes ea quę calculos confringunt, peucedani radix, apius et radícula. Lapides autem in ipsis renibus confringunt et atterunt, sion adianthum, bdellium, uiticis seu agni semen, rusci radix, saxifraga, betonica, ciceris iusculum, lithospermum, tecolithos (qui lapis iudaicus dicitur) xanthium, altheę semen et radix, et eiusmodi. Horum singula partim decocta, partim tenuissimè trita, præbeto bibenda. Porro ea quę urinam cient, ac lapidem frangunt, tunc exhibere conuenit, quum uehemen-

tes



tes dolores remittunt: id quod accidit, lapide iā trāsmoto, & ex sede sua agitato. Quod si obfirmati ac uehementer impaſſi ſint lapides, plurimus potus uiſandus, itemq; ea quę urinam ducunt. cum enim ſecum excrementorum copiā ad renes deducant, meatus etiam urinarioſ plus obſtruunt, atque calculi ex renibus tranſitum impediunt. Fomentis autē ac cataplaſmatis, & inſeſſionibus membra (ut diximus) relaxanda, & uenter per leuia inſuſa ac inſeſſus euacuāduſ, ne urinarioſ meatuſ comprimantur. Poſthęc autem dolorib; aliquantulum lenitiſ, etiam cucurbitulę utiliter ipſiſ adhibentur, & præſertim preſſiuſ affixę, inflammatione uidelicet id non impediēte. Adeo enim coaceruatim tranſinouent ſepe cucurbitę ipſoſ lapideſ, ut repente doloreſ ſupprimant, lapide nimirum in ueſicę amplitudinem trāſueſto. Quapropter in principio ſupernē à re ne cucurbitę ſunt affigendę, & ad inguina attrahendę obliquē, ſecundum meatuum urinarioſum ſitum. Cæterum delati ex renibus in ueſicam lapideſ, & præ magnitudine circa collum ueſicę detēti, ſepe in extremum periculum egrum deducunt, tum propter doloruſ acumē, tum quod urinam excernere non permittunt. Decubituſ igitur formam in talibuſ moliri oportet, ita ut ſupini ſituentur, & longē altioſ coſarum uertebras habeant. Deinde multiformiter eoſ commouere, quo omnibuſ machinamentiſ adhibitiſ lapidem ex ipſo ueſicę meatu excidere faciamuſ. Quod ſi hac ratione nihil profecerim; catheter inſtrumentum proliciendę urinaſ aptum immittendum, eoq; lapidē à collo ueſicę amouendus, & urina educenda. Si uero ex ueſica quidem excidat calculus, iuxta medium autem meatum ipſiuſ pudendi obfirmetur, & uulnerando exulcerationiſ periculum inducat, aqua calida paulatim ab alto pudendorum partibuſ donec robore ſuffundantur, inſtillanda.

N aut

cucurbit.



Preserua  
tio a lapi  
de.

Pulvis ad  
calculosos  
renes.

aut pudendum in oleum calidum, quod relaxandi  
uim obtinet, demittendum. Decoctum etiam quod  
dam ex iis que urinam ducunt, plurimum exhiben  
dum est, iubendusque eger ut multam urinam congre  
get, eamque postea emingat, ac diligentius expellat: ita  
enim detractus lapis celeriter excidere consuevit.  
Quum uero neque hoc modo eum extrahere posse  
mus, secandum erit pudendum, uulnuscule superne  
iuxta glandis magnitudinem incusso. Inferne enim  
secare non expedit: quandoquidem fere semper in fi  
stulam proficit, ac postea per ipsam fissuram urina ex  
cernitur. Lapide amoto preseruare hominem oport  
et, ne rursus renes lapide infestentur. Tuetur autem  
a calculis ne fiant, cibus boni succi, concoctu faci  
lis, et moderatus, dein exercitia mediocria, rarusque; le  
guminum omnis generis, frumentaceorumque; uisus,  
item casei, lactis, et que ex ipso preparantur obsonio  
rum: uini nigri, copie carniuum, et omnium summa  
tim crassi succi, ac nimis calidorum et acrium. Ae  
gros etiam admonere oportet, ut a coena saepe uo  
mant, et absinthium assidue bibant, et per tempus cer  
tum uenam secant, siquidem sanguis abundare uidea  
tur, aut conuenienti temperaturę ipsorum purganti  
medicamento utantur, si uitiosi humores coacerue  
tur. Oportet etiam ipsam aquam per omnem uictum  
purissimam esse, et percolatam. Vinum item tenue, al  
bum, urinamque ciens, neque ualde uetus. Utantur quoque  
per interualla medicamentis urinam mouentibus, hoc  
potissimum, quod multę est efficacię. ꝑ. Radicis fœ  
niculi, asparagi, œnanthes: id est filipendulę añ. 3. 1.  
radicis rubię tinctorum. 3. 1. radicis aristolochię ro  
tundę uocatę, althę añ. 3. 1. liquiritię rasę. 3. 2. lapi  
dum ex spongiis marinis: techoliti seu Iudaici añ. 3.  
1. seminum annui, dauci, oreo selini, saxifragę albę,  
fœniculi: anisi: lithospermi añ. 3. s. seminum melonũ  
citrulli, excorticatorũ añ. 3. 1. s. seminis halicacabi,  
hoc



hoc est alchechengi. 3. s. helxines seu parietarie, mal-  
ue añ. 3. 1. polii montani, adianthi, pulegii, asari añ. 3.  
s. sanguinis hircini arefacti & preparati. 3. 1. bdellii,  
ammoniacy añ. 3. s. lapidum seu oculorum cancri, cin-  
namomi selecti, iunci odorati (squinantia nominat)  
añ. 3. 2. Singula redacta in puluerem minutissimum,  
misceantur. Detur de hoc drachma una q̄rto quoq;  
die, aut singulis hebdomadis matutino tempore in  
uino tenui. Alia remedia pete ex cap. 3. Vesicę calcu.

De renum ulceribus.

Cap. XXXII.

**V**Lcera renum accidunt propter uenarum quę  
in iis sunt rupturam. Item suppurationem in-  
flammationis, & acres ac mordaces humores  
huc delatos. Deprehenduntur renes exulcerati do-  
lore in lumbis cum grauitate & sine impedimento  
urina redditur, id quod in uesicę ulceribus non fit.  
Vrinę pus mixtum reperitur, carnosæ particulis, aut  
pilis innatantibus: iuxta Hippocraticā sententiā, quę  
sic habet: Si sanguinem, aut pus mingant, aut renum  
aut uesicę exulcerationem significat. Et statim post-  
hec: Quibus in urina crassa existente caruncule par-  
ue, aut ueluti capilli una exeunt, his a renibus excer-  
nuntur. Vitet eger cruditates, & supra quam conue-  
nit satietatem. Ne quid crudum in cibo accipiat: &  
neq; quod egre concoquitur: aut facile corrumpi-  
tur: aut inflationes parit. Maxime tamen uitet quę fa-  
cile acescunt. Item omnia acris & feruentia, & quęcunq;  
bilem gignere possunt, ut est longa sitis, inedia: & im-  
modica condimenta. Vitanda etiam omnis delassa-  
tio & immodica equitatio: maxime uero quę fit in  
equo, uigiliisq; & omnem uehementem concitatio-  
nem: & e conuerso perpetuum ocium, & balneorum  
assiduitatem. Utatur pane recenti decenter appara-  
to. Carnibus uolucrum montanarum: hœdis: & si-  
milibus carnem teneram habentibus. Piscibus saxa-  
tilibus: squamosis, in craticula assis. Cacer fluuialis

Causa.

Signa.

4. Pph. 79

“

“

“

“

Vicius.

N ii mirifi



mirificè, sorbito ex ptisana amyllum cum lacte coctū  
 confert. Dandum ⁊ lac ouis permixtum, ⁊ iusculum  
 gallinę pingue. Qua etiam sorbilia per se conueniūt,  
 Ex olerib. autem malua, intyba, rumex, portulaca,  
 lactuca: omnia tamen cocta, neq; quicquam cru-  
 dum (ut diximus) uoret eger. Ex fructibus uua passa  
 non incommoda est, ⁊ nuces pineę ⁊ amygdalę de-  
 corticatę tamen, ⁊ probè mundatę, Multus potus, ⁊  
 meracior uitandus. A frigide etiam potu in totum  
 abstinendum. Frigidum enim ut ait Hippocrates, ul-  
 ceribus inimicum. Pro potu utatur uino diluto, ac  
 parum adstringēte, aut lac caprinum, aut ouillum,  
 aut amygdalinum bibat. Coitus non solum ulceri-  
 bus, uerum etiam omnib. aliis renum passio nibus in-  
 fen sissimus est, ⁊ maximè senib. ⁊ natura imbecillio-  
 ribus. Vrinam cientia uitet. Balnei sit rarus usus.  
 Naturales uero aquas experiri non inutile fuerit.  
 aluminosas uidelicet, sulphurulentas, ⁊ consimiles.  
 Frigida lauare commodissimum est: suprā modum  
 enim ulcerationes egre sanabiles, tū externas, tum  
 internas destruit. Conferent etiam naturales aquę,  
 post matutinā deambulationem potatę. Curandi ra-  
 tio, si ob acres humores accidant renū ulcera, ab hu-  
 morum uitiosis ac erodentium purgatione au-  
 spicetur. Qui autem sic afficiuntur, eos uomitu etiā  
 uacuare oportet. Non solum uero ad uitiosos hu-  
 mores uacuandos confert uomitus, uerum etiam si  
 quis omni mense audacter uomuerit, is renū ulcus  
 ⁊ quicquid inde mali accidere potest, dissoluet quod,  
 humorum motum planè in contrariū auertat. Sūt  
 etiam interea deuoranda quę morsus obtundūt, ut  
 malua, intybum, rumex, portulaca, semina melonū,  
 cucumeris, cucurbitę, syrupi uiolaceus, rosaceus,  
 nymphę, ⁊ eorundem conseruę hodie nominatę.  
 Vacuatis humoribus, aqua mulsa bibenda, aut fœni  
 gręci decoctū cū melle, aut cucumeris, aut maluę, aut  
 melo

S. Aph.  
 90.

Curatio

Vomitus.



melonum semen cum hydromelite. lac etiam cum melle præbendum, recens mulctū et calidum, ad ulcera enim purganda conducit. Serum item caprinum, decoctum hordei et uuarum passarum, et glycyrrhiæ, quæ mirificè confert, perinde atque eius succus. Quum uero munda fuerint ulcera (quod inde tibi palam fiet, si neq; testorium etiam ulceri obductū cum urinis excretum appareat, neq; etiam pus excretum sit fœculentum, sed subalbum, et leue, et equale, et paucum) tunc ea quæ resiccant, adstringunt, et glutinantia medicamenta erunt adhibenda. In quem sanè usum datur bolus armenia, gummi arabicum, tragacantha, amyllum, terra Lemnia, et similia. Præter cetera autem is puluis mirificè conducit, qui ʒ. Terræ Lemniæ, boli armeniæ añ. ʒ. i. s. tragacanthæ, spodii, hoc est eboris usti añ. ʒ. i. amyli, nucum pinearum tostorum añ. ʒ. s. seminum lini, cucumeris repurgati, melonum, singulorū .ʒ. ii. seminis apii. ʒ. ii. sanguinis draconis. ʒ. i. Conterantur singula, et redigantur in puluerem tenuissimū, de quo dentur quotidie ieiuno egrotanti. ʒ. ii. cum lacte recens mulcto. Extrinsecus etiam quæ renes exiccare ac roborare possunt admoveantur emplastra, cerata, et ungueta ex oleis, rosaceo, myrthino, farina hordei, thure, mastiche, rosis rubeis, et similibus cōposita, quorū copiam in præcedentibus quibusdam Capitulis habes. Plura et ad institutum facientia dicemus in Cap. de Vesicæ ulceribus.

Glutinantia  
etia.  
Puluis.

## De Diabete. Cap. XXXIII.

**D**iabetes diuturna est passio circa renes consistens, multum potum inducens, unā cum hoc quod quicquid bibitur, simul ut et quale assumptum est per urinam redditur. Quidā uero hanc passionem aquam inter cutem ad matulā, Galeno Cap. ultimo Libri de Symptomatum differentia recte, et urīnæ fluorem seu leuitatem, atq; ab inexplibili siti dip

Diabetes  
quid.

N iii sacon



**Causa.**

faccon uocant. Origo ipsius ex retentricis renum facultatis imbecillitate contrahitur attractricis uero tanto robore, ut totum corpus ob immodicum calorem exhauriat. Renum itaq; propria passio diabetes existit, qua uidelicet immodicè humorem appetunt, ipsumq; propter debilitatem retentricis in eis facultatis continere non possunt, sed eum aceruatim in uesicam excernunt. Concomitatur egros pertinax

**Signa.**

fitis, neque ulla satietas ex alicuius liquoris exhibitione contingit: adeoq; assidue potum assumere coguntur, propterea quod citissime per urinam expellatur potatum. Viscera ipsis uri uidentur, uniuersum

**Curatio**

habitum gracilem habent, et tabes totius corporis accedit. Scopus curationis in eo consistit, ut humorum acredinem deleamus, sanguinemq; ac cum eo permixtum serosum humorem ad motum tardiores redamus, et renum intemperiem corrigamus. Mox itaq; ubi coeperit malum, nodum ad perfectionem progressum, optimum est cubiti uenam seccare, et moderate sanguinem auferre. Utendum etiam mediocriter urinam cientibus, quæ uitiatum in renes imbibitum humorem repurgare possunt. Quod si uero inueteratum sit malum, neque uenæ sectio assumatur, neque quicquam quod urinam cit exhibeatur. Hæc enim corporis tabem et colliquationem, quæ sponte sua in hoc malo fit, accelerant. Concidunt enim in inueteratis uires, et ex uenæ sectione totum corpus acrius redditur, et urinam cientia in ipsis multiplicat malum. Maximum autem remedium huic passioni, ut statim potatum reuomatur. Sit autem perquam frigidus ipse potus reliquaq; uictus ratione conuenit uri frigidior. Cibi itaq; exhibeantur boni succi, quiq; difficulter commutari possunt, et mordacitate careant, et qui mordacitatem obtundere ualeant ut sunt oua sorbilia, halica ad sorbitionis formam, apparatus,

**Vitæ.**



apparata, carnes porcine macre coctæ. Neq; uero in  
commodè exhibetur eis caseus recens compactus, sa-  
lis expers, & lac per filices aut ferrum ignitum scis-  
sum, ieroso humore adempto. Pro sorbitione etiam  
ptisanæ succus frigidus probatur. Ex oleribus autem  
intybum, lactuca, portulaca. Ex fructibus, pira, po-  
ma mala punica. Inter pisces, saxatiles conueniunt.  
Bibat uinum rufum, crassum, aqua amplius dilutū,  
ad falluginosorum humorum prolutionem, qui si-  
tim inducunt. Vinum enim corporis temperaturam  
ad dulcorem permutat. Conuenit etiam in potu, ex-  
hibere succum malorum granatorum, rob de ribes,  
aut oxyacantha, & similia. Quod ad medicamenta ip-  
sa attinet, polygoni seu sanguinarie succus rectè ip-  
sis ex uino nigro propinatur. Symphytum item, pal-  
mularumq; & baccatum myrti, pirorumq; decoctū.  
Sirupi, rosaceus, myrthinus, & similes. Pastilli quo-  
q; de spodio hodie nominati, ex succo polygoni,  
aut uino nigro præbendi. Extrinsecus hypochondriis  
lumbis, & pectini illitiones, cataplasmata, & cerata re-  
frigerantia adhibenda, qualia sunt quæ ex aceto ro-  
saceo, polenta, lactuca, lenticula palustri, paritaria,  
foliis uitis, portulaca, & similibus apparatur. In huc  
usum proderit inunctio ex oleis rosaceo & myrthi-  
no, aut illitio ex succo solani, aut pampinorum uitis  
facta. Farina etiam hordei, aceto & rosaceo sub-  
acta, cataplasmatibus modo hypocondriis imponenda.  
Aut ut edum hoc emplastro, quod ʒ. Farinæ hordea  
cæ. ʒ. s. pampinorum uitis, extremitatum salicū, bur-  
sæ pastoris an. p. i. corticum granatorū. ʒ. ii. s. portu-  
lace. M. i. seminum cotoneorum, ʒ. i. rosarum rub.  
M. i. s. Buliant singula in aqua, donec ad mellis cras-  
situdinem perueniant: deinde addantur olei rosacei  
ʒ. ii. olei myrthini ʒ. i. & denuo buliant, & fiat em-  
plastrum. Ex prædictis potest fieri ceratū, adiectis hy-  
pocisthede, acatia, bolo armenia, resina & cera. Cete-

Empla-  
strum.

N iiii

runt



*Sudores  
alexclm  
di.*

rum sudores quoque excitandi erunt, ut nimirum vitiosi humores ad exudationem uertantur. Optima uero est in dolio facta ex herbis aut alijs rebus calidis euaporatio ad sudandum, eo modo ut caput extra dolium promineat. Vel uas aqua calida plenum pedibus egrotantis in lectulo decumbētis admoveatur, et sudor efficiatur.

*De uesicæ calculo. Cap. XXXIII.*

*Pueri lapsi  
de uesicæ  
magis la-  
borant.*

*Causæ.*

*Signa.*

*Curatio.*

*Medica-  
menta lapi-  
des atterē  
ita.*

**G**eneratur in uesica lapides pueris frequentius quam etate prouectis. Voraces enim sunt pueri, et perpetui motus, et cibus utcumque oblatis et nociuis utuntur, et neque horam cibum capiendi seruant ordinatam: quinetiam priusquam prior assumptus cibus concoquatur, alium ingerunt: et quum uehementius à cibo moueantur, crudus et incoctus in uenas cibus distribuatur. Mollia autem sunt ipsorum corpora, et quæ facile cedant eiusque rei gratia obturationem circa renes non perferunt. Quum autem crassissima lotia in uesicæ amplitudinem perferantur, ibidem uelut fex et limus aquæ subsistunt, ac postea ex loci caliditate desiccata lapidescunt. Cæterum aque quæ impure, et multo limo refertæ, itemque duriores et uehementer frigide, lapidum generationem adiuuant. Pruriunt laborantes crebro, et contrectant pudenda, intenduntque, et continuo ad mingendum urgeant. Pruriunt laborantes crebro, et contrectant pudenda, intenduntque, et continuo ad mingendum urgeant, ac stillicidio urinae uexantur.

Curatio huius mali eadem ferè est, quæ renū, cum calculo afficiuntur. In hoc tamen diuersa, quod ualidiora medicamenta exigant uesicæ calculi: et quod uesicæ adhibenda sunt, quæ tum renibus admovebantur. Lapidem autem in uesica oborti, iis potissimum medicamentis atteruntur: semine fœniculi, smyrnii, granis pœoniæ nigris, radice fœniculi, artemisia, chamemelo, althææ radice et semine, sive quod circa aquas nascitur, adiantho, rumicis radice, lapidibus spogiatis.



giarum, techolito, lithospermo, lapide qui ab egris per lotium electus est trito et potato, semine xanthii, cortice capparis, abrotani semine, hyacinthi, et similibus, quæ in Cap. de Calculo renum sunt commemorata. His accedit laudatissimum remedium, passer troglodytes, qui minimus passerculus est, iuxta sepes et muros uictum queritans, ut Paulus et Aëtius tradunt, caudam semper subrectam et albo colore retro interpunctam habens, et iuxta summum alæ lineamentum cinerei coloris. Hic, inquam, totus sale conditus, et crudus in cibo acceptus, morbum perfecte sanat. Calculos enim iam creatos per urinam expellit, in posterumque generari prohibet. Sanguis denique hircinus ad calculos cum renum, tum uesicæ præsens remedium est. Nam præexistentes soluit, atque ita per lotium excernit, ut etiam alii amplius non gignantur, præterea et dolorem sedat. Quomodo autem is sanguis colligendus sit, docet Aëtius Libro undecimo Capite duodecimo. Porro si uesicæ lapides per lotium excerni non queant, sed in meatu sint obturati, et urinae suppressionem inducant: egrum supinum decumbere oportet, ita ut coxarum partes magis sursum uergant, indeque huc atque illuc multiformiter commouere, quo ex meatu excidet lapis: post uero ita adhuc supinum et positum sursum uergentem mingere iubere. Si uero neque sic excernere possit, per catheterem instrumentum urinam prolektare. Deinde ea quæ lapidem in uesica atterere ualent medicamenta adhibenda. Quod si neque per hæc curatio procedat, ad sectionem transeundum erit. Post exactum lapidem uictus ratio constituenda est, ne eos renasci contingat, quam in Capite de Calculo renum memorauimus.

De san-



De sanguinis ex uesicę eruptione, & grumis  
eiusdem. Cap XXXV.

Signa .

Curatio  
eruptio-  
nis san-  
guinis.Grumos  
sanguinis  
dissoluen-  
tia.

**R**umpitur interdū uena in uesica: & partim quā  
dē sanguinē foras mittit, partim uero intus cō-  
densatur. Sanguine autem condensato, & gru-  
mis coactis, eger animo linquit, & pallefcit, pulsusq;  
paruos obseuros, & densos habet, in calore angitur, re-  
frigeratur, ac uiribus destituitur. Quum uero gru-  
mus aliquando in urinarium meatum inciderit, is e-  
tiam urinq; excretionem supprimit. Porro sangui-  
nis eruptioni celerrimē auxilium ferre oportet. Qua  
propter si nihil prohibeat, uenam in cubito ficare,  
partita sanguinis detractioe conuenit, ut hac ratio-  
ne sepe & paulatim sanguis detractus reuellatur. Ae-  
gri uero in decumbendo sursum uersus collocentur,  
& coxendicibus ipsorum leuandis & simul refrigera-  
dis spongię posca imbutę subdantur. Extremitates  
partes constringendę, & pecten ex spongiis posca im-  
butis irrigandus. Virgente malo summē profunt cu-  
curbitule iliis ac lumbis affixę. Utendum post irriga-  
tiones cataplasmatibus ex polygono, rubo, plantagine,  
balauistiis. Item cerata ex hypocisthide, acatia, bolo  
armenia, & similibus, in Capitib. de Sanguinis sputo  
& Dysenteria commemoratis. Vesicę etiam infunden-  
dus polygoni, plantaginis, aut millefolii succus, ad-  
iectis acatia, bolo armenia, pastillis de spodio, & si-  
milibus. Inseffus etiam ex consimili materia con-  
structi conueniunt. Danda quoq; in potu medi-  
camenta eductioni sanguinis apta, ut sunt pæonię  
grana rubra duodecim tenuissimē trita, terra Lem-  
nia, hippuris, centaurii magni (rha ponticum ho-  
die uocant) radix, thuris cortex, & similia.

Porro q̄bus sanguis in uesica in grumos cogitur,  
primum tentandum est ut per medicamenta con-  
uenientia diffundatur ac dissoluatur. In potu itaq;  
regenda.



præbenda est attemisa, elychrisum (sticada citrinam nominant) absinthium, abrotanum, ramenta uitis, raphani semen, leporis coagulum aut hœdi, unumquodq; cum oxymelite. Oxymeli etiam per se exhibitum, mirificè prodest. grumos enim dissoluit, ut paulatim subinde per urinam prodeant. Extrinsecus etiam balnea, unguenta, irrigationes, et alia quæ relaxandi uim obtinent adhibenda, quæ sanè singula, ex Capite de Renum calculo petenda sunt. Præter alia uero hoc ceratum confert, quod ꝑ. Oleorum liliorum alborum, chamæmelini añ. ʒ. i. s. calaminthæ, cumini, foliorum sambuci añ. ʒ. iii. bituminis Iudaici, ammoniaci. añ. ʒ. ii. coaguli leporis. ʒ. iii. abrotani, farinæ seminis fœnigræci añ. ʒ. s. ambari subalbidi (sperma cocti uocât). ʒ. i. cum resina et cera quod satis est, fiat, ceratum quod pectini imponatur. Quod si modo nihil proficias, sed urina supprimatur, necessitatē inducet catheteris adhibendi. Per quem ubi urinas eduxerimus, rursus prædicta in potu exhibenda, ac extrinsecus admouenda quæ ad grumorū dissolutionē conducunt. Si uero neque sic grumi dissoluantur, ad sectionem haud secus quam in uesica calculo laborante ueniendum.

Ceratū.

## De inflammatione uesicæ. Cap. XXXVI.

**M**orborum qui circa uesicam oboriuntur grauissimus et maximè mortalis inflammatio existit. Consequuntur egros hæc signa. Febri acuta infestatur, et uigilant, et delirantes aliena loquuntur, et uomunt biliosa pura, et urinam reddere non possunt. Durus fit pectus et pubes cum uehementi dolore, et egerendi appetentia, ueluti in tenesmo fieri solet. Quod uero egeritur, tenue est, et subsidentiam non habet. Aliquando et inflationes sequuntur, et alius adstricta est, intestino recto ab inflammatione uesicæ compresso. His itaque si nihil aliud

Signa.

Curatio



aliud prohibeat, sanguis citra cunctationes ex popli-  
**visus.** tis uena detrahendus. **Visus** quoq; ratio, quę in  
 aliis inflammationibus ac febribus conuenit, adhi-  
 bendus. Extrinsecus iis utendum, quibus leniēdi po-  
**Quę ex-** testas inest. Oleo itaq; uesicę regio, in quo anethuz,  
**trinsecus** semen lini, aliquando etiam ruta & althea incocta  
**adhibēda.** sint, irriganda. Neq; enim frigida & reprimētia me-  
 dicamenta sunt adhibenda. Primum quidem, quod  
 uesica neruosa admodum sit. Frigidum enim, ut Hip-  
**SAPH. 18** pocrat. ait, inimicum neruis. Dein, quod frigida oc-  
 cludant ac stringant, atq; adeo urinę suppressiones,  
 quę huic malo sua sponte sequitur, augeant. Et qđ  
 ne humores inflammationem efficientes discutiatur  
 aut maturentur, prohibeant. Calida igitur medio-  
**Clysteres** criter admouenda potius, quę quidem dolorem le-  
 uant, urinę fistulā & meatū laxant, atq; inflammatio-  
 nem ipsam discutiunt. Clysterib. etiam lenibus al-  
 uus subluatur, & post stercorum educationē, oleū ane-  
 thinum in intestinuz leniendi doloris gratia inilcia-  
 tur. Prestat autē & papaueris calicem simul cū oleo in-  
 coquere, & adipem anserinum aut gallinaceum recē-  
**Glans.** tem in ipso oleo eliquatum simul infundere. In ue-  
 hementioribus doloribus cum oleo anethino. 3. i. pi-  
 lularum de cynoglossa infundere oportet: aut opiū  
 cum myrrha & croco lanę illitum in podicem inde-  
 re. In decoctum item seminis lini, fœnigręci, radicis  
 althę, seminis dauci, & similiuz, infideat eger: admo-  
 neaturq; quo in aqua decocti desidens mingat. Vesi-  
 ca enim non satis robusta est ad amplectendam & ex-  
 pellendam urinam. igitur ipsum egrum aut aliquem  
 ex adstantibus scitē ac placidē pectinē premere opor-  
 tet: neq; id ultra modum, ne dolor inde intendatur.  
 Cæterum post clysteres, & inessus, fomentis etiam  
 per aquam calidam & oleum in uesicis semiplenis ad-  
 motis utendum: aut sacculis, quemadmodū in Capi-  
 te de Pleuritide ostensum est. Quod si neq; sic ma-  
 lum



lum cesset, cucurbita una cuius scarificatione locis affigenda. Porro abstinendum ab iis erit, quæ urinæ uehementer citant, ac potio multa uitanda. Vbi euidens declinatio apparuerit, ad ea quib. discutiendi et emolliendi vis inest, de quib. supra sepe dictum est, transeundum. Catheteris immisione ad inflammata uesicam non temere utendum, nisi urinae suppressæ periculum admodum urgeat. tum enim necessario ad eius usum confugiendum: non sanè quod mali molestiam tollat, sed ut urgentem urine suppressionem corrigat, et a precipiti periculo liberet. Post urine prolestationem, rursus ad eadem auxilia quæ mitigant dolorem ueniendum, usque quo inflammatio soluitur aut suppuretur. Solet autem sepe repente inflammatio solui, erysipellate iuxta cutis superficiem oborto, et permanente, neque rursus intro recurrente. Imò et urina multa eiecta, sepe iudicatum est malum. Quod si hæc appeant, nihilominus tamē iisdem remediis insistere oportet.

## De stillicidio urine.

## Cap. XXXVII.

**Σ**ταγγοῦσι α græcè, stillicidium urine latinè dicitur: et est, quum paulatim et guttatim urina destillat, ac assiduam ad mingendum irritationem facit. Hæc fit, aut ob acrimoniā, uel (ut hodie loquuntur) ardorem urine, aut ob exulcerationem uesicæ. Acrimoniā esse causam iudicabis, si urine biliosiores sint, totumque corporis habitus, uel et reliqua signabilem testantur, et mordacitas circa uesicam pertingat. Vesicæ autem exulcerationem ex iis quæ suo dicentur loco deprehendes. Si itaque ob acrimoniā urine stillicidium accidat, tum sanè exuperantem uitio suum humorem quam celerrime purgare oportet. In quem usum præter ea quæ iam sepe dicta sunt, mirifice confert serum lactis caprini cum casia fistulari. Cibis et contemperantibus, et acrimoniam obtundentibus utendum: ut est ptisanæ cremor, malua, portulaca, uiola, et huiusmodi.

Σταγγοῦσι α.

Causa.  
Signa.

Curatio



Ecligma.

Pulvis.

Clysteres

modi. Ab omnibus etiam acribus et salsis abstinendum: uino: exercitiis, ira, et tarda comestione. hec enim omnia bilem in corpore aceruant. Piscibus, utendum laxatilibus, et balneo aquæ dulcis, quod mirifice humores uitiosos comtemperare potest. In potu plurima aqua calida dulcis exhibenda, aut hordei decoctum cum syrupis uiolaceo et rosaceo. Vinum non prebendum, nisi dulcius: et dilutum. Optimum est et ipsum lac calidum potatum. In summa, quod ad uictus rationem attinet, utendum cibis humectantibus, ac aluum emollientibus iusculis. Cæterum eger assidue ad mictionem cogendus. Si enim acris recrementum diutius in uesica moretur, partes ipsas corrodit, et exulcerat. Quinet ad obtundendam humorum acrimoniam subsequens medicamentum porrigendum, quod est. Conserue uiolaceæ. 3. iij. malug. 3. 2. seminum melonum: cucumeris: cucurbitæ excorticatorum añ. 3. 1. gummi arabici nominati. 3. 2. cum syrupo de liquiritia, fiat ecligma. In hunc etiam usum prebendum decoctum dulcis radicis, aut iste pulvis, qui est. Seminis melonis excorticati, citrulli, cucumeris añ. 3. iij. seminum cucurbitæ, portulacæ, lactucæ, añ. 3. 2. rosarum rub. 3. 1. succi dulcis, radicis, glandium añ. 3. 1. s. Terantur singula: et fiat pulvis subtilissimus. de quo. 3. 1. s. quotidie mane in syrupo de dulci radice, aut zupapio uiolaceo, aut rosaceo dentur. Supra modum etiam conducit terebinthina resina, lota in aqua stillaticia rosarum, aut in tybi, nucis ponticæ magnitudine, aliquando duarum trium uel accepta. Hec enim Galeno lib. 5. de Tuend. ual. teste, non solum aluum citra noxam soluere, atque adeo acres humores à meatibus urinariis auertere potuerunt etiam uiscera, renes potissimum abstergere. Et fuerunt, qui solo huius usu curati sunt. Clysteres etiam non parum prodesse constat ex decocto malug, uiolarum, altheæ, foliorum salicis, nymphæ, et aliis supra commemoratis apparati, adiecta casia fistulari, saccharo et



ro & oleo uiolaceo. Quod si uero acrimonia adhuc  
augeatur et per colem lac ipsum cum amylo in uesti-  
eam iniiciendum. In eum et usum decoctum papaue-  
ris albi iniicere oportet. Extrinsecus pubes oleis uiolaceo  
nymphæ: cum modico caphuræ inungendus. Si autem  
stillicidium urinae ob uesticæ exulcerationem accidat  
curatio ex proprio Capite petenda erit,

## De difficultate urinae. Cap. XXXVIII.

**Δ**ΥΣΟΥΡΙΑ Græcis, difficultas urinae Latinis appel-  
latur. Est malum, in quo urina egrè & difficul-  
ter excernitur. Fit ob uesticæ imbecillitatem,  
atque adeo frigidam eiusdem intemperie, quæ actione  
illius lædit. Causa facile ex uictus ratione precedit  
te, & ex egri sermonibus deprehenditur. Urina item  
alba, & aliis quæ frigidam intemperie ostendere iam  
sepe diximus. Curatio per ea quæ calefaciunt fieri  
solet. Pectinem itaque oleis calidis, rutaceo nimirum,  
anethino, siliaceo, scorpionum, & de castoreo fouere  
oportet. Admouenda etiam fomenta, & sacculi ex  
chamelelo, abrotono: betonica: artemisia, ruta, ca-  
lamintha, sabina & similib. herbis confecti. Aegrum  
etiam oportet in prædictarum herbarum decoctum  
desidere, ac inum uentrem contegere ac calefacere.  
Interdum etiam proderit per sedem earundem her-  
barum decoctum, adiectis oleis calidis infundere. Cum  
his præterea utendum calefacientibus, & urinam du-  
centibus: uelut est pastinaca probè cocta, fœnicu-  
lum, apium, asparagus, hipposelinum, & quicunque  
eius generis existunt. Urinam etiam commodè ciēt  
cancrī, & herinacei terreni. Carnem enim illorum  
exiccare oportet: & drachmæ pondus in potu acci-  
pere. Aromaticum denique decocta in potu exhiben-  
da, aut eorundem confectioes dandæ. Præter  
alias uero summe conferunt, confectio diacala-  
minthæ, dialaccæ, & diacurcumæ. Theriaca etiam in  
potu

Disuria.

Causa.

Curatio.



potu data, mirificè confert. Multa alia in hunc usuz  
facientia ex superioribus Capitib. petenda erunt.

## De suppressione urine.

## Cap. XXXIX.

Ischuria.

Causa.

Signa.

**I**σχουρία, hoc est urine suppressio, maluz est in quo  
egris in totum urina supprimitur & cohibetur.  
Hec aliquando accidit ob imbecillitatem, uesica  
ea que in ipsa continentur arctè complecti ac exprī  
mere non potente. Interdum autē eius ceruicis mea  
tu à crassis humoribus, aut lapide obturato. Qñq;  
uero propter inflammationem, aut scirrhu, aut aliū  
quempiam tumorem meatum angustum reddentem,  
& perfecte obturantē. Interdum etiam ob caruncu  
lam, aut callum in meatu natum. Sanguis etiam in  
grumos cōcretus in uesica, suppressę urine causa exi  
st. Pus item crassum per ipsam uesicam à renib. aut  
iocinore, aut alia quapiam superiore parte excretuz,  
urine suppressionem efficit. Accidit & sanis sepe uri  
nam ipsorum cohiberi, aut ob negotioruz importu  
nitatez, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut  
somnia, si diutius continuerint mictionez. Afficitur  
enim in iis cōprehensua & urinam obuoluens uesi  
cę uis, ex immodica uidelicet repletione & tensione.  
Imò quantum amplitudo ipsius uesicę expleta circū  
tenditur, tanto angustior seipso fit meatus. Si pro  
pter imbecillitatem fit, ex iis que frigidam intēperiez  
monstrant deprehēditur. Si à crassis humo rib. ex ui  
ctus ratione, que precessi t. in ocio enim educatus,  
multis cibis crassos uiscososq; humores generare  
potentibus usus est. Si à lapide, eius notę, que suprā  
dictę sunt, precesserunt. Si ab inflammatioe, aut alio  
tumore: dolore: febre: ac uisu facile dignoscitur.  
Qđ si ob carunculam aliquaz aut callum suppressio  
urine orta fuerit, ex precentib. ulceris notis, & ex  
eo quod traiecto cathetere urina uacuatur, intellige  
re possumus. Immissus etiam catheter in ea parte ubi  
antea



antea ulcus esse coniciebatur, dolorem mouet: fracta sub cathetere carne, sequuntur cum urine excretionē & cruor & carnis fragmenta. Si gumi obturationem fecerint, sanguinis præcedit excretio, & effluxus. Vbi uero pus obstruxit, ex præcedentium notitia sciri licebit. Nam uel uesica uel renes antea malo aliquo laborauerunt, aut in parte aliqua renibus superiore præcessit abscessus: quo rupto: pus in renes, & subinde in uesicam transsumptus est. Reliqua causa de sermonibus egrotantis cognoscetur. Curandi ratio iuxta causarum diuersitatem alia atq; alia erit. Si enim propter imbecillitatem, & egrum neficæ sensum urine suppressio contigit, irritando submouere, ac excitare eius actionem oportet, & per insensum: fomenta: & alia quæ in Cap. de Difficultate urine dicta sunt, auxiliari. Vitanda tamen sunt ea quæ urinam ducunt: ne scilicet multitudine eius uesica distendatur. Aeger præterea sic figurandus: ut decliuis sit ceruicis uesicæ positus: ac subinde manibus supra pubem admotis, urina sensim, comprimendo tumorem, expellenda. Nitro etiam: aut pediculo uiuo, aut alio quod excretoriam actionē uesicæ irritare potest admoto, citius urina procedet. Si uero a crassis humoribus urine retentio oriatur, fomentis, in sessionibus, ac cataplasmatibus ex herbis calidis compositis inchoanda. Hæc enim crassos humores dissoluere, ac incidere possunt. Præter ea quæ in cap. de Difficultate urine commemorata sunt, ualet hoc unguentum, quod R. Oleorum scorpionis, nardini: liliacei añ. 3. iii. sagapeni, bdellii: opopanacis añ. 3. i. pinguedinis anseris, anatis añ. 3. s. radicis helenii, pulegii, calaminthæ añ. 3. 2. gummi dissoluantur in uino, & cū cera quod satis est, fiat unguentum. Vesicæ etiam iniiciendum oleum scorpionū: aut liliaceū, aut aliud quod crassos humores dissoluere potest. Quod si uero propter inflammationē, aut alium tumorem urina supprimatur,

Curatio

Si ideo propter imbecillitatem.

Si ob crassos humores.

Si ob inflammationem, aut alium tumorem.

Cura



curatio ex propriis Capi. petenda. Itidem faciendū,  
 Si ob lapi si a lapide aut grumis urina suppressa fuerit. Lapis si  
 dez aut sa quidem ex loco excutiendus ⁊ dimouendus quē ad  
 guinis grū modum Cap. 34. est prædictū. Sanguinis uero grū  
 mos. dissoluendi eo modo. sicut Cap. 35. dictum est. Qd  
 Si ob ca si ob carunculam aut callum suppressa fuerit urina  
 runculam balnea ⁊ alia remedia relaxantia, ac urinariam fistu  
 aut callū. lam dilatantia sunt adhibenda, de quib. in Capi. de  
 Si ob ne Calculo renū abunde diximus. In sanis autē quā  
 golorum ob negotiorum importunitatem urina diutius retē  
 importu ta uesicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsi, ma  
 nitatem. nibus supra pubem admotis, ac urina sensim expres  
 sa: ueluti in Curatione suppressionis urinæ ex im  
 becillitate uesicę factę, fusius ostensum est.

De ulceribus uesicę, ⁊ eius cervicis. Cap. XL.

Cause.

Signa.

**E**Xulceratur uesica aut propter abscessū, aut ob  
 tuberculum quod præcessit, aut ex ruptura, aut  
 ob fluxionis erosionem, aut aliam similem cau  
 sam. Aegros dolor acutus uesicę omni quidem tē  
 pore comitatur, maximē uero tempore mictionis, ⁊  
 excretionis puris. Et si quidem sordida fuerint ulce  
 ra, fœculenta simul excernuntur, ⁊ mucosa, ⁊ q̄ cras  
 sam subsidentiam ad modum farinę habent. Aliquā  
 do autem pelliculę tenues ad modum foliorum ⁊ la  
 narum cum urina excernuntur. Si uero serpendo de  
 pascant ulcera, subcruenta excernuntur, ⁊ saniosa,  
 ac foetentia. Ad hæc accedunt difficultas emittendę  
 urine, ⁊ pudendi arrestio, ac petulantia. Dolor autē  
 non solum cum urinæ meatus fuerit exulceratus, s  
 ⁊ quum in profundo exulceratio consistit. Cogna  
 scetur autem num in profundo, siue iuxta urinę fi  
 stulam sit exulceratio, ex eo, quod si in amplitudi  
 ne uesicę fuerit, dolor circa pubem consequatur. Si  
 uero iuxta cervicem uesicę ulcera existant, tempore  
 mictionis tantū, ⁊ maxime ubi mingere incoeperint  
 ac ces



ce cessauerint, dolor sentitur: atq; id amplius con-  
tingit, si urine sint aciores. Insanabilia uero, aut sal-  
tem curatu difficillima sunt uesicę ulcera: tum quia  
ipsa neruosa est: tum etiam quia ulcera eius urina, q̄  
acris est natura, assidue cōtingit, eroditq; nec ut glu-  
tinentur permittit. Verum quū sepe etiam pręter ex-  
pectationem quēdā eueniant, cura aggredienda est,  
per quam si nihil aliud, certe accessorii dolores mi-  
nuentur. Primum igitur persuadendū est egro ut de-  
cumbat, et in lecto quietem toleret: idq; maxime, si  
febres simul adsint. Deinde remedia febribus inter-  
mittētib; adhibenda. Maximū uero hic fuerit lactis  
potus, neq; post ullum aliud remedium secundo lo-  
co id habendum. nam et asperitates lenit, et ulceratio-  
nes eluit, malumq; abstergit. Reliqua uero uictus ra-  
tio talis sit, qualis ea est quę in renum exulceratio-  
ne adhibetur. Per medicamenta etiam egrum conso-  
lari oportet, quę pubi imponuntur. Etsi quidem cū  
inflammatione exulceratio consistat, cataplasmata  
ex lini semine et fœnogręco, aliaq; quę suprà in Ca-  
pi. de Vesicę inflammatione dicta sunt, apta erunt.  
Porro si exulceratio pascendo serpat, subadstringē-  
tia extrinsecus apponenda sunt: atq; hęc quide; cali-  
da, ut ob calorem quidem partes circūdolitantes le-  
niendo iuuent, ob potestatem autem ipsorum uici-  
nos locos depascere prohibeant. Utendum etiam iis  
quę p catheterem infunduntur medicamentis. Infun-  
dendum itaq; inflāmatis locis lac recens mulctum,  
aut rosaceū optimuz tepesactū. Si uero nihil horum  
adsit, aq̄ dulcissima tepida assidue infundenda, mor-  
dacitatis tempore instante. Per sedem quoq; ptisanę  
succus, aut decoctū ex semine lini cucumeris decor-  
ticati, fœnigręci, malua, aut lac cū rosaceo infundē-  
duz. Frequenter aut et in aquā calidā desideat eger, et  
in decocta relaxantia: nā hęc dolores mitigant. Atq;  
ubi ulcera iaz pascendo serpunt, p cathetere; in uesi-

Insanabi-  
lia aut sal-  
tem diffi-  
cillima cu-  
ratu cur-  
uesicę uis-  
eera.

Curatio.

Lactis po-  
tus.

O ii cam



cam iniicienda sunt, quę depastionem sistere possunt: ut sunt acacia, hypocisthis, alumen, malicoriū, gallæ, terra lemnia, bolus armenia, et similia. Quod si uero sordida sint ulcera, medicamenta infundenda sunt, quę repugnandi et abstergerendi facultatē obtinent: uelut ē mulla dilutissima, uel lac cū paululo mellis, uel cū cucumeris semine decorticato. Si uero acrimonia cōsequatur et mordacitas, lac recēs mulctū cum optimo amylo infundatur, aut pompholyx: hoc est thutia, plurib. aquis elota et exiccata, atq; deinde cū lacte diluta. Quū uero repurgata fuerint ulcera, adiuuare oportet quo ad cicatricem perducantur, atq; id per inessus adstringētes, et eiusdem facultatis emplastra, fomenta, et irrigationes. Ceterū si ad multum tempus exulceratio duret, tunc sanē et exacerbationes et interualla siue remissiones egros apprehēdūt. Quapropter in exacerbationib. quidē cataplasmata, fomenta, et irrigationes, leniēdi uim habentia adhibeantur. Remissionis uero tempore iis quæ malum destruere possunt utendum. Pectini itaq; rubefacientia ac sinapimi imponantur, ac uictus ratione uirib. reparandis apta utēdum. Quod si non māsuescat malum, crustas circa pubē infligere oportet, aut per medicamenta aut per ferrū, si nēq; ut per multum tempus ulcera se per effluxionē repurgent. Non ineptē uerō medicamenta dolorē leuantia in potu exhibueris, si uehementes insint dolores. In hunc sanē usū cōueniunt pastilli de halicacabo, seu trochisci de alchichengi hodie nominati, cum opio. In uesicā quoq; iniicienda, quę dolores mitigare possunt.

*De his qui re uenerē uti non possunt. Cap. XLI.*

**Q**ui mariti existūt, at re uenerē uti cupiūt et debent, igna autem et impotētia membra ab frigida eorūde intēperiē, aut aliud malū habēt, infernas partes exerceāt, et cibis utātur calefaciētib. et bonum



et bonum succum generantib. carnib. gallinarum, caponū, perdicum, phasianorum, iuuentū columborū, auicularum montanarū, passerū potiss. testiculis gallorum, et similib. Edulia uero non solū bene nutrienda, sed etiā flatuosa ipsis conueniunt: ueluti cicer, fabę alica, bulbi, porri, pastinacę radix et semē, nuces pineę amygdalę dulces, et similia. Oua item perdicis ad coitū excitant. Dormiant in mollib. lectis, legantq; quę ad coitū cohortantur, lectionib. itē assideāt. Naturalia cōtinuo ex oleis, unguentis, aliisq; calefacientib. medicamentis cōfricent. In quē usum hoc unguento uti licebit, quod ʒ. Oleorū liliorum alborū. ʒ. i. s. de castoreo. ʒ. s. piperis nigellę, pyrethri añ. ʒ. i. myrrhę. ʒ. s. euphorbii gr. iiii. cerę quod satis est, fiat unguentū. Medicamentis etiā quę seminis multitudinē augere, et calefacere possunt, utātur, qualia inter simplicia sunt eruca, sinapi, nasturtium hortense, semen rapī, urticę, arī radix, piper, satyrium, orminū, anisū, scylla, orchis: cuius quidem maior bulbus cum lacte potatus, tentiginem cit, minor uero cum aqua potatus, tentiginem remittit. Testes uulpis sicci triti bibiti, innocuā et minime uanam membri tentiginem faciunt. Partes etiā scinci renes amplectētes ad tentiginē pudēdorū excitandā bibuntur. Pudendū cerui arī dum urito, et ʒ. i. cum uino meraciore præbe. Inter cōposita isto uti licebit, quod ʒ. Confectionū diathospliri sarcoticon, diagalāgę añ. ʒ. iiii. diasatyriōn. ʒ. vi. nucum pinearum, amygdalarū dulcium, pistaceorū añ. ʒ. ii. satyri. ʒ. i. radice arī. ʒ. i. seminum erucę urticę, nasturtii hortenensis añ. ʒ. i. s. caudę scinci. ʒ. s. nucis Indicę. ʒ. i. piperis lōgī, zingiberis añ. ʒ. i. s. scobis pudēdi ceruini. ʒ. i. cū saccharo, et syrupo de menta quod satis est, fiat ecligma de quo ante coenam, aut ieiunis, per se, aut cum uino detur drachma una, aut duę.

O iii De sem

Vnguentum.

Simplicia medicamentorum condantia.

Ecligma



Γογο-

γοια.

Causa.

**I** *Γογογοια* Græcè seminis profluvium Latine dicitur. Et est excretio seminis præter uoluntatem, citra pudendi tentiginem. Fit ob retentricis in uasis seminariis facultatis imbecillitate, aut ob aliud malum, quod seminarii uasorum partes eodem modo, quo expultrix secundum naturam facultas mouet: ueluti in comitialibus. & aliis uiolentioribus cōuulsionibus contingit. Oboritur autem aliquando etiam ex seminarii uasorum fluxione. Semen quod profluit, aquosum, tenue, citra appetentiam coeundi, & ut plurimum quidem citra sensum, quandoque uero cum uoluptate quadam promanans. Corrumptur sic patientibus sensim uniuersum corpus, ac gracilescit, præsertim circa lumbos. Consequitur & debilitas multa. Et si pudendo non intento euenerit, retentricis in seminariis uasis imbecillitatem sequitur. Si uero intento pudendo contigerit, cōuulsioni quodammodo similis erit affectus. Non solum uiris, sed & mulieribus accidit, & in foeminis sanè ægrè tollitur. Cura communis est cum ea quæ in omni fluxione adhibetur. Primum igitur in q̄te, paucō cibo, ac aquæ potu egros adseruare oportet. Deinde etiā lumbos & pubem cōregere lanis rosaceo, aut melino madefactis. Neque uero ineptæ sunt spōgiæ poscæ imbutæ. Sequētib. uero dieb. cataplasmatibus, emplastris, & unguentis ex palmis, cotoneis, acacia, hypocisthide, rhoë, & similib. suprā sæpe cōmemoratis, utendū est. In fessibus quoque adstringentibus ex rubi, plantaginis, myrthi, & similiū decocto, uel etiam aquis. Cibis autem utendum qui ægrè corrumpuntur, & difficulter pmutantur & reficcādi uim habent. Dandum etiā cum potu ac cibis, agni seu uiticis ac cānabis semen præsertim tostum, rutæ item semen & folia, lactuce semen & caules, ac nymphetæ (nenuphar hodie appellāt) radix. In potu uero

2. de cau.  
simpt. 2.

Curatio.



uero quotidie pro aqua communi, aqua in qua fer-  
rū sepe extinctū est prębeatur. Quid multa? Omne  
acrium rerū esum, et multi uini potum, et olerū exhi-  
bitionem uitare oportet. Victus uero ratio uniuersa  
resiccatoria et adstringens constituenda est. Ea et  
medicamenta quę semen extinguunt, propinanda:  
Delutū est agni seu uiticis semen, tostū et perfrictū.  
Folia item eius, et flores, uenerem cohibere credun-  
tur, non comesta tantum, sed et in potu sumpta, et sub-  
strata. Portulaca comesta, et lactucę semen potatū, et  
nymphę radix et semen in cibo accepta, semē refrige-  
rando extinguunt. Ruta uero comesta calore suo  
semen corrūpit. Galaminthā autē assidue edentes ge-  
nerandi potētia priuantur. Ex iis atq; aliis eius fari-  
næ medicamētis uaria cōponi possunt remedia, hoc  
potissimū, quod R. Specierū diacumini, diacalamin-  
thę añ. 3. i. s. seminis agni, rutę añ. 3. i. calaminthę añ.  
3. ii. seminis lactucę, portulacę. 3. i. sacchari æquali  
oium pōdere, misce, fiat tragea, de qua detur. 3. i. aut  
3. i. s. in uino austero diluto. Optimū etiā censetur,  
laminā plumbeā lūbis supponere: multū. n. refrigera-  
re cōsuevit. In his uero qui plumbi duriciē ferre nō  
possunt, cōsulere oportet, ut ex p̄dictis herbis quędā  
arefactę substernātur. Potissimū uero ad hūc usum  
cōferūt uiticis folia, et modica ruta ac calamitha: ma-  
xime uero ipsę rosę. Profunt. n. hęc, citra renū læsio-  
nē. Vehementes naq; refrigerationes eorū quę lūbis  
subdūtur, renes iniuria afficiūt. Ipsū etiā stratū non  
ualde molle sit. Decubitus porro ut plurimum in la-  
tus fiat, uitata forma decubitus supina, ne lumborū  
arterię in de calefiant. Post prima autē morbi tempora  
exercitiis egrum committere oportet, quib. totū cor-  
pus, et pręsertim partes patientes cōfirmētur. Bonū  
fuerit etiā, si nihil phibuerit, ad frigidā lauationē de-  
fugere, quę omnē morbū ex fluxione obortū depelle-  
re consuevit, maximē si medicamentaria qualitate

Semen  
extinguitur.

Tragea

O iiii aquę



aqua sit prædita. Conuenit item per interualla quædam iis quæ rubefacere, atq; ea quæ in profundo sunt ad superficiem transferre possunt, uti. Ceterum omnem de rebus ueneris cogitationem excludere oportet.

De exulceratione pudendi. Cap. XLIII.

Pulvis.

**N**aturalium ac pudendorum ulcera citra inflammationem oborta, medicamentis indigent, que uehementer resiccant: cuiusmodi sunt ex chara combusta, anetum ustum aridum, aloë arida in puluerem redacta, præsens sanè remedium: et pistolochie (quæ aristolochia rotunda uocant) radix. Inter composita is pulvis potissimum conuenit, qui ꝑ. Aloës. 3. ii. gallæ. 3. i. s. sanguinis draconis, boli armenie, pöpholygis, id est, thutie añ. 3. i. radice pistolochie. 3. s. myrrhæ. 3. i. gummi arabici nominati. 3. ii. aluminis usti. 3. s. misce, fiat pulvis. At si humidiora ac sordidiora ulcera euenerint, primò dilutiore mulla, mox lacte caprino ulcus abstergendum. Dein puluere iam dicto utendum, aut lapide hematite, aut thure, aut malicorio, aut Iemnia terra in puluere redactis utendum. Quod si simul inflammatio affuerit, hæc ipsa primò remouenda, erit, linteis in aqua stillaticea roïarum, aut solani, aut portulacæ, albo oui adiecto madefactis, et loco patienti admotis.

De ramice. Cap. XLIII.

Ramex.

Ethereo

cele

Bubono

cele

Hydro

cele

**K**ΗΛΗ Græcis, rames et hernia Latinis, rupturæ Barb aris scriptoribus dicta, uariis fit modis, et per adiectionem uarias accipit appellationes. Si enim peritonæo rupto intestina in scrotum deuoluuntur, ΕΥΤΕΡΟΚΗΛΙ græcè, latinè autem ramex intestinorum dicitur. Quando uero intestina supra in inguinibus herent, ΒΟΥΒΑΝΟΚΗΛΗ Græcis, Latinis autem ramex inguinis uocatur. Quod si humor aliquis lentus in scroti parte colligitur, ὕδρoκῆλη Græcis, aquo sus ue



sus uero ramex Latinis appellatur. Quum autem  
 caro dura intra testium tunicas increfcit, σαρκωδης  
 ἢ græcè, carnosus uero ramex Latine dicitur.  
 Quid multa? nomen semper à rebus opplentibus, ra-  
 micis genera accipiunt. Hinc si omentum in scrotum  
 descendat, ἐπιπλοκή, id est ramex omenti nuncupa-  
 tur. Sic ubi ueng ultra modum repletę glomerantur  
 ac dilatantur, κυρσοκή, hoc est uaricolus ramex no-  
 minatur. Ramices intestinorum & inguinis gene-  
 rantur, uel quod peritonęum plus equo extenditur,  
 uel quod frangitur. Vtrunq; uero ex uiolenta qua-  
 dam occasione præcedente, nepe ictu, aut saltu, aut  
 clamore, aut ingētis molis sublatione accidit. A quo  
 sus uero ramex, quandoq; ex occulta, quandoq; ex  
 manifesta causa contingit. Ex occulta quidem, quā-  
 do adauētis uasis in scroto cōtextis, aquosa materia  
 propulsa, & sanguini admixta, ad eas partes decubue-  
 rit. Ex manifesta autem causa, quādo propter percu-  
 sionē collisis aut fractis uasis, sanguis subinde deflu-  
 ens ad aquosam substantiam trāmutatur. Carno-  
 sus ramex itidem ex latente causa nascitur, testiculo  
 fluxionem exerto, induratoq; aut ex ictu, aut impe-  
 rita post ramicis succisionē curatione. Notæ utriq;  
 ramici & intestinorū & inguinum communes. Cōspi-  
 cuus enim in scroto aut inguine tumor, qui in exer-  
 citiis, itinere, spiritus retētiōe, aliisq; occasionibus  
 maior quā prius euadit, cōpressus tardē quidem re-  
 currit, celeriter autem rursus deuoluitur. Peculiaria  
 ramicis ad extensionem relati indicia sunt, quod nō  
 uniuersim, sed particulatim tēporis spacio, & ob cau-  
 sas quaslibet intestinum deuoluatur, tumor equabi-  
 lis & profundus appareat, intestino quod deuolutū  
 est peritonęo constricto. Ex ruptura facti ramicis fi-  
 gnum est proprium, quod uniuersim ab initio intesti-  
 norū deuoluatur, idq; ob causas uiolētas dūtaxat:  
 tumor immensę magnitudinis, inēqualis, & p̄ summa  
 protinus,

Sarcos-  
cele

Epiplo-  
cele,  
Cyrso-  
cele

Signa



Ramicis  
intestino-  
rum & in  
guinum  
curatio.

Ceratum.

Victus.

protinus in cute emineat, quod scilicet intestina ex-  
tra peritoneum elabantur. Aquosus ramex ita di-  
gnoscitur, quod tumor sit dolore uacans, firmus, ac  
stabilis in scroto, quacunq; tandē occasione nō eua-  
nescens, sed in iis qui modicū continent humorē ce-  
dens: in illis qui copiosū habēt, nō item. Et cū aquo-  
sus humor extiterit, tumor cōcolor pellucet: quū fœ-  
culentus, aut sanguineus, aut rubicundus, aut liui-  
dus apparet. Carnosum ramicem color ubiq; sui fi-  
milis cū duritia cōsequitur. si aut tumor in scirrū  
coalescat, nullus nec color nec sensus adest. si mali-  
gni referat naturā, dolor urget punctorius. Ceterū  
ramicem intestinorum & inguinū curamus hunc in-  
modū. Aegro resupinato duduētis cruribus, intesti-  
na sensim reducere, ac reducta deinceps idoneis liga-  
mentis retinere oportet. si uero reductiōi minus ob-  
temperent intestina, emollientia, ac inflāmationē do-  
loremq; leuantia & flatus dissoluentia fomenta, lini-  
menta, balneaq; adhibenda: qualia sunt quę ex mal-  
ua, chamemelo, anetho, seminibus lini, fœnigręci, ca-  
rei, anisi, cumini & similibus cōponuntur. lana etiam  
succida, uino & oleo madefacta, loca dolentia fouen-  
da sunt. reductis intestinis, conandū ut intestina ido-  
neis ligamentis retineantur. In quem usum cerata &  
emplastra sunt adhibenda, potissimū uero hoc, quod  
℞. Picis naualis, mastiches añ. 3. iiii. thuris. 3. ii. hypo-  
cistidis, sarcocollę, acacię añ. 3. i. s. lapidis hematitis,  
sanguinis dracōis, aloës añ. 3. ii. s. boli armenię, sym-  
phyti radicis, gallarū, malicorii añ. 3. iii. uisci querci-  
ni. 3. i. s. aristolochię utriusq; 3. ii. rhois, balaustiorū  
añ. 3. i. sepi hircini. 3. ii. terebinthinę & cere quod sa-  
tis est, gūmi antea in aceto aut uino dissolutis, for-  
metur ceratū quod in pelle arietis impositū allige-  
tur, nec ante septimū aut nonū diem soluatur. Inte-  
rea eger in lecto maneat diebus triginta, & à cibis in-  
flantibus abstineat, uino copiosiore, uehementi m-  
tu, nemi-



tu, nempe cursu, saltu, clamore & id genus aliis: bibatq; decoctum, quod & pedis leonis, saniculæ, herbæ fortis, (quâ consolidâ sarracenicam uocant) eupatorii an. M. i. cynoglossi officinarum, polygonii, clematidis daphnoidis, plantaginis an. M. s. radices symphyti .3. s. radices symphyti petregi. 3. v. seminis myrthi. 3. iii. balaustrorum. 3. ii. foliorum lauri. 3. i. s. bulliant in uino & aqua iustę quantitatis, quoad tertia pars absumpta fuerit: dein coletur, & cū saccharo fiat potio delectabilis, de qua singulis diebus matutino tēpore dentur. 3. iii. Ceterum maxime etiam annitendum: ne alius indurescat; ne scilicet si nimio conatu stercora excernantur, simul intestina iterū deuoluantur, Utendum quoq; conuenienti, ut antea diximus, deligatura, præcipue si occasio motum præcipere. Porro aquosus ramex per ea quę calefaciunt & exiccāt medicamēta curandus, ut est farina fabarū, bacce lauri, semen lini, dauci, altheę: & id genus alia, de quibus Cap. de Ascite, & reliquis aquę inter cutē generibus abunde dictum est. Chirurgicam prædictarum, omniumq; aliarum ramicum specierum curandi rationem lib. 6. capi. 62. & sequentibus copiosissimè tradit Paulus: quam ut hic tractemus, non est nostri instituti. Quare ad uterī pathemata, p̄grediemur.

## De suppressis mensibus. Cap. XLV.

**M**ulieribus quibusdam menses supprimuntur, uel naturaliter, uel præter naturam. Si naturaliter: hinc colligere licebit quoddam mulier nulla inde molestia uel totius corporis, uel uterī afficiatur ætatis itaq; ratione plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt: paucissimis ante tertium decimum: aut duodecimū: plerisq; autem post quartum decimum erumpunt. desinunt uero aliis anno quinquagesimo. paucis autem usq; ad sexagesimum durant, steriles etiam mulieres; in utero habentes, & sal-

Decoctio  
gluti-  
nans

Ramex  
aquosus  
curatio

Causa.

Quibus  
naturaliter  
mens  
se sup-  
primatur.

trices



Quibus  
præter  
naturam  
menses  
deici-  
untur.

Signa.

trices naturaliter non purgantur. Nam quicquid in eis recrementi est, nimia exercitationis uehementia absumitur. & ut summam dicam, mulieres calidioris temperature, ualidisq; exercitiis utentes, & agrestes, parum aut nihil per menstrua purgantur. Nonnunquam autem præter naturam menses nimia uel pinguedine uel gracillitate suppressi solent. Pingues enim exanguiore reliquis sunt, minimasq; uenulas habent: quicquid illis inest paucissimus sanguis, ferè in pinguedine transit. Graciliores uero ob diuturnum quem morbum extenuate, nihil prorsus superuacui sanguinis continent. præterea menses non defluunt, quibus sanguis uel crassus, uel lentus, uel per alia loca delatus fuerit: sicuti per nares, aut sedem. aliis etiam, quod è thorace sanguinem eiecerint, aliis quod è dissecta uena ultimam sanguinis inanitionem tolerauerint, menses suppressi sunt. sed & reliqua excretionum genera idem sepe effecerunt: ut sudoris multitudo, assidui uomitus, alui profluvia, ac pustularum omne genus quod in cute efflorescunt. sic præter has omnes causas menses supprimuntur, ob acutos maximosq; morbos, & ob alimenta, quæ uel paucitate, uel multitudine sua exceßerint. A paucis enim alimentis paululum quidpiam confestim expirat, a multo uero meatus obstruuntur, & excretio intercipitur. sæpe etiam in ore uteri calli oborti, aut carnis excrescentiæ, aut pinguedinis copia purgationem menstruam impediunt. Quibundam etiam cicatrices ulcerum, quæ in utero præcesserunt, uasorum ora a quibus sanguis in uterum ferebatur, obstruxerunt. Nonnullis post abortum uteri ore exulcerato, ac deinceps ad cicatricem ducto, obstructio ac compactio superuenit, quod sanguinis per uterum excretionem aufert. Cure quoq; pertinaces, formidoseq; immodica, & ingens moeror menses intercipiunt. Frigida deniq; aut alia uteri intemperies menses remoratur. Suppressa menstrua totius corporis graui-



grauitas, nausæ, fastidia, et horror inequalis consensuuntur. dolores præterea circa lumbos, fœmora, collum, sinciput: et fundamenta oculorum existunt: item febres ardentes, et urina nigricantes, cum rubra quadam sanie: perinde ac aquæ, ex qua nuper mactate carnes ablute fuerunt, fuliginem quis miscuisset. quibusdam etiam urina aut difficulter redditur, aut omnino supprimitur. Causarum uero diuersitas magna ex parte de sermonibus ægri cognosci potest. frigidioris autem temperaturæ fœminas ex iis potissimum dignoscemus, quod somnolentiores: ad omnemque motum segniores sunt, ac colore cædidiores: seu plumbæ, urina aquosa, et aliis quæ iam sepe dicta sunt, pituitam quoque iugiter excreant, et interdum etiam pituitosos humores euomunt. Calidioris autem temperaturæ notæ, iam commemoratis prorsus contrariæ sunt. Plenitudinis uero, quam obstructio consensquitur: notæ: ex aliis Capitibus colligendæ, quæ enim hac ipsa laborant mulieres, menstruum tempore magis grauantur, doloresque circa lumbos et pubem percipiunt, uenæque illis in tumorem insignem eleuantur. Cæterum si à frigidis ac crassis humoribus menses supprimuntur, cibos calidos et extenuantes, de quibus iam sepe est dictum, exhibebimus. Vinum etiam fuluum, odoratum: et antiquum ut bibant precipiemus. exercitia quoque, et alia quæ corpus calefacere, crassosque ac lētos humores incidere et extenuare possunt, prescribemus. Si plenitudine laborauerit mulier: et nihil aliud prohibeat: à sanguinis missione curandi ratio inchoanda erit. Secunda uero uena maleoli aut poplitis, idque non ante statum mensium tempus. neque inutile erit, cruribus cucurbitulas affigere. Sin plenitudo nulla fuerit, purgatione utendum, humoribus tamen antea ad expulsionem preparatis. In quem usum hoc decoctum exhibeatur: qd B. Radicum acori, iridis, oreoselini, asparagi añ. ʒ. i. seminū apii, fœni

Frigidioris  
temperaturæ  
notæ.

Calidioris  
Plenitudinis.

Frigidioris  
temperaturæ  
ratio.

Decoctum



Menses  
euocant.

Pess.

fœnicul: rusci: anisi, dauci, ammi, urticæ añ. 3. i. cala-  
minthæ: absinthii añ. M. s. origani: abrotani: artemi-  
się, pulegii: asari añ. M. i. hyssopi. M. i. s. cinamomi es-  
lecti. 3. i. s. buliant singula in aqua iustæ quantitatis  
quoad tertia pars absumpta fuerit. dein excolentur  
et saccharo sufficienti adhibito, adiciantur syrupi de  
calamintha: de hyssopo: de marrubio añ. 3. i. s. misce  
fiat potio: qua hausta, purgatorium sumatur medica-  
mentum aliquod, nimirum hiera picra ecligina diaphoe-  
nicon, indi: catapotia de agarico, de benedicta, aut si-  
milis. à purgatione exercende mulieres potissimum ob  
ambulationibus, et inferiorum frictionibus. Fomenta-  
tiones denique, inunctiones, et balnea ex chamemelo,  
artemisia tenuifolia, mentastro, et aliis quæ in deco-  
cto paulo ante memorata sunt oleis de lilio, rutaceo  
et similibus parata: adhibenda. Post hæc medicamen-  
ta, quæ suppressos menses euocant protinus: ut sci-  
licet adhuc calido et soluto corpori occurrentia ui-  
res suas ostendant: exhibenda. in quem usum confe-  
runt myrrha: castoreum: baccæ lauri: rubea tinctio  
piper: saluia: ruta: sauina: casia, et alia quæ supra com-  
memorata sunt. Vnice autem hoc confert, quod R.  
castorei. 3. i. mentastri in puluerem reducti. 3. s. uini  
antiqui aut mulsi. 3. iiii. misce, et à balneo calido per-  
pinato. Benefacit etiam decoctum pulegii, artemisię  
rute, cumini: dauci, saluię, aneti, ammeos, fœniculi,  
inulæ, et similium. Calaminthæ etiam in puluere re-  
ductæ. 3. ii. aut sauinę. 3. i. in uino aut mulsa pota. mi-  
rifice conducunt pastilli de myrrha. Absinthites au-  
tem uinum per totius curationis decursum bibendum.  
Pessis etiam in uterum demissis, necessitate sic exigente,  
utendum: ex quorum numero hic est, qui R. trise-  
re magnæ citra apium. 3. i. farinæ erui, nigellę, rubę  
tinctorum, artemisię, pulegii añ. 3. i. s. succi rute. 3.  
ii. misce, fiat pessus: qui cum lana uel gossipio suppo-  
natur. Et hic qui R. Myrrhę, bdellii, styracis añ. 3. i. ca-  
lamin-



aminthe: abrotoni, absinthii añ. 3. i. s. radicum aco-  
 ri, rubeg tinctorum añ. 3. i. seminis nigelle: rutę ari-  
 de, baccarum lauri añ. 3. 2. sauing. 3. 1. castorei. 3. s.  
 Redigantur singula in puluerem, & cuz melle, aut tri-  
 phera, aut methridati antidoto quod satis est formē-  
 tur pessi. Metrenchytis etiam utendum, in quę usuz  
 utero infundimus olea calida: irinum nimiruz, lilia-  
 ceum, laurinum: & similia. Suffitis etiam ex styrace,  
 chalbano, thure: bdellio, radice aristolochię, artemi-  
 sia, nigella, garyophyllis, cinamomo, & similibus pa-  
 ratis utendum erit. Fouendus quoq; uterus odora-  
 tis fomentis maiorana, serpillio, calamintha chamę-  
 melo, pulegio, artemisia, radice iridis: & similibus in  
 olla decoctis: quam operculo perforato operire oꝝ,  
 arundinemq; aut alium canalem foramini insertuz  
 undiq; circumlinere, ut deinde sedens mulier exce-  
 pto canali foueatur. Proderit etiam, ut mulier hinc  
 decocto usq; ad umbilicum infideat, & inde pessos  
 paulo antea memoratos sibi admoueat. Cæterum  
 calidiores & plurimuz exercitatę mulieres curantur  
 si quàm maxime humectentur uberiore humidio-  
 req; cibo ac potu: quales sunt qui è carnibus agni,  
 hoedi, è piscibus teneras carnes habētibus, auibz al-  
 tilibus, & similibus parantur. uino utendū candido,  
 non admodum antiquo & diluto: balneis item dul-  
 cium aquarum. & ut in pauca rem contraham, uictus  
 ratione ea utendū, quę hecticis adhibetur. Reliquę  
 curationes ex suis petantur Capitibus.

Metren-  
 chite.  
 Suffitus.

Fomenta.

Inseſſus.

Calidior-  
 teperatu-  
 re curatio

### De redundantibus mensibus. Cap. XLVI.

**R**edundare menses in mulieribus dicimus, quā-  
 do ultra consuetum tempus purgationis ma-  
 gna copia effluxerint. Tempus autem unicuiq;  
 purgationi statum & ordinatum nō est, multis enim  
 ad duos tresuē dies, haud paucis usque ad quintum  
 profluit, aliis etiam ad septimuz usq; rard ad duode-  
 cimum



**Cause.**  
**Signa.**

cinum purgate sunt. Fit ob fracta aut aperta uasa, uel magna, uel parua. Amplioribus uasis ruptis aut apertis: confertim sanguis profluit. minoribus uero apertis: sensim: nec magna copia promanat. Ab erosione si accidit: tum non solum paulatim, uerum et cum maximo dolore effluit. Porro quum immodice promanant: menses color foedus consequitur, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prostermitur, uiciatur ciborum tum appetitus: tum concoctio: atque in totum omnia, quae immoderatam sanguinis uacuationem siue ex hemorrhide, siue alio quopiam sanguinis fluore euenientem sequi consueverunt.

**Curatio**

**§ Aph. 50**

**Medica-  
menta me-  
ses con-  
stringē.**

**Pluie.**

In primis igitur artus & extrema corporis ab alis & inguinibus, uinculis excipere oportet. Cucurbitulas etiam leues magnas subter mamillas, iuxta Hippocratis sententiam: affigere conuenit. Cibis & potionibus austeris & adstringentibus utendū. Assis autem potius quam elixis uescatur ægra: carnibus potissimum: quibus suapte natura desiccandi facultas inest, ut auium montanarum, & agrestium animalium. motu & uino abstinendum, & pro eo adstringenti potione utendum. Medicamenta adstringentia simplicia in potu propinanda, hæc sunt. balaustrum, hypocisthis, acacia, coralli, lycium, terra lemnia, galla, polygonum, symphyrum utrumque, hematites, calyces glandium, plantago, oxyacantha, & similia. Composita, syrapi rosaceus, myrthinus, pastillide succino, & terra lemnia. Item hæc catapotia, quæ & terræ lemnis, boli armenis, thuris, mastiches, galla um añ. 3. 2. sanguinis draconis, hematitis añ. 3. 1. cornu cerui usti. 3. 1. hypocisthidis, acaciæ, corallorum rub. añ. 3. 5. balaustrorum, rosarum rub. añ. 3. 2. succini. 3. 1. cum syrupo myrtino formetur catapotia, de quibus 3. 1. aut 3. 1. s. propinabimus. Extrinsecus unguenta, emplastra, cerata, & epithemata adstringentia, utero adhibeantur: qualia multa supra in Capi. de Dysenteria,



ria, diarrhoea, & lienteria dicta sunt. Infeſſus etiaꝝ ex decocto prædictorum medicamentorum parati conueniunt. item q̄ utero iniiciuntur: in quem uſus plātaginis ſuccus mirificè confert. Succus item polygōni, aut ſolani, aut hypociftidis, aut acacię, & ſimilēs. peſſi quoq; utiles ſunt, qualis eſt q̄ R. Thuris, balau. gallaruz añ. 3. i. gummi arabici, acacię, ſuccini, cornu cerui uſti añ. 3. ii. boli armenii. 3. 2. ſingula redigantur in pollinem tenuiſſimū, & lana roſaceo intincta excepta, in mulieris pudendū immitatur. Porro fluores alii uteri diuturni, *ῥευματισμοὺς* uocant Gręci, q̄ interdum rubri, interdum albi, interdū pallidi, ſepe etiam aquoſi ſunt, eodem ferè modo curantur: niſi quod in rubro fluore primū, ſi ętas & alia pmiferint, ad ſanguinis miſſionem uertimur. Naꝝ multa ſequerentur incommoda, ſi conſeſtim ſanguinis impetuz localibus remediis reprimere conaremur: nempe hydrops, neruorum, aut oris uentriculi, uel capitis pathemata. Ablationē uero ſicut in iis qui ſanguinem excreant, partiri opz, ut paulatim prolixiori tempore auerſio fiat. Secunda uero erit in cubito uena: de in iis quę antea cōmemorauimus utendum. Fluore autem albo infeſtante, in principio quidem reſiſtendum non eſt, ut aliena ē corpore excernantur: neq; præter rationem erit, ſi quod pituitam purgat medicamentum adhibeas. toti etiam corpori auxilia q̄ citra manifeſtū calorem exiccant, admouēda, ut frictiones, unctiōesq; ex melle. ſuperiorum uero præcipue partium exercitationes, ut uocis, conueniunt. medicamenta quoq; craſſos & pituiſoſos humores extenuantia, urināq; ducentia, ut aſarum, fœniculū, apīū & ſimilia, danda. Vtero aut moderatē adſtringentia applicanda. abſtergentibus ēt utenduꝝ, ne ſcilicet ab humore trāſeunte ulcus inferatur. Aq̄ igitur calida iugiter ſanies abluenda, dein roſaceū: aut myrthinū aut melinū oleū, & alia q̄ prædicta ſunt, admouenda.

Peſſulus.

Curatio  
fluoris  
liebris.  
Rubri.

Abi.

P Deuteri



## De uteri suffocatione. Cap. XLVII.

Suffoca-  
tio.

Causa.

Signa.

Curatio.

Quæ in  
accessione  
facienda.

Strangulatus seu suffocatio uteri, ad superiora eiusdem recursus est. Grecis *ὑπερπνεῖα* dicitur superiores ac principatum obtinentes partes in passionis consensu perducit: nempe carotidas, cor, cerebriq; membranas. Fit ob retenta menstrua, cohibitum semen, ut copiose Gale. lib. 6. de patientibus locis Cap. 5. ostendit. Hec enim flatuosam quandam refrigerationem, ut inquit Aetius: in utero excitant quæ subinde cordi & cerebro communicatur. Contingit etiã refrigerato utero, quo tempore menstrua purgationes effluunt, uel ob difficilem quempiaq; aborsum, uel ubi quis sanguinis eruptionem ab utero repente sistere properauerit. accidit patientibus: cum accessio propinqua est, torpor mentis, pigritia: crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus inæstus. Quum uero iam instat strangulatus, inclinatio ad somnum, desipientia: detentio instrumentorum sensus, uox obmutescit, cruraq; contrahuntur: pulsusq; parui & debiles fiunt, sæpe & penitus abolentur. Cum remittet, mox ille rubescere incipiunt, oculi attolluntur & aperiri. Humiditas etiam quædam a locis muliebribus tactu perceptibilis excurrit, ac intestina immurmurant: ipseq; uterus paulatim laxatur, atq; sic ipsis mens, sensus: & motus redit. Ceteruz passio iuxta circuitum mouetur, sicuti comitialis: idq; utero, ut diximus, repleto, aut seminali, aut alia quæ in eo putrefit materia. Multe rursus se a morbo colligunt, nõ nullæ uero in ipsis accessionibus subito pereunt. idq; accidit, ubi pulsus crebriores & inordinati fiunt, ac subinde in totum abolentur. Postremo frigidus & modicus humor superficiem irrorat. porro malum hoc hyeme & autumno magis infestat iuniores, ad uenerem procliues: steriles: præsertim si ui medicamentorum tales factæ fuerint. In accessionibus igitur extrema deligare oportet, cumq; deligationibus crura tota,



tota, totumq; corpus perficere & ueluti animo defici-  
 entes recuperare. Narib. foetida admouenda: uerbū  
 gratia, funiculus lucernę extinctus, castorium, galba-  
 num, pix liquida, lanę, lacinięq; combustę, & alia eius-  
 modi. Cucurbitulas quoq; inguinibus, & imo uen-  
 tri cum multa flamma & leues affigere conuenit. Qd  
 si accessio prolongetur, etiam quę flatibus educen-  
 dis utilia sunt, sedi supponere oportet. Hęc autē ex  
 Cap. de coli doloribus petenda ueniunt, In uterum  
 unguenta & olea odoratissima infundere oportet, ut  
 est amaricinum, & quod spicaceū hodie appellatur,  
 irinū, & similia. Hęc ē obstetrix digitis capiens, usq;  
 ad os uteri immittat, leniter ac multum defricans, ut  
 eo irritamēto crassus humor excernatur. Pręter hęc  
 omnia mulier maximis uocibus excitetur ppiūq;  
 nomen inclametur. Hoc tempore ea etiam sunt ad-  
 mouenda, quę sternutationes excitant: ut castoriū,  
 struthiū (cōdifi barbari uocant) & piper. Neq; inuti-  
 le erit, si infessiones ex decocto baccarum foliorūq;  
 lauri, pulegii calaminthę, artemisię, marrubii, sauię  
 althę chamęmeli, serpilli, iridis, aristolochię, & fœ-  
 nogręci parentur. Infessionum tamen tempore cere-  
 bri curaz non omittemus, sed rosaceo & aceto caput  
 irrigabimus. Vbi accessio quieuerit, ad uomitū co-  
 gantur. omnes enim uomitus leuat, sed eas pręsertim  
 quę a cibo infestantur. In tertio die lumbis & iliis cu-  
 curbitulę cum scarificatione applicentur. A septimo  
 die purgatione utendum ex hiera de colocynthide,  
 aut catapotiiis de agarico. Mox ad castorii potionē  
 ueniemus, quod iugiter potū ab hoc malo protinus  
 liberat. dandum autem singulis diebus ad drachmę  
 pondus, interdum cum mulsā, interdum cum arte-  
 misię decocto, nunc cum uino tenui. hoc etiam tem-  
 pore infessionibus & pessis mollientibus ex adipe an-  
 serino, styrace, mastiche, amoniaco, & similibus con-  
 fectis uti licebit. uterus etiam iis quę calefacien-

P ii di,

Quę post  
 accessio-  
 nem agen-  
 da.



*Suffitus.*

di, statumq; educendi uim obtinent, sufficiens. Vtē dum autem hoc potissimum, qui & pastillorum gal-  
 liae & alipte moschate añ. 3. i. s. styracis. 3. iii. charyo-  
 phyllorum, maceris añ. 3. i. ligni aloës. 3. ii. cinamo-  
 mi electi, foliorum lauri añ. 3. ii. ladani. 3. ii. s. redactis  
 singulis in pollinem subtilissimum cum stacte, quā  
 storacem liquidum appellant, sunt trochisci. Cibo  
 interea & potu paucis admodum contenta sit mulier,  
 totaq; uictus ratio exiccatoria sit. atq; hæc ad acces-  
 siones proficiunt. In totius uero corporis curatione  
 potissimum si malum diuturnum fuerit, plerunq; à  
 sanguinis missione, præcipue si menstrue purgatio-  
 nes detineantur, auspicandum. deinde ad purgatio-  
 nem ex hiera picra transeundum. peracta euacuatio-  
 ne cucurbitulæ leues quidem, sed cum multa flamma  
 affigendæ. Nec inutiliter sinapismi, & dropacismi, ex  
 euphorbio, pyrethro, pipere, & sinapi confecti appli-  
 cantur. Non parum etiam recta uictus ratio opitula-  
 bitur, nempe deambulationes matutine, gestationesq;  
 uel in curru, uel naui, uel iumeto. A gestationis mo-  
 tu uociferatio, & lectio clara modulata cōcinna uti-  
 lis est. unctio p̄terea, frictio, & exercitatio ex cōgruis  
 interuallis repetita, eisdem cōueniet. balneū aque dul-  
 cis rarius, & nō nisi sordidū abstergendarū gratia adhi-  
 bendum. Balneis uero naturalib. uti, optimum est.

*Uictus**Totius  
corporis  
curatio.**Uictus.*

De uteri procidentia. Cap. XLVIII.

*Prociden-  
tia.**Causa.*

**P**ROCIDERE uterum dicimus, quando ita euerti-  
 tur, ut exterius emineat. neq; enim uterus, ut  
 imperiti suspicatur, à suis solutus propaginibus  
 totus decumbit. nam si ita procideret, restaurari mi-  
 nime posset. Sunt uero procidendi uteri causæ mul-  
 tæ. Ab alto enim delapsa mulier, si in coxas deciderit,  
 membranis quæ uterū cōtinent, & uicinis partib. con-  
 nectunt, ruptis, hoc malo corripitur. accidit etiā ut  
 procidat uterus in difficili partu, propter secundæ ex-  
 tractionem



tractionem, quam uterus illi adhaerescens sequitur. item ob inertem & imperitam foetus extractionē, uel istum, uel immensi ponderis eleuationē, uel animi affectus, puta filiorum amissionem nunciatam, aut hostium accessum, uel ob periculosam nauigationem: aut eiusmodi aliquam causam, omni eo quod cōcre tum est soluto, utero etiam simul collapsio. Aut ob resolutionem, aut partium (membranarū nimirum & musculorum) imbecillitatem, ut in senescentibus maxime accidit. Procidit sepe ob humoris plurimū ac tenacis defluxum, partuumq; frequentiam laxatis ac solutis appendicibus. Procidit uero potissimū secundū os eius, & quod procidit ouo struthiocamelī simile est, maioris tantum & minoris ratione differens. Signa satis manifesta sunt, & causarum diuersitas facile de egrotantis aut assidentiū sermonibus cognoscetur. Quū itaq; recens adhuc malum est, studere oportet, ut uterus inseratur, ac in suū reponatur locum. In principio si quidem facile repositioni pareretur, & recte locatus perseverat, precipue si etas conuenit. nam in prouectioribus uterus quidem reponitur, sed rursus qualibet leui causa relabitur. Conuenit igitur: duris stercorebus primū euacuatis, urinaq; in uesica collecta excreta, quo uterus undiquaq; sit liber: & neq; ab intestino recto, neq; à uesica cōprimatur, egram supinā figurare: ut coxas habeat sublimiores: poplites flexos, crurib. inuicē dilatatis ac diuaticatis. deinde p̄ lapsam uteri partē oleo tepido: uel butyro: uel malug: altheę: fœnogræci: seminis lini, aut similibus decocto fouentes, cōuolutā lanā p̄parabimus: figura & crassitudine sinui muliebri p̄portionalē: tenui & puro linteo exterius circūdatā: ac deinceps in succū acacię: uel hypocisthidis uino dilutis mersā utero inseremus, & citra uiolentiā ac sensim totū q̄ procidit sursum torquebimus, quoad integer in sinu tumor excitetur: & uterus in propriū reponatur locum. Ex

P iii trinsecus

Signa.

Curatio.



trinsecus aut pubem spongia in posca expressa operiemus. mulier iacebit extensis adaptatisq; inuicem cruribus, ut alterum alteri incumbat. tutius tñ erit, pedes simul uinciri, fasciam usq; ad genua deducendo. Deinde cucurbitę cum flamma copiosiore, umbilico et utrisq; ilibus affigendę. Naribus odorata iugiter admouenda. Tertio die lana adhuc in sinu persistente, mulier in uino nigro austero modice tepido, aut in decocto myrti, rubi, malicorii, et similium inuidebit. his peractis sursum supina, accliuibus coxis, locabitur: sublataq; ẽ sinu priori lana. altera in uicem prioris eodem medicamento madefacta imponitur. Cataplasmata et emplastra a foris imo uentri, imponentur ex palmulis, polenta, malicorio, lenticula, et similibus. Cerata etiam ex mastiche, ligno aloẽs, ladanio, thure, iunco odorato, acoro, nucẽ moschata, gũmi arabico, tragacantha, et eiusmodi medicamentis parata conueniunt. singulis uero tribus diebus hæc usq; ad perfectã curationẽ permutetur. Toto etiã curationis tẽpore mulier motũ, et ea quę sternutamẽta excitat, euitet. Vt autem naribus odoratissima sunt adhibenda, sic uterus ab infernis foetidis rebus suffundendus est. Gibi boni succi, et uina odorata offerenda. uenter quoq; leniendus, ne si cũ difficultate sit egerendũ, simul uterus procidat. Obseruandum tamen, ne nimis uenter subducatur. exoluitur enim, relaxanturq; propinque partes, et uteri loca procidunt. Porro si pars prolapsa diuturnitate temporis propter incuriam putruerit, ob assiduamq; urinę irrigationem et sordem inherentem exulcerata fuerit, amputandum, aut inurendum quod inutile fuerit, nullius metu periculĩ, erit. constat enim, totum uterum putrefactum quandoq; amputatum et ablatum fuisse, ac mulierem superuixisse.

De mola.

Vetus.



**M**ΥΛΗ, hoc est mola, induratus est tumor, interim in uulue ostiolo, interim in toto utero ipso prominens, ad tactū ferè lapidosus. uel ut Galenus lib. 14. Ther. meth. definit, est caro informis. nomē à motus difficultate et grauitate assumpsit, quam sentiunt quę malo hoc afficiuntur mulieres. Fit à seminis muliebri, et plurimū sanguinis menstrui in utero retentione et affluxu, quem calor immodicus co- git ac in carnis formā transmutat. Consequitur hoc malū tumor durus cū hypochondriorū cōtractione corporis gracilitate, decoloratione, appetentię deiectiones, mensiūq; suppressione. Item mammillę intumescunt, ut conceptionis quibusdam per initia suspicio suboritur. Temporis uero progressu discernuntur. molam enim punctionis sensum inferēs dolor subsequitur, nec in ea motus ullus, sicut in cōceptione, percipitur. Nonnullę uero præbent aque intercutē suspicionē: à qua tamē distinguitur, quod tumor durus sit, nec sicut in hydrope manus aut digitorū impulsu cedat, aut tympani modo sonū edat. Nonnunquā tamen tempore procedente iecur refrigeratur, et hydrops superuenit. Primum omnium alimenta boni succi offerēda, ac uini potione utendū moderata mulier motu nō utatur uehementi, is enim fluxionē cōmouet: sed gestationibus, et deambulationibus. pedes etiā decubendo elatiore habeat. Quod uero ad curādi rationē attinet, principiō in plenitudine uena cubiti incidēda, ac subinde purgatione per catapotia foetida utendū. corpore uacuato cataplasmata, fomēta, infusiones, pessū unguēta et cerata quę relaxādi uires habēt adhibēda: qualia sunt quę ex althea, malua, chamemelo, meliloto fœnogræco, semine lini, et similib. parātur. Cōueniet in hūc ulū unguētū dialtheę, aut emplastrū de meliloto, diachylō simplex

**R** iiii adinouere

Mola.

Causa.

Signa.

Vicius.

Curatio.



**Vnguentum.**

ad mouere: uel hoc quod R. Oleorū amygd. dulciū 3.iii. liliacei 3.ii. s. pinguedinis anseris, gallinæ añ. 3. i. s. mucositatis seminis lini, fœnogræci añ. 3. i. amoniaci, bdellii añ. 3. ii. radicis altheæ, seminum nigellæ, dauci añ. 3. ii. cerę quod satis est. fiat unguentū, gummi dissolutis prius in uino. Pessī quoq; subiiciendū ex butyro, adipe porcino, medulla ceruina, passulis, caricis pinguibus, seminib. lini & fœnogræci cōfecti.

**Pessī.**

Post hæc quæ menses euocare possunt, propinanda medicamēta. in quem usum præter ea quę in Cap. de Suppressis mensibus commemorauimus, conuenit hæc confectio, quæ R. Specierum diacinamomi, diagalagæ, diacumini añ. 3. s. specierū diabreg. 3. i. dialacæ. 3. s. cinamomi electi, hyperici, calami odorati, asari, radicis acori, seminis anisi. añ. 3. i. seminis rutæ, zingiberis, artemisię, marrubii, dictamni, saluię añ. 3. s. sacchari. 3. vi. dissoluti in succis artemisię & hyperici, fiat confectio in morsulis. de qua quotidie detur. 3. ii. aut. 3. iii.

**Confectio.**

**Pessus.**

Proderit & hunc pessum subiicere, qui R. Radicis asari, acori, rubiæ tinctorū añ. 3. ii. seminum rutę, nigellę añ. 3. s. maiorang, nucis mirificæ, garyophyllorum, baccarum, lauri añ. 3. i. sauię 3. i. castorei, euphorbii, añ. 3. s. Redigantur singula in puluerem, & cum terebinthina resina formentur pessī. Mirificę etiam confert uti balneis naturalibus, potissimum si malum diuturnum fuerit.

### De inflammatione uteri.

### Cap. L.

**Causę.**

**V**terus plurimis de causis inflammatur, nempe ex ictu, mensium retentione, abortu, ulceratione, concubitu metas rationis excedente, sellæ nimis durę in sessione, longissima intentissimaq; deambulatione, sæpe & transpiratione ob frigus prohibita. Hanc monstrant uteri, pubis, & lumborum dolores, febris acuta, dolor capitis, & radicis oculorum, brachialis, digitorum & colli conuulsio: & in aduersum

**Signa.**



aduersum declinatio, stomachi ex consortio dolor, oris uulug conuiuentia, pulsus exigui, crebriq;. Si languida fuerit inflammatio, haud ualido uteri dolore afficiuntur. Sin uehemens, & ipse totus pulsatilem dolorem percipit. Vniuerso sanè inflammatione laborante, undiquaq; parte autem eius inflammatione obsessa, in ea dolor magis intenditur. Nam si posteriora ipsius solum laborent inflammatione, dolor lumbos magis uexabit, durumq; stercus detinetur, quoniā intestinū rectum cōprimitur. Si priora dolor pubem occupat, & urine stillicidiū, aut difficultas, uesica pressa, excitatur. Laterib. aut inflammatione correptis, inguina tenduntur, & crura grauatur. *Supra* Posteriore uero uteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimū cum tumore infestat. Quum aut os uteri inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoq; immisso os occurrit durū rigidūq;. In principio itaq; curationē aggressi, si neq; etas, neq; habitus corporis, neq; anni tempus obstiterit, neq; inflammatio post abortū, aut immensam sanguinis euacuationē superuenerit, uenā poplitis secabimus ex Galeni decreto, qui in Lib. de Curadi ratione per uenæ sectionē inflammationē uteri à uenis in crure sectis iuuari scribit. Aegrā in domicilio obscuro, & moderatē tepido collocabimus, quietē imperātes, ac crura eius ab omni motione, prohibentes. deinde artus & extrema perfricabimus. In cibo, qui quantitate modicus sit, utatur egra ptisanæ cremore, & ouis sorbilib. Potus sit decoctū cinamomi aut hordei. Extrinsecus lana ex oxyrhodino madefacta, pubi & lumbis imponatur. Palmulę etiam, aut mala cotonea, in uino decocta, & rosaceo admixta, applicāda. Cataplasmata quoque ex farina seminis fœno græci, lini, meliloto, plātagine, lentib. polygoni, portulaca, sedo, & similib. confecta adhibēda, idq; potissimū si erysipelatis naturam inflammatio sortita sit. Lana cum rosaceo  
aut me.

Curatio.

Venæ sectio.



aut melino oleo, aut succo portulacę aut sedi made-  
facta, in sinum uteri immittenda. At ubi inflamma-  
tio declinare cęperit, ad ea uenimus, quę quadate-  
nus remittendi discutiendiq; uires habeant. Aegro-  
tam igitur in fœnogreçi, althę, se. lini, malug, inter-  
dum artemisę, marrubii, & saluię decocto usq; ad lū-  
bos sedere iubebimus. Pubi etiam & lumbis hordea-  
ceam farinam cum fœnogreco & semine lini in mul-  
sa elixatam, aut caricarum decoctum illinemus. Pessū  
quoq; subiiciendi ex butyro, medulla ceruina, adipe  
anserino, gallinę & similib, confecti. Reliqua deniq;  
quib, emolliendi facultas inest adhibenda, de quib,  
iam sepe dictum est.

De sterilitate remouenda. Cap. LI.

Cause

**S**terilitas aut uiri aut mulieris ratione accidit.  
A uiro est: cū semen eius uel feruidum, & uelut  
torrefactum, uel frigidum, tenue aquosum, lan-  
guidū, quale decrepitorū est: uel crassius quā opor-  
tet emittitur, uel qđ uiri semispadones sint penemq;  
breuissimum habeant, ut in uulū recessum semen iā-  
culari nequeant. Quod etiā interdum nimia obesi-  
tate cōtingit. obesi enim tam uentricosi euadūt, ut  
semen ad profundiores uteri partes iaculari nō pos-  
sint. Mulier uero sua ipsius ratione non concipit,  
quod uterū habeat uel calidū & igneū, uel frigidum  
& humidū: uel squalentem & aridū. Nam ut Hipp. ait:

f. Aph.  
62.

“ Quęcunq; frigidos & densos uteros habent, non cō-  
“ cipiunt. & quęcunq; prę humidos obtinent uteros  
“ non concipiunt extinguitur enim in eis genitura. Et  
“ quęcunq; siccos magis & torrefactos: nā ex defectu ali-  
menti corrūpitur semen. Cætetū crassę admodum  
& obese, haud cōcipiunt, quod itē etiā Hippocr. iis te-  
“ statur uerbis: Quęcunq; pter naturā non cōcipiunt  
“ utero: iis omentum os uteri cōprimit: & priusq; exte-  
“ nuentur nō cōcipiunt. Graciles deniq; & macilentę

f. Aph.  
46.

non



non concipiunt: aut si concipiunt, statim abortiunt, eodem Hippocrate teste, qui sic scriptū reliquit: Quę s. Apb. cunq; p̄ter naturam tenues existentes utero gerūt, 44. abortiunt priusq; crassescant. Quędam etiam non concipiunt, eo quod uterus earum debilis est, uel angustus, uel brevis, aut quod uasa eius obstructa clausaq; sint, aut cicatricis superuentu excæcata, aut quod uteri ceruix in obliquum ducatur, aut quod os eius uel nimis angustum, uel nimis amplum sit. Signa quibus diuersitas causarum discernitur, hæc sunt. Calidius siquidem temperamentum uiri facile deprehenditur ex pilorum copia, potissimum uero nigrorum in partibus genitalibus, et omnibus quę circum stant, suprà quidem usque ad media femora. Petulca etiam est hæc temperatura, et ad libidinem prona: statim uero satiatur. Frigidius temperamentum monstrant partes circumpositę testib. glabrę. Neque etiam hoc temperamento p̄diti ad libidinem proni sunt. Uteri uero caliditas ex reliqui corporis caliditate cognoscitur, quodq; pauca menstrua, et cum dolore deferuntur, ut genitalia interdum mulieris exulcerentur. Sed et quę educuntur, nigriora sunt. Hanc etiam temperaturam insignis salacitas, et totius corporis siccitas sequitur. Frigidiorum uteri temperaturam monstrat menstruorum suppressio, stupor in pube, lumbis et cruribus abortus. Veneris etiam usum aspernantur, et os uteri contractum habent, hoc temperamento p̄ditę. Humiditatis uero uitio fecunditatem frustrari indicat, si in coitu humore admodum perfunduntur, et si iis fuerint tenuia copiosaq; menstrua. Siccitas uteri contrariis planę deprehenditur notis. Communiter quidem ambobus congruit, et uiro et mulieri, uniuersum corpus conseruare probę temperatum, laboris, cibi, balnei, et reliquorum omnium mediocritate. Viri igitur, qui ob deprauatam

Signa.

Curatio  
commu-  
nis.



Pess.

aut melino oleo, aut succo portulacę aut sedı made facta, in sinum uteri immittenda. At ubi inflammatio declinare cöperit, ad ea ueniamus, quę quadate nus remittendi discutiendiq; uires habeant. Aegrotam igitur in fönogreçi, althę, se. lini, malug, interdum artemisig, marrubii, & saluig decocto usq; ad lübos sedere iubebimus. Pubi etiam & lumbis hordeaceam farinam cum fönogreco & semine lini in mulsaelixatam, aut caricarum decoctum illinemus. Pessiquoq; subiiciendi ex butyro, medulla ceruina, adipe anserino, gallinę & similib, confecti Reliqua deniq; quib, emolliendi facultas inest adhibenda, de quib, iam sepe dictum est.

## De sterilitate remouenda. Cap. LI.

Causa

f. Aph.  
62.f. Aph.  
46.

**S**terilitas aut uiri aut mulieris ratione accidit. A uiro est: cū semen eius uel feruidum, & ueluti torrefactum, uel frigidum, tenue aquosum, languidū, quale decrepitorū est: uel crassius quā oportet emittitur, uel qđ uiri semispadones sint penemq; breuissimum habeant, ut in uulux recessum semen iaculari nequeant. Quod etiā interdum nimia obassitate cōtingit. obass enim tam uentricosi euadūt, ut semen ad profundiores uteri partes iaculari nō possint. Mulier uero sua ipsius ratione non concipit, quod uterū habeat uel calidū & igneū, uel frigidum & humidū: uel squalentem & aridū. Nam ut Hipp. ait: "Quęcunq; frigidos & densos uteros habent, non cōcipiunt. & quęcunq; prę humidos obtinent uteros non concipiunt extinguitur enim in eis genitura. Et quęcūq; siccos magis & torrefactos: nā ex defectu alımenti corrūpitur semen. Cætetū crassę admodum & obasse, haud cōcipiunt, quod itē etiā Hippocr. iis testatur uerbis: Quęcunq; pter naturā non cōcipiunt utero: iis omentum os uteri cōprimit: & priusq; exstuentur nō cōcipiunt. Graciles deniq; & macilentę

non



non concipiunt: aut si concipiunt, statim abortiunt, eodem Hippocrate teste, qui sic scriptū reliquit: Quę s. Aph. cunq; p̄ter naturam tenues existentes utero gerūt, 44. abortiunt priusq; crassescant. Quędam etiam non concipiunt, eo quod uterus earum debilis est, uel angustus, uel brevis, aut quod uasa eius obstructa clausaq; sint, aut cicatricis superuentu excæcata, aut quod uteri ceruix in obliquum ducatur, aut quod os eius uel nimis angustum, uel nimis amplum sit. Signa quibus diuersitas causarum discernitur, hæc sunt. Calidius siquidem temperamentum uiri facile deprehenditur ex pilorum copia, potissimum uero nigrorum in partibus genitalibus, et omnibus quę circum stant, suprà quidem usque ad media fœmora. Petulca etiam est hæc temperatura, et ad libidinem prona: statim uero satiatur. Frigidius temperamentum monstrant partes circumpositę testib. glabrę. Neque etiam hoc temperamento p̄diti ad libidinem proni sunt. Uteri uero caliditas ex reliqui corporis caliditate cognoscitur, quodq; pauca menstrua, et cum dolore deferuntur, ut genitalia interdum mulieris exulcerentur. Sed et quę educuntur, nigriora sunt. Hanc etiam temperaturam insignis salacitas, et totius corporis siccitas sequitur. Frigidiorum uteri temperaturam monstrat mēstruorum suppressio, stupor in pube, lumbis et cruribus abortus. Veneris etiam usum aspernantur, et os uteri contractum habent, hoc temperamento p̄diti. Humiditatis uero uitio fecunditatem frustrari indicat, si in coitu humore admodum perfunduntur, et si iis fuerint tenuia copiosaq; menstrua. Siccitas uteri contrariis planē deprehenditur notis. Communiter quidem ambobus congruit, et uiro et mulieri, uniuersum corpus conseruare probē temperatum, laboris, cibi, balnei, et reliquorum omnium mediocritate. Viri igitur, qui ob deprauatam

Signa.

Curatio  
commu-  
nis.



*Curatio  
flatum.*

*Curatio  
clausi uteri.*

*Curatio a  
perit uteri.*

*Curatio  
peruersionis.*

*Causa.*

res laborib. plurimis, sudorib. uomitu: uel per inferna purgatione absumere oportet, aliaq; omnia quæ in Cap. de Suppressis mensib. commemorata sunt.

Iam uero flatus quoq; uteri conceptionē impediunt, quib. primo cibi paritate medebimur: dein iis quæ flatus discutiunt, ut est cuminum, ruta: anethuz: apii semen, et similia, quæ sepe iā cōmemorata sunt: eaq; partiz. potanda, partim extrinsecus adhibenda sunt.

Clausum uterum aperiemus iniectionis clysterib. odoriferis, fomentisq; et iniectionib. ex fœnogreco, semine lini, malua, et id genus aliis. Postea ad ualidiora pergemus, ut artemisiā: calaminthā pulegiū: et maiora nam. Quibus os uteri nimium hiat: iis uictus aridus fomenta sicciora, medicamenta adstringentia, qualia in curatione humidioris intemperiei dicta sunt: conueniunt. Peruersiones uteri mollientib. fomentis dirigemus: id enim fomenta maximè possunt. Sed et molliētes pessuli utiliter supponentur. Castoreū ēt ē posca bibitum utero auerso conferre solet. Quæ hic desiderantur, ex aliis petendū Capitib. erit. nos enim hic Capita tantū rerum pstringere uoluimus.

### De difficili partu.

### Cap. LII.

**D**ifficilis partus, aut uitio parietis, aut fœtus aut secundarum: aut extrinsecus aduenientium accidit. Parturientis quidem, si crassa obesaq; sit aut animo pusillo: et dolorum inexperta, aut uterus totus exiguus: aut inflammationem uteri, aut alterius partis habeat, aut alio quouis morbo laboret: aut naturaliter imbecillis sit, ut fœtum propellere nequeat: aut ante tempus pariat. Item si os ceruicis uteri obliquum fuerit, aut eidem caro aliqua ob ulcus quod præcessit adnata sit. At fœtus uitio, si uel iuuitate magnitudinis existat: uel exiguus: et modice grauitatis, uel magni capitis, uel monstrosus: uerbi causa, biceps: uel mortuus, qui nihil opis parturiēti præ-



si preſtet, aut intumeſcat: uel uiuus quidem: ſed imbecillis, ut foras non poſſit progredi, uel ſi gemini uel plures fuerint, & repente omnes ſimul collo uteri impingantur. uel ſi figuram nature contrariaz obtineat. Naturalis ſiquidem figura foetus prodeuntis eſt, prima quidem in caput: manib. ſuper foemoribus porrectis & extenſis, & caput in neutram partem declinans: ſed recta ad os uteri dirigens. proxima huic, ubi in pedes manibus ſuper utroq; foemore extenſis recta deſertur. Aliæ omnes præter has duas: à natura abhorrent. ut ſi caput in dextram aut ſiniſtram uteri partes inclinat: uel ſi altera, aut utraq; manus exeritur, cruraq; interius a ſe inuicem diducuntur: aut ſi foetus altero pede pedit, altero interius retento: aut ſi duplicatus alicui uteri parti innititur. Ob ſecundas partus redditur difficilis, ſi aut nō auellatur ob craſſitiem, aut priuſq; opus ſit propter tenuitatē abrumptur. humore ſiquidem qui in utero collectus fuit uacuato, infans præ ſiccitate ægrè elabitur. Ab externis et cauſis difficultas oritur pariendi. aut frigore, quod uterum denſat, & meatus anguſtiores reddit: aut calore immodico, qui uires diſſoluit. Cauſæ externæ de patientis & aſſiſtentium ſermonibus cognoscuntur. Debilitas quoq; patientis: ueluti etiaſ pinguedo, ex habitu corporis deprehenditur. Ex morbis etiam præcedentibus facile in imbecillitatis cognitionem ueniamus. Foetus imbecillitas ex debili ac tarda motione cognoscitur. qui ſi mortuus fuerit, à motu prorsus ceſſat, uētris frigiditas adeſt, atq; dolor iuxta umbilicū grauis. ſpiritus exhalatur foetidus, faciei color prauus. Magnitudo foetus ex partum corporis conſtitutiōe: ac uentris patientis mole coniicitur. Craſſities ſecundæ inde colligi pōt, qđ prædictorum ſignorum nullum adſit, & parturiēs robuſta facilisq; foetus motus ſit. Ceterum obceſam mulierē in lectulo pronam, hoc eſt in caput ppendentem.

Naturalis  
ſitus foetus  
prodeuntis.

Signa.

Cura.



tem, & uultu in terram deiecto figurare oportet, flectentem inclinante uero genua ad femora, quod uterus ad abdomen tendens, è directo oris sit. Digitis uero pinguedinibus, uerbi gratia butyro, oleo, axungia anatis, gallinæ, & similium delinire os oportet, & sensim dilatare. Timidam uero hortari conuenit, inexpertem dolorum partus admonere expedit, ut ualidissime spiritum comprimatur ac contineatur, & ad ilia ualidiore conatu protrudatur. si autem ex adstrictione, foetusque ueluti ad arrestatione pariendi oriatur difficultas, laxatione opitulandum, infundendo largiter oleum dulce & calidum. item decoctus fœnigreci, aut maluæ, aut seminis lini, aut etiam oua, quod leniendi facultate prædita sint. Deinde & pubem cum abdomine & lumbis prædicto decocto, aut alio relaxante medicamento fouere oportet. Proderit etiam in sessionibus ex commemoratis rebus paratis uti. Insuper laxationes balneis aquarum dulcium moliri oportet, nisi febris, aut alia quedam occasio impedierit: mouereque parientem gestatione in sella, in aëre mediocriter calido. Quod si inflammatio, aut alius quispiam morbus uterum infestauerit, huic etiam ex propriis capitibus succurrendum, ac prospiciendum erit. Imbecilla cum iis que reficiunt, & robur addunt cibis & potibus refocillanda. Vbi infans præmagnus fuerit, ea adhibenda que dilatare & laxare os uteri possunt. Si uero præter naturam figuratus fuerit, naturalem reddere figuram decet, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, partim in rectum agendo. Et si manum pedemue præmiserit, non attrahere membro prehensum oportet: magis enim firmatur ac impingitur, uel luxatur, uel abrumpitur: sed digitis humero uel coxæ foetus innixis, rursus id quod prominet in conuenientem locum diducere. Porro si cum oris uteri compressione, totius infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab uteri ore, sublimem destrudere



rudere consilium est, deinde prehensum iterum ad os dirigere. Si autem gemini, aut terni, plures uè fuerint, ac ceruicem uteri obfederint, reliquos propellere ad fundum uteri oportet, et eum qui magis paratus uidebitur, prius educere. Verum si non procedat, quod infans mortuus sit, aut caput nimis magnus, uel alia ob causam, ad foetus extractionem seu sectionem, quam Graeci *ἐμβρυοεκτομή* appellant, ueniendus est. Eam autem copiosissime Aëtius lib. 16. cap. 23. et Paulus lib. 6. cap. 74. tradunt. Porro si foetus tunica, seu secunda crassior fuerit, ac solidior quam ut rumpi possit, dissecanda erit. Quibus autem humor in tunica contentus, ante congruum tempus effluxerit, ita ut loca exaruerint, quorum albuminibus cum malum, aut foenigræci decocto excolato, aut ptisanæ cremore tepido perfundemus. Medicamentum uero quod in uniuersum omnes difficulter parientes iuuat, est hoc, quod R. Cinamomi electi. 3. 2. myrrhæ, casie lignæ uocatæ añ. 3. i. succini albi. 3. i. s. misce, fiat puluis, de quo in potu uini odoriferi de drachma una. Porro foetu excusso frequenter accidit, ut secunda in utero firmiter adherescat. quod ubi evenit, tum interdum os uteri apertum, interdum clausum reperitur, secundinaq; ipsa nonnunquam uteri fundo adhuc coniuncta, nonnunquam seiuncta est. Si itaq; os uteri diductum fuerit, et secunda quæ inibi relicta est alicui parti uteri orbiculatim ac pile modo conuoluta inhererit, facile educitur. manu siquidem sinistram calidam, pinguiq; illita in fundum demissa, secundam sublabentem extrahere oportet. Si autem fundo uteri sit connexa, demissa simili modo manu calida, et pingui inuncta apprehensam secundam trahemus: non tamen in rectum, ne uterus procidat: neq; uiolenter admodum sed leniter ac placide primus in obliquum deducemus, huc atq; illuc circumagentes, deinde paulo ualidius attrahemus, hoc enim pacto ob-

Puluis optimus ad difficultates partus secundæ educationis.

Q sequuntur



sequuntur, & à connexu soluuntur. Quod si uulua os clausum fuerit, perfusionib. utemur, & sinistre manus digitis leniter aperire & paulatim dilatare conabimur. Quod si non successerit, mulieris pubi fomenta perfusiones, unguentaq; emollientia & relaxantia adhibere conuenit. Si robusta, fuerit eo tempore etiam sternutamenta ex castorio, pipere, & similib. confecta narib. admouenda sunt. Hinc est quod Hippocrates. s. aph. 49. sic scriptum reliquerit: Vt secunda procidat, sternutatorio appposito, & nares apprehendito & os. Potiones deniq; aliquæ earum quæ menses prouocant propinandæ. Quæ quidem omnia primo, aut altero die peragenda sunt. præterea suffitu utendum, decoctis in olla artemisia, iride, sauina, pulegio, calamintha, & similibus, olla selle supposita, cui mulier uestimentis undiquaq; circumscripta infideat. Postea si os uteri apertum inuenerimus manu inserta, secundam, ut diximus, extrahere conabimur. At si non obediat, dilaceranda non est. haud multis enim postea diebus putrefacta, & in saniem soluta excidet. Quia uero grauitate odoris & caput replet, & stomachum euertit, odoramenta iugiter suffienda sunt, quæ possint his malis aduersari, & secundam subducere. Ad quos usus excellunt cardamomum, bdellium cum sauina, thus, styrax, ladanum, lignum aloes, & huiusmodi. Iisdem etiam, ea quæ menses ducunt propinanda.

## De ischiadicis.

## Cap. LIII.

Ischiadici

Causa.

**I** Schiadicum, hoc est coxendicum dolore affecti, proprie dicuntur, quibus dolor circa iuncturam (quam Græci *ἰσχίον*, Latini coxam uocant) accidit. Fit ob crassum pituitosumq; humorem, qui in coxarum articulo concretus infidet. Ideoq; hoc malum assidue cruditates, & immodicus rei ueneris usus aliquando etiam de ambulationes concitiores, & hæmor



et hemorrhoides suppressæ, et uomedi consuetudo intermissa, et purgationes menstruæ, aut etiam aliæ familiares excretiones impeditæ, et exercitiorum neglectus cōciliant. Antecedit autem, et quasi auspicatur hoc uitium aliquando quidem uicinorum musculorum dolor, et maximè lumborum: aliquando uero ab ipsa coxa initium fit. Iam uero quandoq; etiā contingit, ut coxæ dolore sublato, circa poplitem solum afflictio hereat: aliis autem iuxta talum, quibusdam uero totum crus equaliter dolore afficitur. Multis item dolor circa inguina figitur. Initium igitur curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione. Et si quideꝫ humoribus ex æquo redundarit corpus, præ omnibus uena secanda in poplite, aut talo interna, aut etiam cubito, Galeno lib. 10. de Compo. medica. secundum locos. Cap. 2. teste: idq; in latere affecto. Sin à pituitofo atque crasso humore malum oritur à purgatione eius humoris auspicanda curatio. in quem sanè usum clysteres crebri exhibendi erunt, in hunc uel similem modum parati. ℞. Centaurii minoris, saluæ, uerbasculi odorati: rutæ, iuæ arthriticæ hodie officinis dictæ, añ. M. i. radicis acori. ʒ. i. stœchadis. ʒ. iii. semi. anisi: se. fœniculi añ. ʒ. 2. s. ngarici optimi. ʒ. 2. polypodii. ʒ. v. decoquatur in aq. iuste quantitatís, donec tertia pars absumpta fuerit. dein. ℞. colature. ʒ. xiii. hieræ piecræ. ʒ. s. ecligmatis. Indi. ʒ. 1. s. oleorum liliorum alborum. ʒ. ii. rutacei. ʒ. 1. uitellos ouorum numero. 2. salis. ʒ. 1. s. misce, fiat enæma. Auxiliantur etiam uomitus ischiadicis, atque magis utiq; quàm euacuationes inferne per uentrem, ut qui reuellant deorsum repentem humorem. Faciendi itaq; sunt uomitus in principio ab accepto cibo, postea uero etiam per uomitoria medicamenta, initio facto à mediocribus. In quibus autem uehemens humorum coactio densatioque, quæ egrè dissolui potest, à medicis intempestiue

Signa.

Curatio.

Clyster

Vomitus.

Cucurbitæ

Q ii acri.



Ad strin-  
gentibus  
medica-  
mentis nō  
utendum.

Acria  
quando  
adhibenda.

Vnguen-  
tum.

acribus pharmacis utentibus facta est, his cucurbitu-  
la quā maxima cū scarificatione affixa auxiliatur.  
Ceterum medicamentis fluxum reprimentibus in co-  
xendicum dolore non utemur. Quum in profundo  
coxa sita sit, sanguis ex vicinis & ambientibus uenis  
ac musculis ad illam impellitur. Mitigatoriis igitur  
in principio medicamentis opus est, in hoc dolore,  
quē neq; refrigerent mulcum, neq; fortiter calfaciat.  
Ut enim ea quē refrigerant, ad coxam impellunt: sic  
quē uehementer calefaciunt, aliam amplius materiā  
ex adiacentibus partibus attrahunt. Porro post ue-  
nē sectionem, aut per purgantia medicamenta uacua-  
tionem, ad acria medicamenta, non antē, ueniendū  
est. Si enim quis prius quā corpus euacuet acribus  
medicamentis ad patientem particulam adhibeat,  
egre curabile malum reddet, utpote multitudine ibi-  
dem indissolubili ter condensata. pręter alia enim  
crassa & uiscosa fit, & ob acrium medicamentorum ca-  
liditatem & siccitatem non dissimile quippiam assa-  
tioni, perpetitur. Patientem igitur locum primum ex  
oleo rutaceo irrigare oportet. postea uero efficacio-  
ra admouenda medicamenta, quę scilicet sensim ca-  
lefacciant, & materias ex alto ad superficiem attrahe-  
re possint: qualia sunt, oleum uulpinum, de piperi-  
bus, costinum, unguentum arragon, marciaton,  
salvia, ruta folia, lauri, sambuci, radix ebuli, pulegiū,  
sauina, opopanax, bdellium, ammoniacū, & similia:  
ex quib. fomenta, unguenta, emplastra & cerata com-  
poni possunt. Quare primum spongia in decocto iu-  
niperi, aut saluie, aut foliorum sambuci madefacta,  
loco patienti iterum atq; iterum imposita, hoc un-  
guento subinde utendum erit, q̄ R. Vnguenti mar-  
ciaton. 3. iiii. oleorū irini, liliacei añ. 3. s. succi rute, suc-  
ci iugē hodie noiātē añ. 3. ii. s. mellis. 3. i. s. saluie pulegiū,  
piperis añ. 3. s. pyrethri, staphysagrie añ. 3. i. cereq; q̄ sa-  
tis est, fiat unguentum. Proderit etiam huius cerati  
usus,



sus, ꝓ ꝑ. oleorum costini, uulpini añ. 3. i. s. olei de  
 oiperib. 3. s. opopanacis, bdellii, styracis añ. 3. iii. radi  
 cis bryonię, nitri, foliorum sambuci añ. 3. ii. pistola  
 hię, (quam rotundam hodie nominant) rutę añ. 3.  
 s. euphorbii. 3. i. gummi dissoluantur in acerrimo  
 aceto, ꝛ cum cera ꝛ terebinthina refina quod satis  
 est, fiat ceratū. quod si malum adhuc remoretur,  
 clysteribus denuo utendum erit, ꝛ postea cucurbi  
 ta quàm maxima cum plurima flamma coxę affigen  
 da, uulnusculis etiā altioribus per scarificationē  
 impactis. Quod si uero neq; sic malum finitur, ad  
 purgationem, uomitum, ꝛ alia quę suprà dicta sunt  
 redeundum est. His peractis, ad dropaces ueteribus  
 nominatos, ꝛ ad medicamentorum adurentium  
 usum ueniendum. inter quę non postremum locū  
 obtinet, herbę hiberidis radix recens, estate effos  
 sa, ꝛ diligenter tusa, ac ueteri axungia modica ex  
 cepta, iuncturę coxę, ꝛ uniuerso cruri imposita, ꝛ  
 adalligata. Sic uero admotam incumbere finito,  
 mulieribus quidem non infra duas horas, uiris au  
 tem quatuor horarum spacio, si possibile sit id per  
 ferre. Excitat enim tumores cum ardore ꝛ rubore,  
 ueluti sinapismus facere solet. Post in balneum indu  
 cito egrotantem: in quo ubi modicum exudauerit,  
 in solū ob feruorē mordacius desiderare iubeto, idq;  
 fortiter perferre cogito (Imorsum enim cum ardo  
 re in principio inferre consueuit) deinde educito. fer  
 mē enim semper, ut testatur Aētius, q̄uis ab aliis fue  
 rint importati, sua sponte pedib. ingredientibus exi  
 bunt. A balneo ad oleum multum, paucum admodū  
 uinum admisceto, ꝛ conquassata illinito: ac humo  
 re cum aspero panno deterso, crus ipsum cum leuissi  
 mis lanis cooperito. Et sanē consueuit hoc ipsum  
 p̄sidium nullo alio inde auxilio indigere. Quod  
 si tñ aliqñ uestigiū mali relinquatur, uicenis dieb. in  
 terpositis, rursus eodē p̄sidio utaris. Interiectis autē

Q iii diebus

Adurens  
tia medi  
camentis.



Vicius

diebus, cetatū supra descriptū imponi pōt. Inter adu-  
rentia medicamēta hoc etiā locū non obtinet extre-  
mū, q̄ ℞. Mellis anacardini, fermenti añ. 3. i. cantha-  
ridū abiectis alis. 3. ii. aceti quod satis est, misce ⁊ hoc  
quod ℞. Euphorbii, nitri añ. 3. ii. saponis, calcis uiuē  
añ. 3. i. mellis anachardini q̄ satis est ut ad mellis cra-  
situdinē omnia cōmixta redeant. Gēterum quod ad  
uictus rationem attinet, cibus sit mediocriter tenuis,  
⁊ cōcoctu facilis exercitia perficiantur deambulationi-  
bus, continuis flexionibus, saltationibus ⁊ cursu.  
Alium etiam semper probe solutam habere expedit.  
Quod si uero uitium longius durauerit, uisionem  
in tribus aut quatuor locis adhibere oportet, ut do-  
cet Paulus lib. 6. Cap. 76.

## De podagra ⁊ arthritide. Cap. LIII.

Podagra.  
Arthritis.  
Causa.

**P**odagra ⁊ arthritismala eiusdem sunt species.  
Differunt itaq; non toto genere, sed locis patien-  
tibus. In utroq; enim articulorum est imbecillitas,  
⁊ humor à natura alienus ad hos ipsos confluēs.  
Quapropter si in pedibus constiterit hęc fluxio po-  
dagra appellatur. Si uero reliquos artus occupaue-  
rit, ὀδοντῖς, id est articularis morbus nominatur. Ge-  
nerant autem hoc malum cruditates, immodicus re-  
uenerē usus, uehemens ⁊ concitator deambulatio,  
stationes diutius productæ, equitatus creber familia-  
res excretiones suppressæ ⁊ consuetorum exercitio-  
rū intermissiones. mœrores autem, curę uigiliæ, ⁊ re-  
liquę animi affectiones hoc malū suscitant. Nonnū-  
q̄ etiam colicus dolor perperā curatus causa est, cur  
arthritidis sequatur: quēadmodū testantur ea quę lib.  
sexto Epid. par. 4. aph. 3. scribit Hippocrates, inquiēs:  
Cuidā intestinū colō, ubi articulari morbo corripie-  
batur, dolore ferē uacabat. Postq̄ uero ab eo sana-  
tus est morbo, plus doluit. Vt plurimū uero aptitudi-  
nes ad hoc malū à parentib; in filios ac posteros trās-  
feruntur



feruntur. Sed humor superas, qui iuncturis sese inferit, uel sanguineus, uel biliolus est, uel pituitosus, uel melancholicus. Interdum etiam ex humorum commistione malum contrahitur. Humorem autem discrimina iis deprehendi notis possunt. Sanguineus siquidem humor si multus fuerit, plenitudinem efficit, et tumorem ingentem, non uenarum modo, sed totius partis patientis circa cutem, eumque rubentem, Qui hoc modo patitur, neque refrigerantia neque calfactoria ualde prefigenda adhiberi sustinent. Urinae eorum fulvae sunt, et mediocri preedita crassitudine. Venae etiam in his copioso suscepto sanguine replentur: et in tumorem attoluntur. Aetas uero apta, iuuentutis. Edulia preceserunt boni succi, et copiose nutrieta, neglectus exercitiorum. Tempus uero, in quo affliguntur, uer. Biliosum defluxum, color subflauus, et subrubeus testatur. Item caloris sensus, dolorisque lancinantis modo acris. item humor in cutem subito sine euidenti tumore erumpens. Refrigerantibus medicamentis sic afflicti gaudent, et iuuantur: a calidis autem offenduntur. Febris in ipso accessionum statu accedit, ualidaque siti conficit. Urina sic patientium subfulua, quandoque etiam acris. Curae autem ingentes, et irae, et uigiliae, et fatigationes, et in summa uictus ratio bilem procreans, praecedere solent. Aetas, temperamentum, et tempus, calida et sicca ad eum defluxum apta sunt. At si pituitosa fuerit fluxio, ad digitorum appressionem cauius fit tumor, et sublaesus et moderatus, et color dolentis membri albus. Aetas hoc modo magis afficitur senilis, temperamentum humidum et frigidum, consimilis ambientis status, et tempus hybernum. Urina tenuis est, et aquosa. praecedit ocium, et uictus ratio, quae pituitosum humorem progignit. Si ex atra bile fit fluxus quod raro, tamen contingit, color tumoris nigrior, est. Aetas quae magis hunc fluxum generat, est uigore inclinante,

Signa

Sanguines.  
defluxus.

Biliosum.

Pituitosum.

Atra bili  
influctia.

Q. iiii clinante,



Curatio.  
sanguis  
et

Loca lia.

clinante, temperamentum frigidum et siccum, tempus  
autumni, regio frigida et sicca, aeris consimilis sta-  
tus, uictusque atram bilem gignens. Quum igitur san-  
guinei humoris fuerit influxus, ptinus sanguis mit-  
ti debet, non solum semel, sed iterum atque iterum,  
detractione paulatim reperita. Si enim uene sectio-  
ne omissa repellentibus medicamentis fueris usus,  
magni mali autor eris. ex ignobilibus enim partibus  
ad principes, et uite necessarias sanguis repulsus ir-  
ruet. Secunda est aut uena in brachio inferna, è di-  
recto cruris influxione infestata. Quod si uero ma-  
nus dextra dolore infestetur, uenam in dextro cru-  
re secamus iuxta poplite autem talos. Tū uero potissi-  
mum sanguinis missio tentanda erit, cum quem-  
piam malum hoc primum inuadere coepit. Qui  
enim sæpius huiusmodi defluxione sunt conficta-  
ti, plus noxę quam auxilii ex sanguinis detractione  
sentiant, præsertim si corpore sint imbecillo ac  
frigido. Post missionem sanguinis patienti parti-  
culę remedia adhibere oportet, quę neque ualde re-  
frigerant, hæc enim humores cogunt, ac conden-  
sant: neque immodicę calefaciunt, hæc si quidem calo-  
ris ratione ad partes patientes plus attrahunt. Qua  
propter aceto ueteri cum rosaceo partem patientem  
rigare oportet, præsertim si in alto herere dolorum  
causa uideatur. Etenim acetum propria sua tenuita-  
te usque in altum progressum, expeditam rosaceo uiā  
exhibet, quod natura sua dolores lenire potest. Si in  
superficie dolor consistat, per uini et olei usum ma-  
gnopere iuueris, æstate quidem tepidorum, hyeme  
uero calidorum. Deinde etiam cataplasmatibus uten-  
dum, quę dolores lenire possunt, ex farina foeni-  
græci, hordei, fabarum, lupinorum, chamæ melo,  
et similibus. Oportet autem ea omnino semper es-  
se calida: quod commodè fieri potest, si assidue per-  
mutentur, et lana forinsecus contegantur. Non pa-  
rum



rum proderit et hoc, quod & Lactis caprini. 3. vi. u.  
tellos ouorum numero ii. olei rosacei. 3. i. croci 3. s.  
medullę panis quod satis est, ut medicamentum cata-  
plasmatis formam accipiat. Hęc itaq; terantur do-  
nec uniantur, et unita tandem imponantur. Po-  
test etiam fieri ceratum ex oleo rosaceo, aceto, re-  
sina, cera, galbano, ammoniaco, thure, croco, et  
similib. tale enim repulsoriam uim propter crocum  
et acetum obtinebit: concoctoriam uero, discusso-  
riam, et moderatę reficcantem, rursus ob crocum,  
et aliorum commixtionem. Cæterum cibos eis exhi-  
bere oportet, qui extenuant, et minus nutriunt: qua-  
les sunt olera. Carne autem, nisi sit uolucrum mo-  
tanarum, abstineant: piscibus perosis utantur. Vi-  
num, si fieri potest, ex toto circumcidendum: nam  
hec ferę una ratio est, qua sanitas consequi potest.  
Quam cum ex milibus uix unus sequatur, nihil mi-  
rum paucos admodum esse qui ab hoc morbo ho-  
die liberentur. In uicem uini uti oportet decocto ci-  
namomi, anisi, et similium: aut potione ea quę ho-  
diernis temporibus Hippocras corrupta uoce nomi-  
natur, cuius preparationem pete ex Cap. de Resolu-  
tione. A fructib. et uenere abstineant. Alium etiam  
facile subeuntem habere oportet. Et si quidem offi-  
cio suo sponte sua non fungatur, simpliciiori aliquo  
clysteri eluatur. Quod si uero ob bilis influxum do-  
lores excitentur, tum his communis scopus, humo-  
ris affligentis est euacuatio, quę tum per uomitum,  
tum per uentrem fieri debet. Per medicamenta itaq;  
bilem ducentia confidenter purgandi sunt sic affli-  
cti. dein usq; ad uigorem apponenda medicamenta,  
quib. refrigerandi et adstringendi facultas inest. qua-  
lia sunt quę ex semperuiuo, rosas uiridib. rumice  
acuto, solano, plantagine, et similibus iam sæpe  
commemoratis apparantur. In hoc influxus gene-  
re interdum ob doloris uehementiam, iis quę stu-  
porem

Cataplas-  
ma.

victus.

Cur pau-  
ci hodie  
a podag-  
ra libera-  
rentur.Bilis si flu-  
xus.



*Stupefa-  
cientia.*

porem inducere possunt medicamentis utendū erit. In quem usum conuenit adhibere medicamentum quod supra descriptum est, ex lacte caprino, medulla panis, croco, et oui uitellis, cui seminis papaueris. 3. iiii. aut. 3. iiii. aut opii. 3. i. admixta sit. Pro sunt hac ratione cicuta folia, et hyoscyami adhibita. Sed animaduertendum erit, ut quum in feruentibus doloribus fuerimus ad stupefacientium usum coacti, postea resoueamus partes per ea quae calefacere possunt. Nisi enim hoc fecerimus, debiles et in in-temperatas redditas partes perpetuo fluori obnoxias reddemus, et quae in actionibus facile offenduntur. Calorifica uero sint origanum, satureia, sinapi, piper, et eiusmodi. Porro adiuuare etiam oportet sudorum exclusionem, corpus calefaciendo et fricando: ita tamen, ne patientes locos contingamus. Præbenda quoque in potu ea quae urinam cient. talia enim bilem per lotium euacuare consueuerunt. Soporem quoque inducentia, quod fluores ab ipsis resiccentur: atque id maxime, si post corporis purgationem exhibeantur, conferre solent. Cibi iis dandi refrigerantes, non tamen humectantes: humiditas enim auget fluxionem. Famem et inedia ne tolerant: nam bilem acriorem reddunt. Ex fructibus pomis adstringentibus et mespilis et aliis quae refrigerant, et simul fluxus cohibent utantur. A uino prorsus abstineant, ut priores. Qui ob pituitæ influxum laborant, horum curationem à pituitæ euacuatione auspicanda. Euacuatur autem humor pituitosus per uomitus quidem, nihilominus tamen et per uentrē infernē. Vtilior uero in hoc malo per inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pedes hæreat morbus: et multo magis, si iuxta omnes corporis articulos fluxus constiterit. familiarior enim pituitæ uia, et minus periculosa per intestina existit. Si enim in superiore uentrem uiolenter attracta non uacuetur,

*Vitius.*

*Pituitosi  
fluxus.*



cuetur, periculum inducit. Quapropter tutius est, ut ad infernam excretionem ducatur. Ante tamen purgantia medicamenta, ea quibus incidendi et extenuandi facultas inest, exhibenda, ut hac ratione ad purgationem crassi humores præparentur. Si euacuatio per purgationes fieri non potest, tum inedia et fame utendum est ad plures dies. natura enim pituitosi eam bene tolerare possunt, iuxta hoc Hippocraticum: Corporibus carnes habentibus humidas, famem adhibere conuenit fames enim corpora ficcet. Neque absurdum erit, si illi clysteribus, et medicamentis urinam cientibus uacuentur. Cæterum extrinsecus medicamenta quæ dolores leniunt, et quæ discutere et moderatè resiccare possunt adhibenda, de quib. paulo supra diximus. His uero in morbi principio aliqua quæ adstringendi potentia prædita sunt, commiscere oportet. Post principium autem, solis discutientibus utendum. Mansuetissimum uero hoc est: Althææ nimirum folia cocta, tritatum per se, tum cum polline, aut hordeacea farina imposita. Radix etiam cocta in aqua mulsa, trita, et imposita confert. Et hoc unguentum quod R. Olei laurini, irini añ. 3. i. adipis suilli ueteris, butyri añ. 3. iii. medullæ ceruinæ. 3. ii. resinæ rebinthinæ. 3. v. galbani in aceto dissoluti. 3. i. hyssopi, radicis althææ, semine fœnogræci añ. 3. ii. cære quod satis est, fiat unguentum. Porro quæ ratione nutrimenti præbentur edulia natura ficciora sint, et minus nutrant: ut est oryzæ succus, et eiusmodi. Carnes tñ auiū montanarū assæ haud incōmodant. Cappares ex aceto mulso mirificè p̄sunt. Vinū p̄beatur quàm minimū, tenue, suluū, et uetus. Qui atræ bilis fluxionibus molestatur, si uenę sectioe, aut purgatione sunt euacuadi. uenę sectione, qñ sanguis atrabile infectus ē purgatione uero, qñ ad atrā uergūt bilē egrotantes. Si uero ambo hæc simul redundarint,

non

7. Aph.

60.

66

66

Vnguentum

Vitis ratio

Atræ bilis fluxionis



**Tophorū  
Curatio**

**An balne-  
um condu-  
cat podag-  
ricis.**

**Quomo-  
do quis a  
podagra  
le tueatur**

non unum aliquid ex prædictis adhibere suffecerit, sed præfecta uena, deinde purgante medicamēto utendum: quod ipsum et in aliis passionibus duplici euacuatione indigentibus erit faciendum, ut lib. 2. Paradoxorum abunde monstrauimus. In principio autem morbi, et in ipso uacuationis tempore, reprimentibus, et sensim simul calefacientibus utendum est. Post euacuationem uero his quæ sensim calefacere, attenuare, et discutere possunt utemur, de quibus supra abunde est dictum. Ceterum quoniam topi et duri tumores subinde in articulis creantur, modo ob humorum qui ad eos decubuit crassitiem, terrestremque duriciam, modo propter immodicum discutientium et resiccantium medicamentorum usum, sine earum quæ molliendi facultate pollent mistura. Ad quos certe depellendos ea quæ in Cap. de Lienis duricie ducta sunt, conferunt. Item uerustissimus acerrimusque caseus cum suille carnis præpinguis et ueteris decocto contritus, et superius positus. Ad hoc malum conducunt etiam ficus triti, et impositi. Item althea bis cocta, auena, urtica, bryoniæ radix, bulbi, anethi, abrotoni, buphthalmi, marrubiique folia: ita ut singula prædicta cum pice, et sulphure uiuo permisceantur. Admiscendi etiam adipēs suillus, caprinus uitulinus, et anserinus. Medullæ item omnes, et alia quæ emolliendi ui prædita sunt. Balneum sanè ne silentio transeamus, post inflammationum remissiones omnibus podagricis commodissimum existit. Dum lauant, spongiæ aceto et sale permixtis madefactæ, locis patientibus circumponendæ, ut à fluxione immunes permaneant. Lauare autem eos non semel tantum, sed iterum atque iterum in aëre per omnia modo rato opus. In aqua tamen calida non diutius morandū. Consultissimū itaque, ut aqua calida perfundatur. utile ē, ut totum corpus lintheis siccis pfricetur. Præterea curati à podagra, hac se ratione à podagra deinceps



inceps tuebuntur. Si primum bis in anno, modo nihil sit quod id ipsum prohibeat, sanguinem largè detraxerint, uere nimirum et autumno. Dein si iisdem temporibus, et crebrius etiam, medicamentis purgantibus usi fuerint. Cibus etiam ut demant, et à satietate sibi caueant necesse erit. Utendum quoque cibus concoctu facilibus, et qui prompte in partes corporis distribuantur, et excrementis uacant. Vino aut prorsus abstinendum, aut parcè utendum. Exercitiorum creber sit usus, idque ante cibum. Labores enim, Hippocrate nostro teste, cibos præcedere debent. Et ut rem in pauca contraham, hoc perpetuo secum mullerent Hippocratis, ut breuissimum, ita saluberrimum præceptum: ἀσκησις, ὅ γινεσθαι, ἀκορὴ τῆς φησὶς, ἀκορὴ τῆς πόνης: hoc est: Sanitatis studium est, non satiari cibus, et impigrum esse ad labores. Somnus etiam et uenerea, ut idem docet, sint mediocria. Quod ad præsidiorum partem attinet, sal minutim in oleo tritus, et articulis affricus, omnes qui se ab hoc malo uindicare uolunt, magnificè iuuat: nisi præter modum sicca intemperie sint præditi. eoque illitu et mane et uesperis per totum uitæ curriculum, utendum est.

6. Epid.

Par.

4 Aph. 23

6. Epid.

Par.

4 Aph. 20

6. Epid. 6

Par.

Aph. 5.

## LIBRI TERTII FINIS.



## LEONHARTI FUCHSII

DE MEDENDIS

FEBRIBVS.

LIBER QVARTVS.

De Diaria. Cap. I.

Diaria fe-  
bris quæ.Tria pri-  
ma febrili

Causa.

Signa.

**D**IARIA Febris, Grecis ἐφ' ἡμέρας dicitur, quod eius unica sit accessio, uno magna ex parte die, ex ipsius saltem natura, circumscripta. Nec ab re adiectum est, magna ex parte. sunt enim febres aliquæ ut sunt quæ ex densatione meatuum oriuntur, quæ etsi in tertium usque diem extendantur, ut Cap. secundo latius dicemus, nihilominus tamen diariæ nominantur. Quamvis enim de substantia ipsa talium febrium diariæ uocabulum non sit, tamen clarioris simul breuiorisque doctrinæ gratia, cum natura eadem his sit quæ aliis diariis, non obstante quod nomen non sit idem, diarias etiam appellare licebit: ne scilicet præter tria prima febrium genera, quorum unum est in quo spiritus plus iusto incalescit, alterum in quo humor putrescit, et tertium in quo corpus et solidæ eius partes febrilem calorem ut habitum susceperunt, quartum excogitare necessesse sit, ut copiosius Gale. lib. 9. Ther. meth. Cap. 1. docet. Fit cum absque ulla prorsus putredine spiritus præter naturam incalescit atque succenditur. Id quod fit ob densitatem cutis, uigiliam, cruditatem, tristitiam, timorem, iram, curas animi uehementes, uisionem à sole, refrigerationem, lassitudinem, famem, ebrietatem, et inguinum tumores. Signa uero quibus deprehenduntur diariæ febres, duplicia sunt, quæ enim communia



munia omnium diariarum, & hæc numero sex sunt. Primum quidem pulsus. omnes enim diarię, Gal. lib. 3. de Prædictione ex pulsibus autore, in magnitudinem, celeritatem, crebritatemq; pulsus, quantum in ipsis est, mutant. Exquisitè aut̃ seruant eam q̃ secundam naturā est equalitatem, mollicie, & ordinem. Alteruz, urina: prima siquidem statim die urina concocta apparet, & benè colorata. Tertium, caloris qualitas: quę in omnib. suavis & mitis existit. Quartuz, de clinatio: quę in singulis cū sudore, rore, aut omnino cū aliquo optimo uapore accidit. Quintū, defectus malignorū symptomatū. Sextuz, quia oēs a causa extrinseca, (quā p̃mitiua uocant) oriuntur. Quę singula copiosius recēset Gal. lib. 1. ad Glauc. Cap. 2. Et lib. 1. de Diff. feb. Cap. 7. necnon lib. 2. de Crisib. Cap. 13. Quędam etiam sunt signa quibus particulatim quęuis diaria dignoscitur, quę traduntur a Gale. lib. 1. de Diff. feb. Cap. 1. & lib. 2. de Crisibus Cap. ulti. lib. 1. ad Glauc. Cap. 2. Quare consulto iis omnib. omiſſis, ad curandi generalem rōnem descendamus: quę primū per uictus rationē perficitur, cuius quidē in omnib. diariis simpliciter appellatis cōmunis intentio est, ut cibi boni succi, & concoctu faciles, ac distributioni idonei præbeantur: uistis a sole q̃dem & iratis, qui refrigerent & humectent: refrigeratis, qui minus nutriunt, & moderate calefaciunt. uigiliis, aut tristitia, aut nimia cura p̃fectis, qui humectat pariter ac somnū p̃ciliant: defatigatis, qui maxime nutriunt. Ceterū in qb. corporis intēperies calidior & siccior est, hos in primo statim accessionis insultu cibare op̃z. nisi enim quis hanc naturā statim cibet, ocysſime in ea diaria febris mutatur in acutam. Vinum omnib. diariis simpliciter nominatis aquosuz, album, & tenue cōuenit. nā præter id qđ cōcoctionē iuuat, urinas et̃ & sudores puocat. Sed uigiliis, aut curis, aut tristitia maceratis uberius concedendum.

uictus.

defati-



## Curatio

defatigatis, quantum conficere possunt, itatis tamē, nisi omnino ab affectu quieuerint, uinuz non tuto datur: ut fufius Galen. lib. 1. ad Glau. cap. 3. docet. Porro curare oportet omnes diarias simpliciter dictas balneis, sic tamen ut eos qui ob lassitudinē aut inguinum tumore febricitant, prius dulci tepidoq; ac multo oleo suauiter perfricatos, ad dulciuz aquarum balneum ducamus. Si uero eos qui inguinum tumore febricitant, in aēre balnei immorari iusseris haudquaq; nocebis. Reliquos omnes q; citiss. oportet ab aēre semouere. Qui ob uigilias, curas, tristitiā atq; iram febricitant, eos quidem plurimum lauare subinde non oportet. ueruz oleo magis nihil adstrictionis habente affatim perfundendi, parceq; fricati pro consuetudine lauandi sunt. A solis uestione febricitantes, statim initio refrigeratione, & crebriori. balneis aque dulcis, solaq; exigui. olei perfusione citra frictionem curare oportet. Sint autem quæ refrigerant capiti admota, rosaceum q; salis expers sit, aliaq; eiusmodi que lib. 1. Cap. 3. dicta sunt. Hec autem frigefacta deinceps lana excipienda sunt, ac suspensa in sublimē manu exprimēdo syncipiti instillanda, idq; assidue donec febris inclinauerit. postea in balneum eger ducendus. Si quis ex frigore febricitat, is quoq; ad balneuz in febris declinatione est ducendus, caputq; ante & post lotionē irino oleo aut nardino aut simili fouendus. Qui ob famem febricitat declinante accessione ad balneum ducendi sunt, plurimoq; oleo dulci ac repente perfusi molliter perfricandi, diutiusq; in solii calidi aqua cōtinendi. egressis uires reficiendę, inde rursus ad balneū ducendi. Vbi denuo egressi fuerint, sedata balnei pturbatiōe aqua calida propinanda, tum ptisanę cremor exhibendus, & interdum ex albo iure pisces saxatiles. Si ob cruditatem febris diaria oritur, considerandum erit an aluus lubrica sit, an adstricta, ubi lubrica est,

7 ca.



et ea tantum quæ corrupta fuere, uacuata esse uidentur, tum lauandum tum nutriendum in remissione febris: sed iis quæ sunt circa uentriculum prius consulentes. Sin ita multa inanitio aut prius facta sit, aut nunc etiam in homine duret, ut uirtus iam defessa sit, satius est omissa lauatione cibare, sed consulentes prius iis quæ circa uentrem sunt. Consuletur autem laborantibus, si modo uacuatio amplius non dureret, irrigatione uentriculi ex oleo et absinthio, et aliis quæ supra lib. 3. Cap. 1. de Imbecillitate uentriculi dicta sunt. Sint autem ea quæ uentriculo imponuntur abunde calentia: quippe quæ tepida sunt, omnia uentriculi firmitudine dissoluunt. Si uero omnino uenter adstringitur, contrectatis hypochondriis, mox toto uentre, considerandum nunc cibis in gracile intestinum, aut in colon descenderit. Si alimenta in uentriculo adhuc persistant, conetur eger plurima tepida aqua epota, immisso digito aut penna, totum quod infestat euomere. deinde fouendo hypochondria quiescere. At ubi iam ad intestina alimentum descenderit, iubendum ut declinui facie ac uentriculo recumbant, uenterque fouendus, ac somnus conciliandus. Post somnum ad educenda excrementa glans supponenda, aut leui clysteri aluus mouenda. Qui ex inguinum inflammatione febrem conceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciendum, sed ulceri tantum ob quod inflammatio euenerit intendentes, declinante exacerbatione lauantur. Arcendi uero à uino omnes qui sic febricitant, tenuisque illis uictus quousque liberentur adhibendus. Hactenus quam breuissime potuimus febrium diariarum curationem prosecuti sumus: quam copiosius tradit Galen. libro octauo. Ther. meth. et in primo ad Glauconem.

Tepida  
uentriculi  
robur dis  
soluunt.

R. De



## De diaria ex obstructione meatuum. Cap. II.

Causa.

Signa.

Curatio.

**F**ebriſ que ex ſtipatione meatuum oritur, ei uſde nature eſt cum diariis, Gal. lib. 9. Ter. meth. teſte deſiſtit enim poſt primā acceſſionem, ſi quis eaſ recte tractet: ideoq; inter uerē diarias non obſtante quod eius acceſſio interdum ultra unum diē porrigatur, recte cōnumeratur. Dicitur alio nomine ſynochus citra putredinē, aut diaria plurium dierum, ut ex loco Galeni iam citato ſit euidentiffimū. Accidit autem ſtipatio uel obſtructis exilib. meatib. uel conuenientib. uel et corpore ipſo immoderatiuſ deſato, id q; à frigore, aut q̄litate uel balnei, uel medicamenti acerbā & adſtringente, ſole feruente, & aliis que cutim ſiccare poſſunt euenit. Quia uero propter ſtipationē intra corpus ſumida fuliginōſaq; excrementa detinentur plurima, foras autē quod de iis effluit exiguum eſt, ſit ut febrem accendat. Deprehenditur primū tactu: neq; enim denſitas tactū exercitatuſ latere poteſt. Dein motu caloris, qui primo quidē inſultu mitis apparet, poſtea tñ ubi p̄durauerit acrior euadit. Tertio ex urina, que neq; craſſitudine, neq; colore a naturali multum eſt aliena. Quarto ex tumore corporis, qui manet, nec collabitur. Oculi etiā non ſunt concaui, ſed prominencioſi, & humidiores quā ſecundū naturā. Quinto ex pulſu qui q̄lis maximus, celer, frequens, & uehemens exiſtit. Qui ita laborant, ſi recte curabūtur, iis ſanguinis miſſio eſt adhibenda, tantumq; ſanguinis eſt detrahendum, quantū uires tolerant. Pro certo quoq; habendum (niſi iis quī hoc per naturā ſunt habitu, id adhibeat̄ur p̄ſidium) fore ut uel ſuffocentur, uel certe ſyncope omnino periclitentur. Corpore uacuato, poſt aut nutrimentum, aut medicamentum ex iis quæ deſtergeant, exhibebis. Quæ aut hoc in febrib. p̄ſtant in alimentorum ratione ſunt ptiſana & mulla: in medicā-

dica.



dicamentorum, oxymeli, & quęcunq; incoquere in  
 mulsa licet, ceu calamintha, & hyssopum, & origanū,  
 & serpillū: & iris: & apium. Verū hęc omnia iusto cali-  
 diora sunt, ideoq; febres accendunt, ita utiq; ut ui-  
 num. Oxymeli uero solum nec febres accendit, & stre-  
 nue deterget, sic ut ea quę glutinosa crassaq; sunt dis-  
 soluat, & meatus obstructos liberet. Tertio die mane  
 si uideris minimū esse quod de febris relinquitur, ac  
 neq; putredinis humorū in pulsū nota subsit, neq;  
 in urina cruditatis: suspecta uero hora, qua primo  
 die febris occupauit, extra meridiez sit ac præterierit  
 audacter hominez quā ocyssimē lauabis, longe an-  
 te sextam horam. Abunde tamen sit, si intra tertiam  
 horam lauationem cōpleueris. Ad eundem modū  
 si decimaz horam suspectam habueris, usq; ad septi-  
 maz laues licet, quū tres æquinoctiales horas, qua-  
 tuoruē inter balneū accessionisq; tps interponi, abū-  
 de sit satis. Vbi in balneo corpus icaluerit, oleo pus-  
 dulci tepido unctum, ac moderatim frictū mox deter-  
 geri extrinsecus abluīq; debet. Moderatim autē deter-  
 gent erui farina, tū hordei, tum fabarū. Post balneū  
 præter aquam q̄ parum apii incoctū in se habuerit,  
 nihil his est offerendum. Licet quod inter balneū &  
 suspectas horas spacium erit, triū ferē horaz cōicia-  
 mus. Si uero circa uesperā aut duab. horis citius ac-  
 cessio inuadet, tū lauissē mane licebit, tum cibasse,  
 sed tm̄ ptisanę cremore. Deinde si suspectę horę ni-  
 hil afferāt, & lauare rursus si uelit licet: & cibare. Sin  
 aliquid eueniat, & conferendum id est cum accessio-  
 ne quę primo die inciderat, & tum urinq; consideran-  
 de sunt, tum etiam pulsus. Quę omnia profecto me-  
 diocria apparebunt, ubi exigua relinquitur obstru-  
 ctio. Quare ipsum & lauabis. 4. die: & cibabis: ad iam  
 dictas considerationes spectans: sperabisq; nihil qn-  
 to die superuenturum. At si magna obstructio facta  
 sit, ea febris ex diariarum genere non erit.

R ii De



## De syncho cum putredine. Cap.

III.

Syno-  
chus.Continens  
febris.Differen-  
tia tresSyncho-  
rum.Acma-  
stici.Epacma-  
sticos.Paracma-  
sticos.

Causa.

Qui syn-  
ochis ma-  
xime cor-  
ripiantur.

**Σ**ύνοχος Græcis, febris est in qua una accessio ab initio ad finem perpetuò manens, in multos porrigitur dies. uel est, quæ omni mutatione magna usq; ad iudicium caret. Latinis potest dici continens. Huius autem febris duplex est natura. quædam nãq; notam putredinis prorsus nullam habet, & hæc ex diariarum februm est genere, ut diximus Cap. prox. & synochus non putrida uocatur: de ea hic nobis sermo non erit. quædam autem manifestam obtrinet putredinis notam: hæc est, de qua hic agitur, & dicitur synochus putrida. Februm uero quæ synochi seu continentes dicuntur, tres sunt differentiæ. nã quædam earum à principio usq; ad finem equali magnitudine perdurant, & dicuntur græcè ἀμώττοι καὶ ἀκμαστικοί, hoc est in eodem uigore permanentes. quædam semper augentur, & adiiciunt exiguum aliquid, Græci αὐξήσασθαι τὸ ὄν καὶ ἐπακμαστικούς, id est in clementum succipientes nominant. quædam paulatim diminuuntur, παρακμαστικούς Græci uocant: hoc est decrescetes, quemadmodum fufius tradit Gal. li. 9. The. meth. & lib. 2. de Diff. feb. Cap. 2. & lib. 2. de Crisib. Cap. 6. Putrida synochus fit ab iisdem causis, à quibus non putrida, nempe à uehementi stipatione quæ intra corpus febrilem calorem cohibet, & efficit ut in omnib. uasis, ac potiss. maximis equabiliter humores putrescant. quæ cunq; enim calida & humida sūt, difficilēq; trāspirationē habēt, ea facile quoq; putrescūt. Hinc est q̃ hoc genus febris nec in gracilib. uel q̃ raro sunt corporis habitu, nec in frigido corporis tēperamēto, nec in frigida etate excitetur: sed etate & tēperamēto calidis: ac præcipuē si & carnosus, & bono ac multo sanguine affluens, & denso corpore eger sit, aut etiam calidis excrementis refertus. Ex his itaq; constat, q̃ sanguis qui in uniuersis uasis, præsertim maxima



maximis circa alas & inguina existentib. equabiliter exuberans putrescit, synochi putridę causa existat. Qui ita febricitat, iis & pulsus maximus est, uehemens, celer, creber, & æqualis, haud secus ac in synocho nõ putrida, & uehemens. constitutio etiam arterię nec durior quàm pro natura est, nec mollior: celeritatis tamen & frequentię eò peruenit, quò febris ipsa magnitudinis. Atq; hæc quidem (ut diximus) ambarum communia. alteri uero de qua nunc agimus priuatim putredinis insunt notę, idq; tum in urina, tum pulsu, tum caloris higrata qualitate. Curandi ratio ut in synocho non putrida, à sanguinis missione au-  
1spicanda. Et ualida existente uirtute, nulloq; alio in signiter repugnante, sanguis usque ad animi deliquium auferendus. Maximum enim hoc, Galen. lib. 9. Ther. metho. autore, ubi ualentes uires sunt, synochi febris remedium est. Primum namq; in cõtrariũ statum agitur corpus, celerrimè ex animi defectu refrigeratum. Hoc uero nemo inuenire potest, neq; q̃ ipsis egris neq; quod nature quę animantes gubernat, iucundius utilius uè sit. Postmodum in eiuimodì corporib. necessario superuenit alui deiectio, nõnũq; etiam bilis uomitio. quas res statim à toto corpore sudores excipiunt. Quod si uero curare aliquando egrotum cogeris, cui non solum antea secundæ uenæ remedium prætermissum est, sed nunc quoq; uel per medicorum ignorantiam, uel ipsius laborantis propinquorumq; eius timiditatem, procedente tẽpore mittere sanguinem prohiberis, ad frigidã exhibendam accedes: sed diligenter antè discernens, quãtum ex ea nocumentum contingere possit. Nam si id aut exiguum erit, aut nullum, offerenda potui est q̃ prorsus sit gelida, quantum bibere egro libet. Quin-  
2imo magis id audebis, si frigide potioni insueuerit. Sin magnum timetur incommodum, ab hac quidẽ abstinendum, atq; aliis auxiliis quib. obstructio exi-

R iiii matur,

*ingrat*  
Curatlo

Sanguinis  
missio.

Quando  
frigida  
adhibenda



*Frigida  
quibus in  
comodat.*

matur, et abundantia uacuetur, et febris feruor deferebat, ut edū. Quę singula ē suis locis tibi petēda erūt. Porro incōmoda q̄ frigidā potionē intēpestiuē, imo diceq; exhibitā sequūtur, hęc sunt. Primū, quia lentos crassosq; humores, siue obstructiones, siue putredinē, siue phlegmonē, siue erysipelas, aut scirrū, aut ōdema creauerint, attenuari digeriq; phibet. Quoties igitur ex iis febris accēditur, ad eorū uacuationē frigida data non cōducit. Ad pręsens tñ non parū adfert leuamē, propterea quod iā accensā febrē extinguit: uerum quū causa eius adhuc permaneat, aliā de nouo accendi febrē est necesse, atq; ea quę pręcessit nonnunquam difficiliorem: propterea quod densatum ex frigida corpus est. Alterum incōmodum est, quod multas laborantis imbecillas particulas, siue ita se ex naturali intemperie habeat siue ex uitio adscititio, lēdit. Sic cōpertū est aliis gulā adeo uehementer esse lēsam, ut uix deglutirent. Aliis uentriculū, ut uix cōcoquerent. Aliis ipsum uētriculi os, aut iecur, aut colōn, aut pulmo, aut septum transversum, aut renes aut uesica, aut tale quippiam aliud à frigido percussū, ad propriam actionem infirmum est redditū. Nonnulli autem ex intēpestiua immodicaq; eius potione non multo interposito tēpore, nec postmodum, sed illico difficultate spirandi, et conuulsione, et tremore correpti sunt, ac toto (ut semel dicā) neruoso genere lēsi. Vt itaq; in pauca rem cōtrahamus quibuscūq; in ptincipe particula tumor aliq; phlegmonodes, aut ōdematodes, aut scirrhus constiterit, iis frigidam offerre non oportet: sed nec iis quibus obstructio putridus uē humor non concoctus incōmodat. Quod si uero euidentes percipis absq; iā dictis tumoribus cōcoctionis notas, neq; pars aliqua temperamento adeo frigido fuerit prędita, ut in hęc noxā procumbat, audacter frigidam dabis. quippe solidarum animalis partiū natura roborata, pretenualis



tis iam humoribus opponitur: ita ut qui utiles sint, atq; ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat inutiles uel per uentrem, uel per cutim eiiciat. Quod si etiam frigida assuetus eger fuerit, maiori cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scilicet experientia iam edoctus omnia uiscera eius occursum familiariter tolerare. Omnino namq; si quod frigidum adedum esset, ut ab hac offenderetur, per sanitatis id tempus euidenter offensam suam ostendisset. Ex iis perspicuum fit, continentium febrium maxima remedia esse hec duo, sanguinis detractione, et potionem frigidam. Verum illa nullo non tempore, modo uires sustineant: hec quum et in pulsu, et urinis coctionis euidentes cernuntur notae, febris autem est maxima. Vietus ratio hec potissimum fit. His quibus secta est uena, post duas a sectione horas prorsus cremorem exhibebis, quietemq; imperabis. Vbi a somnio excitati fuerint, rursus prorsus cremor prebendus. In hac uetus ratione usque ad tertium diem persistendum. Animaduertendum tamen in synochis febribus tum alendos esse egros, quo tempore sani consueuerant, et ubi maius leuamen sentiunt: ita enim alimentum facilius ferent. Quod si uires robuste fuerint, et uigor morbi, statim expectetur, tenuissimo uictu, et eo qui iam dictus est utendum erit: sin contra uires imbecillae fuerint, haud sine ingenti dispendio uictus tenuis exhibetur. ergo in cibis offerendis uirium robur diligenter perpendendum. Hec de curatione febris continentis putride sufficiant, plura si desideras, nemo desiderio tuo rectius satisfaciet preter Galenum, qui lib. 9. Teraph. methodi hac ex professo et copiosissime docuit.

Epilogus  
curatio  
nis.

Viētus ratio.

De continuis febribus. Cap. III.

**C**ontinuae febres sunt quae non desinunt ad intermissionem, remissionem tamen in singulis accessionibus habent. Differunt igitur a synochis,

Continuae  
febris  
quid.



*Causa.*

chis, quod scilicet he nullam prorsus feruoris remissionem obtineant, unicaq; illis sit accessio, que ab initio ad finem usque perpetuo manet. Fiunt propter humores qui intra uasa putrescunt: hacq; ratione ab intermittentibus differunt, in quibus humores eas excitantes per singulas corporis partes disperguntur, quo fit ut delationis impetu ipsæ per se ipsas expurgentur. Nullum certius inditium febrium cōtinuarum est, quàm quod nulla illarū ad infebrecitationē perueniat, donec ex integro desierint. Atq; à si

*Signa.*

nochis facile discernuntur per remissionem, quā in singulis accessionibus obtinent. Sunt autē febrium cōtinuarum tres differentiæ, quæ iuxta humoris inuenis putrescentis diuersitatem procreantur. Si enī

*Differen  
tiæ tres fe  
brium cō  
tinuarum.*

flaua bilis putrescat intra uasa, tertiana cōtinua, quæ alio nomine καὶ σὸς Græcis, ardens uero latinis nominatur. Si pituita, quotidiana cōtinua ueluti si atra bilis, quartana cōtinua nascitur. unde liquet, cōtinuas febres idem habere genus cū intermittentibus. cū tertiana quidem exquisita, exquisita ardens: cū quotidiana uero ea quæ quotidie quidē facit accessionē, sed nunquam definit ad infebrecitationē. Cū quartana illa quæ quouis die inuadit, sine ulla intermissione. Porro quum continuæ febres ex putridarum

*Curatio.*

sint genere, necesse erit ut qui illas curare uolet, putredinem inhibeat. Ita duæ statim se indicationes exhibent, quarū altera à febrī, altera uero à putredine sumitur. Atq; à febrī rursus duæ, scilicet ut portio febris quæ iam accensa est, percuretur: quæ uero in generatione est, inhibeat. Aliæq; duæ à putredine, ut quod putredinis iam factū est, sanemus, & quod in generatione adhuc est, sistamus. Porro quod in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac quoq; aliæ duæ indicationes nascētur, tum ut quod retentū est uacuetur, tū quod retinendū est prohibeatur. Sanè prohibebitur iis præsiidiis, quæ obstructio-

ni me-



ni medentur. Huius rursus obstructionis quod iam occupauit, sanadū est: quod futurū est, propulsandum. At curabitur quidem obstructionis quod iam factū est, per ea quę obstructa liberāt. propulsabitur quod futurum est, si affluxum obstruentium succorum cōpescamus. unde satis liquet, quod ultimū in ipsa resolutione methodo est inuentum, id primum omnium in curatione est peragendum. Quum itaq; particula tim rem expendentibus, quinque sint in febribus continuis à quibus indicationes colliguntur, febris nimirum, putredo, perspiratio impedita, obstructio, humorum destruentium copia, à postremo curandi ratio auspicanda erit. Copia itaq; humorū requirente uacuationem, principio, si ualida fuerit uirtus, tempus et ætas, atq; alia consentiant, sanguinem mittere oportet. Vacuata multitudine ad alterius, puta obstructionis, curationem accedendū, medicamentisq; iis quę obstructiones tollere possunt utendum. Verum quoniam horum pleraq; calida sunt, metus est ne tū putredinem, tum febrem augeant. Itaque iis q̄ citra calorem liberare ab obstructionibus ualeant, utemur. Qualia uero hæc sint diximus supra, capite nimirum secundo huius libri. Vbi autē q̄ obstruunt deterfa dissectaq; sunt, per aluum, urinas, et sudorem ea uacuare tentandum. Quū uero materie quę hæc efficiant etiam calidæ sint, necesse est interea tum putredinem tum febrem augeri. Quare quoad licet, id agendū, ut quę minus calefaciat materia deligatur. aut si qua inueiri potest quę non calefaciat, quę admodum in hoc casu balneum, utiq; ea petēda est. balneum uero id posse Galenus lib. tertio de tuenda ualitudine iis uerbis docet: Dulcium calefactarū aquarum, sit tepidiores sint, uis humida et frigida est. Et paulo post: Balneū si probè adhibeas, duras tensasq; partes emollit, excrementum, putreq; si quod intus ad cutem heret, euocat. His itaq; peractis, et deterfis iis quę

Vena se  
ctio.



quæ cuti impaeta fuerunt, atq; adeo obstructione ac impedita perspiratione amota, ad putredinis curationem ueniendum est. Hoc itaq; tempore etiam uires roborare, quo & putredinem superent, & succos concoquant, studebimus. Putredinem etiam sanabimus. si id quod iam corruptum est, omni ratione uacuabimus, quod reliquum est, moderatis motibus & refrigerante perspiratu, ad exactam mediocritatem reducemus, ac uacuationem eorum per urinam, deiectiones, uomitum, ac sudores moliemur. Vltimo ad febris curationem progrediendum, quæ quidem per refrigeratiam fieri solet. Omnis. n. febris, qua febris est, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Quæadmodum aut horum quodq; recte fieri debeat, partim antea dictum est, partim etiam in sequentibus commemorabitur.

De ardente febre. Cap. V.

Ardens  
febris.  
Causa.

**A**rdens febris est, quæ Græcis (ut supra quoque dictum est) καὶ πυρετός uocatur. Estq; ex genere continuarum. Fit, quando flaua bilis in uenis putrefcit atq; adeo cum tertiana intermittente, eo quod ab eodem procreetur humore, comunicat. Differt autem, quod in hac per totum corpus bilis defertur, in ardente autem febræ flauæ bilis humor in nasus una cum sanguine continetur. atq; ob eam etiam causam in adurente febre singulæ accessiones ad infebrecitationem non perueniunt. Quando uero in iis bilis etiam uehementius agitatur, & à natura inualecente compellitur, tunc rigor superuenit, & febris soluitur. Id quod Hippocrates in Aphorismis iis innuere uerbis uoluit. A febre ardente habito rigore superueniente, fit solutio. Dignoscitur uero iis notis. Lingua eorum qui hac febre affliguntur, arida fit crassa, aspera, & nigra: uentriculi erosio, fitis intolerabilis, uigiliæ, nonnunquam etiam delirium eosdem infestat. Deiectiones etiam pallidæ sunt. Quod ad curandi rationem

4. Aph.

18.

Signa.

Curatio



nem attinet, prima febre ardente laborantium præfi-  
 dia sunt, ut decumbāt in frigido loco ad suauem au-  
 ram exposito, à qua purus diffletur aër, culcitra etiā  
 molli, quæ frequenter sternenda est. Stragula tenuis-  
 sima sint, et minime sordida. quæ assidue mutantur,  
 habeatq; lectus insignem latitudinem, ut ad diuersas  
 subinde partes membra calefacta transferri commo-  
 de queant. Tum aër ignauior flabello excitetur, pec-  
 tus ac stomachus foueantur palmulis cum rosaceo,  
 aut oleo cotoneorum tritis. Conueniunt et alia re-  
 frigerantia medicamēta, ut sunt palmites, intybum po-  
 lygonum, plantago, ramenta cucurbitæ, lactuca, oxa-  
 lis, folia uitis, et similia. Sudariolum quoq; tenue co-  
 plicatum, oleoq; et aqua calentibus madefactum, sto-  
 macho et pectori applicetur: id enim febrium ardore  
 mirum in modum sedat. lana quoq; quantum manu  
 capitur aq; et oleo rosaceo calefactis imbibita è sub-  
 limi in pectus expressa, feruoris uehementiam facile  
 obtundit. Hec autem calida esse oportet. nam tepida  
 membrorum uigorem exoluunt. Nec frustra in ardē-  
 tissimis febribus etiam acetum admiscebis. Cibi of-  
 ferendi sunt, quibus refrigerandi et humectandi uis  
 inest: qualis est lactuca, cucurbita, cremor ptisanæ,  
 et similes. Potus sit decoctum cinamomi, aut ompha-  
 cium: et si asueuerit æger, post cibum frigidam deglu-  
 tiendam dato, quantum est cochleare unum aut duo.  
 Vel cū decocto hordei misceantur iuleb. ut uocant,  
 uiolarū, rosarū, et iis similia. succo præterea solarū ro-  
 sarum stomachū recreabis: atq; alias refrigeratiōes  
 machinaberis, uirentibus uitis, rosarum, nymphææ,  
 uiolarū foliis et floribus, solum sternendo, et aquam  
 frigidam sæpius irrigando, riuulosq; aquarum mo-  
 liendo, quæ ex propinquo suauiter instrepant. Inter  
 initia uero statim, si ætas tempus, uirtus, et alia eius-  
 modi permiserint, uenam incidere oportet, ut ex Ca-  
 pite præcedente etiam satis liquet. Epithemata uero  
 et reliqua

Tepida  
 membrorum  
 uigorem  
 exoluunt.

lib. 5. cap.

Vena se-  
 ctio.  
 Epithema-  
 ta quo tem-  
 pore adhi-  
 benda.



et reliqua refrigerantia in principiis et incrementis accessuum non sunt ad mouenda: hoc enim tempore corporis affectus adhuc ambigit, et calor uiscera obsidet: quapropter adhibita calorem in profundum repellendo, maioris nocumendi occasionem prestant igneus enim calor intus repressus, uehementiori rursus ardore excitatur: sed in uigore, calore iam per uniuersum corpus explicato. tum enim residuum caloris preter naturam circa uiscera derelictum, prompte extinguetur. Hinc egri melius spirare incipiunt, et leuiori siti infestantur. Quidam etiam rorido effluente uapore deliniri, somnum capeffunt. Sint autem epithemata eiusmodi, quæ ꝑ. succi rosarum, lactuce añ. ꝑ. iii. s. succi intybi domestici. ꝑ. ii. s. aceti optimi. ꝑ. i. s. santalorum omnium añ. ꝑ. i. caphure gr. iiii. misce, fiat epithema. Porro instante totius morbi uigore, et nullo eorum quæ dicta sunt Cap. 3. prohibente, danda syncera frigida. In curatione siquidem febrium ardentium horum alterum fieri necessarium est, si perfecte morbus solui debet: aut biliosos humores excerni, aut eosdem extingui. Excernuntur itaque per uenę sectionem, sudores, uomitiones, et aluius. Extinguuntur autem frigide potu, quo ardentissime febres non raro ex toto curantur. Ceterum balneum his solum usui est, qui citra tumores inflammationi aut erysipelati consimilem, ardenti febre laborant, in urinisque apparuerint coctionis signa. Aeger qui lauacro frigido uti uult, sit iuuenis, carnosus, tempus quoque estiuum ac constitutio anni calida et sicca, nec eo utatur nisi in febris uigore: idque maxime faciat, si frigide lotioni affueuerit. Moderatiori uero existente febre, robustaque uirtute, sinui cum coctionis notis, conferunt dulcis tepereque aque balnea: hæc. n. refrigerant et humectant, ut diximus. Exunctionibus chamemelinum oleum est, si pluuens aer frigidus sit, puenit. Magis ex quibus remedia ardentium feb. componunt, copiam ex seq. petes ca.

De

Epithema  
ta.Aqua frigida  
quæ  
danda

Balneum.



## De exquisita tertiana intermittente. Cap. VI.

**T**ertiana quidem febris intermittens exquisita est, quæ ex flaua bile per sensiles corporis partes delata oritur, et sui ipsius naturæ puram atque synceram seruat, et dignoscitur iis notis. In biliofioribus natura corporibus consistit, et uigenti ætate, tempore æstiuo, et calidis et siccis regionibus, similiq; æris constitutione, uita etiam laboribus, uigiliis, curis, ac solis feruori addicta. Ad hæc in eo quoque facile tertiana exquisita accenditur, qui cibis ac potionibus calidis et siccis antea usus est. Hæc etiam statim ab initio inq; singulis accessionibus rigorem uehementem affert: qua una ratione ab ardente febre, ut antea commemoratum est, differt. A quartana uero rigore in hoc distat, quod corpus pungeret, ac ueluti ulcerare uideatur: cum quartana refrigerationem habeat simillimam ei quæ hyberno tempore sentitur. Tertianam itaque febrem non contingit fieri sine rigore uehementi, pungente ac uulnerante carnem. Quartana uero, neque primo die statim cum rigore inuadit uehementi, nam progrediente ipsa atque aucta, una etiam rigor augetur: sensusq; egrotantium non est quasi eorum qui punguntur, sed potius qui refrigerantur, et ueluti ad ossa usque molestantur. Est quoque in tertianis pulsum exactus ordo et equalitas, qui tamen ad uehementiam, magnitudinem, et frequentiam in accessionum incremento excitantur. Præterea et sitim in uigore inuehit, ac hominem exurit ut abiectis uestibus eger denudetur, ampleq; et frequenter spiret, exuffletq; ueluti flammam, frigidamq; potandam flagitet. Calor equaliter subinde per totum corpus extenditur, nihiloq; magis thorax quam extrema calent. Et si manum injeceris, occurrit primum plurimus ac mordax calor, et cum aliquo ueluti uapore elatus, non multo tamen postea à manu euincitur. Et  
iam

Causa.

Tertiana

exquisita.

Signa.

Quarta

ne rigor

quo distet

a rigore

tertiane.



*Tertianæ  
exquisite  
Curatio.*

*Potus.*

iam bibendi tempus adest egrotanti. Vbi uero potio  
ne fuerit recreatus: statim copia uaporis calidi per cu-  
tem emergit: sudoris nuncia. Bilis etiam uomitio su-  
peruenit: aluusque soluitur: et biliosum mingunt. Pre-  
terea ad integritatem in febricitationem uel definit:  
ubi accessionis tempus horarum non plurimum duo-  
decim expedierit. Nam hoc tempus longissimum est in  
in ueris tertianis. Quæ singula fusius explicat Gale-  
lib. 2. de Crisib. Cap. 3. Tertianam autem exquisitam  
que ex flaua bile comota inualescat quæ maxime fie-  
ri potest: refrigerare ac humectare oportet. is enim humor  
inter omnes qui in corpore sunt, calidiorque; ficciorque;  
existet, Aeger itaque decumbat in loco frigido ad au-  
ram suauem, ut Cap. 5. etiam dictum est, exposito. So-  
lum etiam spargatur frequenter aqua frigida, aqua  
stillaticia rosarum, uiolearum, et similium. Humi etiam  
sternantur folia salicum, uitis, flores rosarum, uiole-  
rum, nenupharis ac eiusmodi. Cibis utantur ægri,  
quibus humectandi et refrigerandi facultas inest. Ex ole-  
ribus quidem attriplici, blito, malua, lactuca, cucur-  
bita: lapathio: intybis, et similibus. Ex aliis uero ptisa-  
ne succo et piscibus saxatilibus. Ex uolatilibus, que  
mollibus præstat carnibus. Quæ uero talia non sunt,  
eorum alis: testiculis quoque gallorum, suillisque; pedi-  
bus, et cerebro. Porcello etiam si dederis carnem li-  
quefactam, nihil nocebis. Sed et oua ad sorbendum  
sunt offerenda, præsertim uitelli eorum: nam hi faci-  
lius quam pars alba concoquuntur. Ex fructibus præ-  
mittendum, ut illos degustent qui non omnino ad  
concoquendum difficiles sunt. Abstinentium autem  
à melle, sinapi, salitis, omnibusque; acribus. A uino ue-  
ro, antequam morbus concoquatur, omnino arcen-  
dus æger. Interim bibat decoctum cinamomi, aut hor-  
dei, aut hoc quod R. Zulapii uiolacei. 3. iiii. decoctio-  
nis cinamomi lib. 1. misce, fiat potio. Cæterum ubi  
concoqui coeperit morbus, dandum est ab initio ui-  
num



num tenue, a quo sum: & paucum: ubi uero iam prope est ut morbus solvatur, amplius est offerendum. Qd ad somni rationem attinet, in accessione non est dormiendū, sed uigilandus potius, ut sanguinis, spiritus & caloris naturalis ad interiora motio impediatur, atq; adeo in contrarium & ad exteriora retrahatur. alias enim febres uix dissoluuntur, & ad consistendū tempus tardissimè perueniunt, fluxionesq; multiplicantur. Finita accessione somnus non improbatur. Exercitia & omnes uehementiores motiones cauenda, ne cum Herodico, cuius Hippocrates meminit, egrotantes interimamus. Animi perturbationes: ira potissimū: timor: mœsticia: & similes: fugiendæ. Non solum uero prædicta uictus ratione, sed medicamentis etiam refrigerare & humectare conuenit. Quapropter hæc aut consimilis potio haurienda erit, quæ R. florum uiolearum, boraginis rosarum añ. M. i. florum nymphæ. M. s. intybi hortensis utriusq; (endiuiam & scariolā hodie uocat) lactucę utriusq; añ. M. i. s. pasfularum purgatarum. 3. i. prunorum damascenorum, añ. num. xi. seminum intyborum, lactucę, portulacę cucurbitę añ. 3. iii. radicum cichorii. 3. vi. Decoquantur singula in duabus libris aquę fontanę, donec tertia pars cōsumpta fuerit. dein colentur, & colatus humor saccharo dulcescat, & cum oui candido clarificetur, atq; adiiciantur syrups de intybo domestico latifolio, zulapii uiolacei añ. 3. ii. s. fiatq; potio. Aut si potio egrotati displicet, detur hoc ecligma, qd R. Cōseruę uiolarū, boraginis rosarū: nymphę, cichorii añ. 3. s. diaprunorū non solutorū. 3. vii. diarrhodon abbatis. 3. i. Specierū diatria santalorū. 3. ii. cum zulapio uiolaceo qd satis est, fiat ecligma. Non neglīgēda præterea biliosi humoris, si res ita exigat, uacuatō: s; eū sanè qui ad stomachū cōfluit, per uomitum educere opz. Qua uero ratione sit ciendus, in superiorib. libris est annotatū. Euz aut q ad inferiora repit,

In accessione non dormiendum.

Decoquantur alterans.

Ecligma.

Euacuatio.

alui



**Clyster.****Absyn-  
thium.****Sudorem  
prouocās****Bainem.**

alui defectionibus elicere oportet: hoc quidem & spō-  
te fieri solet in tertiana exquisita. Alius itaq; mol-  
lientibus clysteribus exinanienda est: qualis est qui  
℞. Maluę utriusque, herbe uiolearum, Mercurialis,  
intybi domestici, angusti folii, hoc est scariole, añ.  
M. i. seminum portulacę, melonum añ. 3. 2. s. Deco-  
quantur in aqua iuste quantitatis, quoad tertia pars  
absumpta fuerit. Colaturę adiciatur casie fistula-  
ris recens extractę. 3. i. olei uiolacei 3. iii. salis com-  
munis. 3. i. s. misce, fiat clyster. Per urinam quoq; & su-  
dore diuertere oportet. Vrına igitur potionibus,  
in quibus apium aut anethum maduerunt, prouocā-  
da. Et si coctionis notę apparebunt, iam tuto absyn-  
thium dabis; q̃ alioquin summum est uentriculi re-  
medium ubi bilis hunc infestauerit, si pręsertim ex  
ipsius coma quantum sufficiat accipiens, melicrato  
intinxis. Sudorem uero hoc uel consimili medica-  
mento euocabis, quod ℞. Radicum apii, asparagi, ci-  
chorii, añ. 3. s. seminum oreoselini, fœniculi, rusci,  
smyrni añ. 3. ii. cicerum nigrorum. 3. iii. anethi. M. s.  
Decoquantur singula in aqua fontana iuste magni-  
tudinis, colentur subinde, & colatus humor saccha-  
ro dulcescat, & adiciantur oxymelitis compositi, 3.  
ii. & fiat potio. Aut singula iam dicta redacta in pul-  
uerem exhibeantur, qualibet uice. 3. i. aut. 3. i. s. cum  
oxymelitis. 3. iii. Idipsum uero in declinatione acces-  
sionis, aut die qua eger à febre liber est, faciendum  
erit. In hunc usum proderit inunctio ex oleo chame-  
melino, & anethino, ac similibus. Balnea quoq; cali-  
da ex aqua potabili prosunt, tum quia aliquid bilis  
educunt, tum et quia sua qualitate plurimū iuuant.  
Naz huiusmodi balnea humectant, & potētia refri-  
gerant. Marine autē aque, & salse, nitrose, aq̃ sulphu-  
reę, plus quidem bilis educunt: s; multo minus quāz  
potabiles prosunt. Pręstat uero neq; ipsas utiles dice-  
re, q̃nquidē plus qualitate nocent, quāz euacuatiōi-  
bus



bus iuuent. Semper autem oportet contrarias quali-  
tates illis quę præter naturam inualuerunt oppone-  
re: quum hoc multo plus iuuet, quam quomodoli-  
bet euacuare. Hęc igitur in balneis intetio fit, ut cor-  
pus madeat & humectetur: atque idcirco neque ni-  
trum, neque salem, neque sinapim inspergere oportet.  
at plurimum oleo calido perfusos egros ad a-  
quam perducere, ac madefacere. Et si in ea natate uo-  
luerint, quamdiu potuerint, permittendum. At qui  
balneis admodum delectantur, si etiam bis in die la-  
uari permiseris, non aberrabis, ut Galenus perspicue  
libro primo ad Glauconem Capi. 9. docet. Verum  
illud semper in memoria habeto, ut id in tempore  
faciant. Si uero signa iam coctionis ostendantur,  
tunc etiam si sepius laueris, nihil delique ris.

Contraria  
qualitates  
illis quę  
præter na-  
turam op-  
portet ad-  
ministrare.

## De tertiana notha.

## Cap. VII.

**T**ertiana notha fit, quando bilis maxima ex par-  
te pituitę miscetur. Hinc est quod non singu-  
la signa, ut in exquisita, pure bilis naturę præ-  
se ferant. In ea etiam accessionis tempus duodecim  
horas excedit: neque etiam, ut exquisita, septenis cir-  
cuitibus iudicatur. Tardius denique in hac ipsa spu-  
ria tertiana coctionis notę apparent, neque tantus  
etiam in uigore calor. Accedit quod non finiatur,  
ut exquisita sudoris copia. Viſtus ratio non sit in  
uniuersum in hac febre, quę refrigeret atque hume-  
ſcet: sed aliquid quoq; assumat q̄ calefaciat & inci-  
dat. præiacet enim crassior, neque adeo calida bilis.  
Plurimum igitur ea laborantes iuuat ptisanę cre-  
mor, adiecto piperis modico, uel hyssopi, uel origa-  
ni. Sorbitiones etiam concoctu faciles dandę sunt.  
Porro cū accessionis tempus longius sit, atq; adeo  
integrum diem duret, non sanè quotidie, sed alter-  
nis tantum diebus cibum exhibere oportet. hac eni  
ratione ne morbus augeatur cauebimus. Verum cu-

Causa  
signa

Viſtus.

S random



randum etiam unice, ne egrotantis vires, quæ longiori tempore debent laborare, prosternantur. Quapp difficile admodum est seruare utrunq3. quoniã inedia quantum prosunt, ad morbi coctionem, tm̃, uel plus efficiunt uiribus: cibi uero quantum egroti robur adaugent, tantum coctiones impediunt. Quare inedia quidem, ubi ualētiores fuerint vires, et morbus cōcoctu difficilis fuerit, utendū. largiori uero cibo, ubi vires sint imbecilliores, neq3 morbus concuctu cōtumax. Potus sit decoctus cinamomi, aut hordei, in quod (ut dictū est) aliquid hyssopi aut origani iniectū sit. Quies etiam conducit. Quod ad curationem attinet, si sanguinē mittere opus est, neq3 hoc omittendum, sed ab initio statim adhibita etatis, temporis, regionis, habitus corporis, et similitum distinctione: tantumq3 sanguinis detrahendum, quantum præsens exigit status. Clysteres quoq3 non admodum molles iuuant, qualis est qui ꝛ. Maluę, mercurialis, foliorum uiolarum, origani, hyssopi añ. M. i. cartami p. ii. coquantur singula in aqua iustę quantitatis. colaturę adiciantur benedictę laxatiuę uocatę, hierę picę añ. 3. iii. mellis rosacei. 3. vi. oleorum uiolacei, chamæmelini añ. 3. i. s. salis communis. 3. ii. fiat clyster. Ceterum danda etiam decocta, quibus ea insunt quę citra plurimam calefactionem et exiccationem incidere et urinam ciere possunt. cuiusmodi est id, quod ꝛ. Radicum apii, fœniculi, cichorii añ. 3. i. intybi domestici utriusq3, origani, hyssopi añ. M. i. lactucę. M. i. s. seminum quatuor frigidorum communium añ. 3. i. seminū fœniculi, apii añ. 3. i. s. Decoquantur in aquę lib. ii. donec tertia pars absumpta fuerit. Colatus humor dulcescat saccharo sufficienti, et oui albuminibus purificetur, ac subinde adiciatur sirupi acetosi simplicis, mellis rosacei colati oxy melitis simplicis añ. 3. i. s. et fiat potio. Posthęc ea quę uentre placide subducunt sunt exhibenda, ut dilu-

tuna



tam rhabarbari, ecligma de psilio, indi appellatur: et alia eiusmodi, quæ bilez cum pituita educere possunt, qualia multa in superioribus libris sunt annotata. Post septimū diem iugiter decoctū comæ absynthii dandum est. Multos quoq; iuuat oxymeli se solo potum. Vomitus autē à cibo adeo iis quibus hæc feb. p. durauerit utilis est: ut multi, Galeno lib. i. Metho- di medendi ad Glauco. teste, hoc uno presidio statim fuerint curati. Hypochondria quoq; calidis fouenda sunt medicamentis, ut scz flatus, qui ea distendunt, discutiantur. Conuenit uero hoc potissimū fomen- tum, quod R. Florū chamemeli, meliloti, anethi. M. i. absynthii. M. s. rosarum rub. p. i. seminum fœnigræci, lini añ. 3. iii. Buliant singula in aqua sufficienti, donec tertia pars cōsumatur. Dein spōgia in hac ma- defacta, hypochondria foueantur. Poterit etiā uen- triculus hoc aut simili unguento inungi, quod R. Olei mastichini, rosacei, chamemelini añ. 3. iii. Pul- ueris charyophyllorum. 3. i. s. ceræ quantum satis est, fiat unguentum. Ceterum in tertianis non exquisi- tis, neq; statim circa initia balneare expedit, s; quum primum notæ coctionis apparuerint.

Vomitus.

Fomentus

Vnguentum.

Baineum.

## De quartana. Cap. VIII.

Signa.

Causa.

**A**lterū genus febriū intermittētiū est exquisita qu-  
tana, quæ ex solo atre bilis hūore putrescēte gnat. Hæc quæ nō primo statim die cū rigore inuadit uehe-  
menti, s; talis est qualis iis quæ uehemēti gelu frigescūt. Progrediente autem ipsa atque aucta, unam etiam  
rigor augetur, inualescitq; quotidie usque ad totius morbi incrementum, sensusq; eius non pungentis sti-  
mulantisuē cutem, sicut in tertiana, sed uehementem algorem inducentis, et tanquam ossa frangentis est. Pulsus in ea satis tardi sunt ac rari. Caloris motus,  
incrementum et uigor tertianis febribus contraria snt. In ea enim humor paulatim ueluti sapis aliquis

S i aut



aut testa, aut os, aut tale aliquod huiusmodi corpus frigidum & siccum succenditur. Vbi uero aliqua ex eo flamma fuerit accensa, nihil fumidum, aut à se incombustum in accessione relinquit. Atque idcirco in hoc humore longiores sunt cessationes, quàm in pituita, atque intermissio exquisitè pura uidetur: quoniam hic quicquid atræ bilis fuerit accēsum, exhauritur, atque dispergitur. Bilis præterea flauæ uomitus quartanam non comitatur. Vrinę, tanquam per crassiorem materiam excolatæ, sunt tenues, albæ, & aquosæ. Adhęc in autumnno potissimū incipit, erraticis superueniens febribus. Ceterum in spicienda & laborantis natura seu temperamentum, uictus ratio quæ antecessit, regio, ætas & alia eiusmodi. Si enim frigida & sicca fuerint, tunc certius quartanam futuram sperabimus, potissimum ubi eo tempore quartanę febres populariter uagabuntur. Porro quod ad curandi rationem attinet, quartana laborantes initio moderatè & leniter tractandi sunt, neq; ullo fortī medicamento, aut euacuatione irritandi: nisi forte sanguis uehementer exuperare uideatur, tū enim sanguis auferendus. Et si uena incisa, defluens sanguis niger ac crassior fuerit, audacius mittendus est. Quod si uero flauus aut tenuis apparuerit, statim suprimendus. Venam uero secare oportet lienarem uocatam, aut quę est in sinistro cubito, mediam. Vinctum instituere conuenit optimum, eum nimirum qui minimè flatuosus sit. A suillis itaque carnibus arcendi sunt æ gri, atque ab omnibus eduliis quæ uiscida ac tenacia sunt, & tardum habent exitum, atque ab omnibus quę refrigerant & exiccant corpus. Utendum uero est uolatilibus montanis, quę boni succi sunt, & non in paludibus degunt. piscibus etiā qui molli carne tenacitate carente præditi sunt. Salsa etiam, & sinapi in cibo, ut incidantur & extenuentur humores, adhibenda sunt. Vino utendū est albo ac tenui

Curatio

Venę sectio.

Victus ratio.



nui, & mediocriter calido. A frictionibus autem & de ambulationibus, & aliis hominum consuetis studiis, non sunt penitus prohibendi. A balneis tamē si possunt, omnino abstineant, frictionibus dūtaxat adhibitis. Et si brevis, nec admodum uiolenta quartanæ accessio fuerit, nihil nocebit si diebus inter accessiones mediis ad consueta exercitia se transferant. Ceterū clysteribus quoq; utēdū, à principio quidē mollioribus postmodū uero acrioribus. Molles ex precedenti Capite petes. paulo acrior hic est, q̄. Maluē. chamemeli, mercurialis, foliorū uiolarum añ. M. 3. i. folliculorum senē, polypodii añ. 3. v. hæmionitidis M. i. s. Decoquantur in aqua iustę quantitatis. colati humoris accipe lib. i. & adice casę fistularis. 3. i. ecligmatidis diasenæ. 3. s. olei cōmunis. 3. iii. mellis rosacei. 3. s. salis gēme nominati. 3. i. fiat clyster. certis ēt diebus dandum medicamē quod diatrium pipereō uocatur. Imò recte fecerint egrotantes, si quotidie piper cum aqua biberint, Galeno lib. i. ad Glauconem autore. Hęc quidē in principio & augmēto potissimū sunt faciēda. si uero in uigore morbi egrotus esse uideatur, tūc tenuiorē uisus rationē adhibere cōuenit, quā ante uel postea. statim uero pręciendū, ut in longū tēpus quiescat, ac uisceribus prouidendū unguendo, illinendoq; his quę mollire ac laxare possunt, quælia sunt quę ex farina hordeacea, semine apii, iride, cumino, ruta, & iis similibus cōponuntur. Inter cetera uero hypochondriū sinistrū hoc unguento erit unguendū, quod ʒ. olei de capparibus. 3. iii. oleorū irini amygdalarū dulcium añ. 3. ii. Seminis apii, cumini, radicis iridis añ. 3. i. cerę quod satis est, fiat unguētum. Post hęc utendū medicamētis quę ciendi urinā uim obtinent. In quę sanē usum mulla propināda, in qua anethū, aut ruta, aut apiū decoctū sit. Mox si coctio nis notę apparuerint, purgandū medicamentis, quæ atrā bilem euacuāt, idq; nō semel tātum, sed sepius, si

Clysteres.

Unguentum.

Urinam cienda.

S iii fuerit



Vomitus.

Theriaca.

fuerit necessariū. Qualibus aut medicamentis purgantibus utendū sit, libro primo in Cap. de Melancholia expositū est. Laudat tñ præter alia Aëtius, uinū dulce infusū in colocynthidis cavitatē, sic tñ ut illi admisceatur quidpiam apii, aut dauci, iucunditatis gratia. Utendū quoq; uomitu à cibo. Et si nihil prohibuerit, elleborus albus est exhibendus, primū quidē permixtus raphanis: ut in superioribus ostensum est libris. quod si nihil fecerit, elleborus ipse. Quod si q̄piā ab elleboro abhorruerit, hoc aut simili uti poterit, quod ℞. succi raphani. ℥. iiii. oxymelitis simplicis ℥. ii. misce, ac tepidū bibendū exhibe. Qui uero nequeunt euomere, hi p̄ inferiora purgādi. A purgatione dādū medicamentū ē uiperis, qđ theriacā uocant: aut illi facultate simile. Quicūq; inter morbi initia, aut omnino ante uigorē, aliquod ex iis medicamē exhibent, q̄rtanā quē simplex erat, sæpius duplicē faciūt, aut oīno maiore difficiliorēq;. Ex duplici aut triplicē, uel prorsus ambas maiores difficilioresq; reddūt.

## De quotidiana. Cap. IX.

Causa.

Signa.

**Q**uotidiana febris intermittens ex pituitæ putredine, per sentientes corporis partes à natura detrusa, ortum habet. Dicitur Amphimerina Græcis, qđ amborū diei scilicet ⁊ noctis particeps sit. singulis. n. diebus accessiones facit, q̄ ad infebricitationē ac integritatē nō definūt, occupantq; ferē decē ⁊ octo horarū spaciū. His uero potissimā signis dignoscitur. Haudquaquā cū rigore primo statim die inuadit, sed progressu temporis refrigeratio potius quā rigor occupat. Pulsus, quū primū accessio fit, ordinatus est, ⁊ inæqualis, tardus, paruus ac debilis. Neq; uero in augmēto motus uelocitas, magnitudo, atq; uehementia quotidianis adsunt. Calor nō tā acris ac uehemēs, ut in tertiana: neq; n. adurit egros, neq; multū ⁊ crebro spirare cōpellit, ac ueluti flāmā ex ore



ex ore efflare, uel frigida expetere: sed humidus ac fu-  
mosus cum multo uapore comixtus. Aegre quoque ac-  
ceditur, ac longum consumit tempus, dum inualescendo perue-  
nit ad summum. Minime denique sic febricitat, sicut: quod  
non duntaxat lingua, imo totum corpus in hac febre hu-  
midissimum sit. Urinae in quotidianis uel albae, tenues  
et aquosae: uel crassae, aut turbulente. Nullus omnino  
fudor in primis diebus erumpit, neque unquam exacta  
febriendi quies attingitur. Vomitus etiam pituitosi iis  
accidunt et quae per aluum excernuntur, frigidiora et  
humidiora, crudiora, aquosiora, et pituitosiora sunt.  
Uniuersum quoque corpus in hisce febribus plenum  
crudis humoribus inuenitur. Ceterum quotidiana fe-  
bris humidas pituitosas uel naturas maxime infestat.  
Hyemis quoque tempore, humida et frigida constitutio,  
senili, aetate, et puerili, his denique qui ocio plurimo  
dediti sunt, crapulis, ebrietatibus, balneis, assiduus,  
post cibum praesertim utuntur, quotidiana febris facile  
accidit. Quae singula indicia Galenus fufius lib. 1. ad  
Glaucanem Cap. 7. et lib. 2. de Diff. feb. cap. 4. atque li.  
2. de Crisibus ca. 5. prosequitur. Victus ratio in hac *Victus ra-*  
febre in uniuersum sit incisoria, ideoque ad ea Capita *tio.*  
recurrendum erit, in quibus qualis sit ista victus species,  
a nobis in superioribus libris saepe traditum est. Primis  
quidem diebus aluus clysteribus, mollientibus eluenda  
est. Dein oxymelite utendum, et aliis quae urinam elicere  
possunt. Conuenient igitur decocta ex radice apii, oreo  
selini, iridis, faeniculi, et similibus antea saepissime com-  
memoratis, cum syrupis acido composito, melle rosa-  
ceo, de duabus radicibus, et aliis quibus incidendi et  
extenuandi facultas inest. Circa statum uero de uentri-  
culo est habenda sollicitudo, praesertim de eius ore.  
Quare ante cibum hoc utendum unguento, quod igitur. Oleo  
rum mastichini, absinthini, nardini an. 3. ii. s. mastiches, *Unguentum,*  
garyophyllorum, ligni aloes an. 3. s. cinamomi. 3. i. cum  
cera quod satis est: fiat unguentum, quo uenter inungatur.

S iiii Deinde



Vomitus.

Deinceps iubendum est, ut egri à raphano ⁊ cibis asumptis uomant. His ét utendū medicamētis, quæ pituitā subducūt: qualia multa in præcedētibus libris cōmemorauimus. Hęc pro curatione febris quotidiana, quę raro admodū accidit: sufficiant. Nam quæ hic desiderātur, in præcedētibus abunde docuimus.

## De hectica febre. Cap. X.

Hectica

quid.

Hectica

cur dicta.

Hectica

corporis.

Causa.

μαλακός

μαλός

**H**ECTICA febris appellatur, qñ calor præter naturā non solū in spiritibus, ⁊ humoribus, sed iam in partibus etiā solidis consistit. Hectica uero dicitur, uel quod firma ac fixa sit, ac difficulter soluatur, quemadmodū habitus: uel quoniam habitum corporis comprehendat. Sic enim uocare cōsueuerunt, longas partes humidis distinguētes. Hecticę autē febres duplici modo generātur. primum magna quidem ex parte ex ardentibus febribus, quę tñ protrahuntur, ut lōgitudine temporis humorem in corpore cordis contentum absument: uel fieri potest, ut eius adhuc magna portio reseruetur. Ille uero non tñ hecticę sunt, sed etiā μαλακός δεις, hoc est, tabidę. Quę autē manente adhuc humanitate generantur, ubi corpus cordis occupauerint, hinc maxime accēduntur, haud secus quā lucernę flāma ex ellychnio. Atq; hęc una quidem febrium hecticarū generatio. reliqua est quā statim inuaserint, similem primum sui ortum diariis facientes, aut ex mōrore, aut ira, aut lassitudine nimia, unā cum solis feruore natę. Hasce igitur febres non est admodū difficile curare. Atq; ex ipsis in tabem marcorēuē, qui Gręcis dicitur μαλακός, ex inscitia medicorum peruenerunt, ubi iam exquisitē consistunt, ⁊ non adhuc incipiunt, has non modò curare difficile, imò etiam impossibile. Earum enim naturā calida ⁊ ficca est, ut tale aliquid patiatur cor quale lucernę funiculus, quū plurimū perustus fuerit. Nam qui ita torrefactus est, frāgitur ⁊ dissoluitur, atq; ex ari-



ariditate continuitatem amittit, adeo ut etiam si copiosum oleum superinfundas, flamma abundantior non possit accendi. Semper enim parua et imbecilla in ipsa palpitat, ac continue fit minor, donec ex toto extinguitur. Talis quidem est febris quæ omnino *αρεσ* *μειν*, hoc est tabida existit. Hæctica uero quæ in marasmum icidit, cognitu promptissima atque facilissima existit. Nam priusquam pulsus atque calor tactu perpèdas, uidebis oculos immodice concavos: ueluti quibusdam quasi scrobibus recòditos, exhausta iam uniuersa in ipsis humida substantia, ita ut ossium quibus palpebre coherent eminentiæ còspiciantur. Sordes quidem in ipsis aride apparent, et quidam squalidus affectus, qualis maxime inest his qui toto die sub solis ardore iter longum per puluerem fecerunt. Flos etiam ille uitalis perit, cutisque in fronte arida distensaque est. Palpebre frequenter ueluti somnolentæ conuiuent. Verum passio eorum somnus non est, sed potius uigilandi impotentia. Contabuerunt quoque carnes quæ in temporibus sunt, ut collapsa uideantur, et concaua loca. Quid enim aliud præter ossa et cutem solam habent? nam si denudatum uentrem inspexeris, neque intestinum, neque uiscus ullum superesset tibi uidebitur. Hypochondria sursum ad thoracem còuelluntur. Quod si eos tangere libeat, cutis quidem apprimè arida est: quam si digitis apprehendens extenderis, instar corii cuiusdam còstitit. Pulsus, tenuis, durus, debilis, et frequens. Caliditas quum primum manus admouetur debilis est, paulo post acris et rodens erumpit: et magis, quum amplius tangendo immoraberis. Maxima quoque erit hæc et minime anceps nota: adhibito cibo calor incèditur, pulsusque magnitudine ac uelocitate intenditur. Tandiu autem hæctica febris dicetur, quandiu natiua humiditas reseruatur. Vbi uero ambigitur, ne nihil amplius humoris supersit, absoluta iam tabes est. Hæcticas uero febres priusquam ad tabem deueniant, omni conatu refrige.

signa.

Curatio



frigeramus. Sūma itaq; curationis in refrigerādo ac humectādo collocatur, tā his quę extrā admouētur, quā iis q̄ intra sumūtr. Aēr igitur inspiratus frigidus sit ⁊ humidus. Et si natura talis nō sit, arte paretur, ut dictū est suprā Ca. 6. de Curatione tertianę. Cibus utendū iisdē uiribus p̄diti: ptisanę nimirū cremore, pane modico in aqua frigida macerato: car nibus hodi, phasianorū, uolucriū montanarū, testi culis gallorū, carnibus caponū ouis sorbilibus, ca seo recēti salis experte, piscibus petrosi, lactuca, inty bis, cucurbita, spanachia, malua, ⁊ similibus. Cerasis, prunis, malis, punicis melonibus, ficubus, ⁊ eiusmodi. lac ē mirifice iis p̄dest, mō alia febris ab humorū pu tredine orta nō cōplicetur. Quę uero ad huius exqui sitā exhibitiōē sunt necessaria, ut alia multa huic in stituto cōueniētia, tradit Galenus lib. 7. Ther. meth. Potus sit aq̄ frigida moderate sumpta, aut decoctum cinamomī, aut uinū aquosū, tenue. Cōuenit deniq; hecticis sepius die cibū accipere, ut nimirū hac ratio ne caueāt, ne una uice magnā ciborū copiā ingerāt. Motū immodicū, ⁊ quicquid uires resolvere potest, deuient. Ceterū medicamēta purgantia illis qui he ctica febre laborāt non sunt propināda. Sed si alius plus ē quo adstricta fuerit, leuib. ac alterantib. clyste ribus, adiecta casia fistulari, hanc abluere oportet. In tra corpus exhibēda medicamēta refrigerātia ac hu mectātia: qualia inter cōposita hodie usitata sunt, syrupi uiolaceus, de nymphęa, de intybo domestico, acetosus, ⁊ similes. Itē cōfectiones diarhodō abbatis, diatragacathę frigide, diapapaueris, similesq;. Ex sim plicibus succi lactuce, portulacę, intybi, ⁊ papaueris. Inter ea uero q̄ extrinsecus admouētur, balnea huic morbo obnoxiiis quouis tēpore idonea sunt. balnea quidē aquarū dulciū: ad quę sanē egrotus in lectu lo, aut findone deportetur. Aquā uero tēperatissimā esse oportet; in qua etiā moderate cōmorādū, ne sci licet

Balnea



licet quippiā è propria humiditate hauriatur. tantū  
 abest ut in ea sudare debeat. Sūt quin in aqua deco-  
 quēdas herbas aliquot esse putēt: uiolas nempe, mal-  
 uas, lactucas, flores nymphę, & iis similes. Nonnulli  
 itē pedes uitulinos, & capita agnina, quoad ossa car-  
 nibus separentur. Cauendū etiā, ne perfundatur ca-  
 put. Vbi itaq; satis iam in balneo cōmoratus fuerit,  
 mox hinc eductus, in frigidam semel totus tingatur,  
 ne uel breuissimo quidem spacio illic moratus. He-  
 stica siquidem febricitantes, qui ad balneum acce-  
 dunt, Galeno lib. 10. Ther. meth. teste, nisi in frigi-  
 dam sint dimissi, nihil iuuantur. Protinus autē *cap. x.*  
 extractus fuerit, alter paratam habens sindonem ip-  
 si insiciat, ac deinde aliam. tum in lectulo colloca-  
 tus, primum spongiis detergeatur, deinde mollibus  
 linteis. nec committent qui eum detergebunt, ut uio-  
 lentius eum contrectent, sed quoad fieri potest blan-  
 dissimē. Quid multa? eam sanē curam, si fieri potest,  
 omnino in balnei usu adhibeant, quam Galen. lo-  
 co iam citato requirit. Post hęc quidem oleis frigi-  
 dis, & aliis humectandi facultate pręditis inungen-  
 dus erit. Inter cętera uero hoc conuenit, quod *linimento*  
 Oleorum uiolacei. 3. s. de cucurbita. 3. iii. butyri re-  
 centis salis experti, pinguedinis porcine. 3. i. s. misce,  
 fiat linimentum, ut uocant. Vel adiciantur musco-  
 sitatis tragacanthę. 3. ii. medullę cruris uitulini. 3.  
 iii. cere quod satis est, & fiat unguentum. Valet etiā  
 oleum nymphę, de papauere, & rosaceum, quod Ga-  
 leno lib. 3. de Simpl. med. facul. Cap. 16. arentia cor-  
 pora mirificē humectare potest. Vbi unctus fuerit,  
 tum uestibus amictus rursus super lectulo, aut sindo-  
 ne in locum ubi cibatur reducent & nutrient. Prode-  
 rit etiam cor atq; iecur epithematis refrigerare & hu-  
 mectare: qualia sunt hęc, quę *Epithema*  
 Aque stillaticię uiolarum, nymphę, lactucę añ. 3. iii. aceti optimi. 3. s. ro-  
 sarum rub. iantalorum omnium añ. 3. i. specierum  
 diamar.



Pollio Ro  
mulus.

diamargariton. 3. s. caphurę gr. iiii. croci. 3. s. misce, fiat epithema, quod cordi adhibeatur frigidū. Aliud quod ʒ. Aquę stillaticę, intybi domestici, rosarum añ. 3. iiii. lactucę. 3. ii. aceti. 3. i. specierum diarhodon abbatis. 3. i. s. rasurę eboris. 3. s. caphurę. 3. s. misce, fiat epithema, quod iecori admoveatur. Conferunt hec eticis etiam medicamenta quę odore suo refrigerāt et humectant, ut sunt flores nymphę, caphura, uiolę, rosę, et similia. Plura etiam ad institutum facientia reperiet studiosus in Cap. de Phthisi seu tabe. Et certe in hec tices curatiōe unice studendū, ut corpus nō solum per ea quę intra corpus sumuntur refrigeremus et humectemus; uerum etiam per ea quę ext. in secus admouentur, olei potissimum inunctionem. Quantum enim hoc ipsum foris adhibitum ad corporis ac uirium conseruationem conducat, celebri Pollionis Romuli exemplo docemur. Hunc enim cętesimum iam annum excedentem. Plinio lib. 22. Capi. 24. teste, quum Diuus Augustus hospes interrogaret, qua nam ratione maximē uigorem illum animi corporisq; custodisset, ille respondit: Intus mulso, foris oleo. Hęc quidem ad recte curandas febres sufficiunt. præclare enim officio nostro defunctos nos esse putamus, quod methodum quam breuissimē potuimus indicauerimus. Remedia autē parcissimē attigimus, quod ea nullo labore medicinæ non prorsus rudes, ex superioribus libris tribus, si plura desiderant, petere possint.

LIBRI QVARTI ET  
VLTIMI FINIS.



# HIPPOCRATIS COI DE ME- DICAMENTIS PURGATORIIS

libellus, nunquam prius in  
lucem editus.

IVNIO PAVLO CRASSO  
INTERPRETE.

*Cur medicamenta purgantia non temere exhibenda. Cap. I.*



Medicamentorum Purgantiū opera non ōlia censentur existūt. ab eodē enīz medicamēto aliq modo purgātur, mō nō purgantur. interdum ⁊ alia: q̄s quæ p̄sueuerit: educit. inter dū imodicē purgat, nōnūq̄ ⁊ q̄ op̄s p̄stat. Quare nō p̄t q̄spīā hīsce fret⁹ medica. ea temere p̄pinare: siqdē ⁊ cibi nos alētes, medicamēta existimādi sunt: minus tñ q̄ antedicta. hoīes nāq̄ hīsce rectē uescētes, scōa ualetudine fruūtur: minus rectē, laborāt: int̄panter, ceu sinceris à medica. euacuantur. Igitur iā p̄s, ⁊ cibos ipsos eē purgātia medica. minus tñ, signiusq̄, q̄ syncera medic. cæterū his signiores, nobisq̄ familiares, ⁊ quotidie in corpus intrātes, temere ac negligēter exhibiti, hoīes p̄turbant, in morbosq̄ p̄cipitāt: atq̄ ut semel dicā, q̄ inconsiderate cibos dederit, nihil commodi, nihil opis est allaturus.

*Quæ quibus medicamenta danda. Cap. II.*

Igitur ab initio biliosis, medicamētū bilis purgatoriū est p̄pinandū. pituitosis qđ pituitā: hydropīcis, qđ aquā: melancholicis, qđ atrā bilē educat. at si alia ab iis purgas q̄ purgare cōuenit, nō purgas: q̄ at non cōuenit, euacuabis. quare utrunq̄ peccaueris.

*Quæ præmittendæ interrogationes. Cap. III.*

Itaq̄ aliquē aut suprā, aut infrā purgaturus, eum prius interrogato, nū aliās medi. purgatoriū acceperit?



perit: nū aluus subducentibus medic. facile soluat  
 uelociterq; obediat: aut ptra, adstricta fit, egreq; sol  
 uatur? Qd si facile esse aluū, subricamq; rnderit, mol  
 lioribus minoribusq; medic. indigebit: sin aluus sic  
 ca pclusaq; sit, ualētiora medic. postulat. Idē pceptuz  
 z in uomitoriis medic. obseruandū est. uerū si neuti  
 quā uomitoria subducentiaue medicamēta sumpsis  
 se se affirmauerit, tū demū scire opz, quō sanitatis tpe  
 se habuerit: nuz subducentibus facilis aluus patue  
 rit, nuz uomitoriis stomachus libenter morē gesserit  
 num a crapula quapiaz in alui pfluuiū inciderit. oīa  
 hęc sciscitari debes, ut recte ipsi possis psulere. Fōda  
 est enim calamitas, eū cui purgatoriam medicinam  
 dederis, interficere.

*Quibus morbis, quoue tempore exhibendae medi  
 cine purgatoriae. Cap. III.*

**Q** Vicunq; sane ualidis febribus corripiuntur,  
 his usq; ad febris remissionē purgatoria med.  
 ne dato. sin id nolis, saltē ne citra quartū deci  
 mū diē: calidæ enim carnes ipsorū, z uentres, medic.  
 retrahūt, nihilq; purgatur. Tunc plane febris magis  
 exardet, color pmutatur auriginosi q; fiunt. agitata  
 nanq; bile, z nō detracta, neq; sorbere p̄t, neq; bibē:  
 sz anersatur oīa, z plerunq; moritur. Ceterū si med.  
 uincit, ante meridiē nulla fit purgatio, a meridie fit  
 immoderata deiectio atq; comoritur. qd si diez hūc  
 superstes sit, simulq; cū purgatione febris tollatur,  
 z ualescit. Quāobré purgatoria medi. in magnis feb.  
 ne ore sumantur, præcipimus. at si ipsis opus fuerit,  
 p clysteria iniicere, quoties uolueris, expediet: id enī  
 tutius erit. Hac itidē rōne, estiuo tpe post canis ortū  
 quinḡginta dierū spacio medicinā purgantē ne ppi  
 nato, sed clysteriis utitor. idem nanq; discriminē est.

*Defensio medicine contra calumniatores. Cap. V.*

**D**icent aut aliqui, qui medicinā calumniantes ar  
 tem esse negāt, pridē multos nō iplo rata medici  
 ope

Clysteres



ope ex morbis euasisse. Atq; ego istorū orationi fides habeo. simul tñ fieri posse arbitror, ut q̄spia nō utens medico, ex medicā fructū p̄cipiat: haud ita tñ, ut qd in ipsa rectū, qd nō rectū sit, agnoscat. nā forte q̄das i ta seipsos curare p̄nt, ac si accitis medicis curati essent. Id uero p̄clarū indicium est, medicinā nō solū artez, uerumet̄ eximiam esse artē: qñquidē ⁊ ipsaz funditus tollentes, p̄ ipsaz illā seruari uideantur. Illud. n. nouisse summa est necessitas, eos qui ex languoribus ad sanitatē restituti sunt, aliqd facientes aut nō faciētes p̄ualuisse. aut enī ieiunio, aut ciborū copia, aut largiore potu, aut siti, aut balneis, aut ab eis abstīnētia, aut exercitationib⁹, aut ocio, aut sōno, aut uigilia, aut oībus his p̄fute utētes, incolumes euasere. At qui ⁊ ex auxilii p̄ceptione infuisse auxiliās, eos cognoscere necesse est: p̄ ex noxa accepta, rē nocentem affuisse. nā q̄ iuuādī, q̄ ledēdi ingenio p̄dita sint, nō cuiusq; est dinoscere. Itaq; si qd in rōne uictus, p̄ q̄ sanatus fuerit eger, laudare aut uitio dare cognouerit, oīa hęc medicine esse cōperiet. Et mehercule offēfiones nō deterius, q̄ adiuuenta, artē hāc esse testantur. iuuantia siquidē, recte administrata iuuerunt: nocentia īperite adhibita nocuerūt. at ubi rectū, nō rectumq; utrunq; modū hñt q̄uo id ars esse negādū est: Illud nāq; ego arte carere existimo, in quo nihil rectū est, neq; nō rectū: ubi aut utrunq; inest, q̄uo id nō artis opus, s; artis imperitię putandū est.

Medicm  
eximiat

Hippocratis de Medicamentis Purgatoriis.

FINIS.


REGISTRVM

✱ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S

Omnes sunt quaterni.

Venetiis per Bernardinū de Bindonis. M. D. XLI.
















Publice quotidie in platea a Tri.  
Adi 23. in globis a prim. co P. C. et  
B. L. sils. sil. n. Gu. M. etc.  
Adi 24. in fovea et simile, usq.



1787 adi 15: marzo in Domenica  
fil di lino dato al m. de Garlasco tob. 16. on. 6.  
per tingere in porpora per ordire 68. br.  
d'opera da fare un paramento da letto, et h  
havuto a bon conto sopra la fattura un ducato  
la qual fattura monta d'accordo Tob. 7. e m.  
per brado. senza la tintura. tob. 16. on. 1.

fil dato al soprascritto Stoppa tob. 5. on. 8.  
fil dato al soprascritto Stoppa bianca. tob. 2. on. 4.  
fil dato Stoppa cilestina tob. 8.  
fil dato Stoppa bianca tob. 4.  
fil dato lino cilestino tob. 3.  
fil mandato Stoppa & far tingere tob. 5.

Vota come il 28 di maggio fu dato al soprascritto  
un altro ducato a bon conto utq.



m. M. A. Teo. 2. 7. Supra m. A. B. B. B.  
Lino.

A m. A. Brigida on. 19.

A Franceschina on. 6.

A m. A. Brunetta on. 6.

Donaci da m. A. G. M. f.

in ducato

venti doi soldi e in quat. e pagre la fine.

quattro soldi e in quat.

doi real. di m. A.

doi real. m. A.

doi real. m. A.

5. 13.

1. 2. 8.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

10. 7. 3.

1. 1. 1.